




PIT staand order 29

Cerebro vasculair accident



Indicaties voor toepassing.

Patiënten met een positieve BE-FAST test binnen het tijdsvenster voor een acute stroke.



De dringende behandeling van dergelijke pathologie kan deze, in welbepaalde gevallen, verbeteren door trombolysen en in andere gevallen kan men een vermindering van de lange termijn sequellen vaststellen.

Contra-indicaties voor toepassing van het staand order.

Het staand order is **NIET** van toepassing op:

- ✓ Patiënten met een allergie of intolerantie voor geneesmiddelen die worden voorgesteld binnen dit staand order.
- ✓ Patiënten met een onderliggende hypoglycemie → PIT staand order 11

Algemene maatregelen.



ABCDE:

- ✓ Continue monitoring van de vitale parameters is vereist (RR, HF, ECG, NIBP en saturatie)
- ✓ Labo.
- ✓ Bepaling van de glycemie.
- ✓ Plaatsen van een intraveneuze toegangsweg. (bij voorkeur 18G katheter)
- ✓ Zuurstof toedienen in functie van de saturatie (< 94%)
- ✓ De BE-FAST test laat toe om een diagnose te benaderen → tracht een precieze anamnese te bekomen teneinde trombolysiekandidaten op te sporen.

AMVLOP

Specifieke maatregelen.

❶ *Halfzittende of rechtzittende houding.*

⌚ 12-lead ECG

MUG-bijstand is aangewezen ingeval van:

- ✓ Mean bloeddruk > 130 mmHg (= 1x systolische bloeddruk + 2x diastolische bloeddruk/3)
- ✓ De patiënt een verminderd bewustzijn heeft waarbij een vrije luchtweg bedreigd wordt.
- ✓ Indien er convulsies optreden.

Aandachtspunten.

❶ Bij een positieve FAST test binnen de tijdsriteria → telefonisch verwittigen van de Op-Cor en/of urgentie-arts voor opstarten van het stroke protocol bij aankomst op spoedgevallen.