２０２５年度

関西公立私立共通試験

C

問題 1

胃底腺の細胞で胃酸を分泌するのはどれか。

a　表層粘液細胞

b　副細胞

c　壁細胞

d　主細胞

e　基底顆粒細胞

問題 2

血中濃度の日内変動をほとんど**認めない**のはどれか。

a　インスリン

b　カテコラミン

c　成長ホルモン

d　コルチゾール

e　甲状腺ホルモン

問題 3

食事療法について**誤っている**のはどれか。

a　食物繊維の摂取量は 20 g/日以上を目安とする。

b　脂質は飽和脂肪酸を減らすようにする。

c　行動変容ステージに応じて支援の方法を考える。

d　適正なエネルギー必要量は身体活動量のみで計算できる。

e　各ライフステージに応じた蛋白質摂取量を考慮する。

問題 4

58 歳の男性。定期受診で来院した。昨年の健診で 2 型糖尿病と診断され食事療法である。今年の健診(空腹時)で総コレステロール 240 mg/dL、トリグリセリド 135 mg/dL、HDL コレステロール 30 mg/dL であった。安静時心電図で胸部誘導にて軽度 ST の低下を認める。運動負荷心電図や心エコー検査にて冠動脈疾患が疑われた。

正しいのはどれか。

a　更に食事療法と運動療法を強化する。

b　治療薬としてフィブラート系薬を投与する。

c　この患者の LDL コレステロール値は 165 mg/dL である。

d　低 HDL 血症は冠動脈疾患のリスクファクターには含まれない。

e　LDL コレステロールの管理目標値は 100 mg/dL 以下である。

問題 5

後腹膜に固定されている臓器はどれか。**2 つ選べ**。

a　上行結腸

b　下行結腸

c　横行結腸

d　S 状結腸

e　虫　垂

次の文を読み、6〜8 の問いに答えよ。

現病歴：65 歳の男性、1 週間前に自宅近くの耳鼻科を受診し、副鼻腔炎の診断にて抗菌薬が処方された。内服 4 日目ころから頻回の水様性下痢(10〜15 回/日)と腹痛、38℃の発熱を認めたため、受診した。

既往歴：２型糖尿病でインスリン加療中、高血圧症、脂質異常症

生活歴：喫煙は 20 歳から 60 歳まで約 10 本/日を 40 年間、5 年前から禁煙している。飲酒は機会飲酒。

現症：意識は清明。身長 166 cm、体重 65 kg。体温 38.1℃。脈拍 84/分、整。血圧 145/75 mmHg。呼吸数 14/分。眼瞼結膜と眼球結膜に異常を認めない。心音と呼吸音とに異常を認めない。腹部は軟で若干の膨満感を認める。肝・脾を触知しない。腸雑音はやや緩慢である。臍周囲を中心に自発痛と圧痛とを認める。明らかな腹膜刺激徴候は認めない。

検査所見：血液所見：赤血球 430 万、Hb 12.3 g/dL、白血球 9,780、血小板 11 万。血液生化学所見：総蛋白 5.8 g/dL、アルブミン 3.1 g/dL、総ビリルビン 0.9 mg/dL、AST 18 U/L、ALT 13 U/L、LD 242 U/L（基準 124〜222）、γ-GT 22 U/L（基準 13〜64）、アミラーゼ 46 U/L（基準 44〜132）、尿素窒素 34 mg/dL、クレアチニン 1.22 mg/dL。CRP 10.4 mg/dL。

問題 6

追加で確認すべき項目として重要度が**低い**のはどれか。

a　海外渡航歴

b　数日以内の食事内容

c　内服薬の詳細

d　便培養検査

e　尿検査

問題 7

腹部超音波検査で遠位大腸の壁肥厚を認めたため、大腸内視鏡検査を行った。大腸内視鏡像を下記に示す。

診断はどれか。



a　虚血性腸炎

b　大腸癌

c　偽膜性腸炎

d　カンピロバクター腸炎

e　IgA 血管炎

問題 8

上記の検査結果を踏まえ、治療として適切なのはどれか。**2 つ選べ**。

a　メトロニダゾール内服

b　バンコマイシン点滴

c　グルココルチコイド内服

d　止痢薬の内服

e　バンコマイシン内服

問題 9

75 歳の男性。胃がん検診で胃体中部小弯に径 20mm ほどの 0-Ⅱa 型の早期胃癌を指摘されたため来院した。同病変に対して内視鏡的治療を行った上部消化管内視鏡像を下記 A、B およびC に示す。

正しいのはどれか。**2 つ選べ**。

A



B



C



a　エックス線透視下で行う処置である。
b　全身麻酔下で行うのが一般的である。
c　経口内視鏡を使用する。
d　被検者は左側臥位で行う。
e　静脈に硬化剤を注入する。

問題 10

心臓について正しいのはどれか。

a　右心室の壁は左心室の壁よりも厚い。
b　大動脈弁は肺動脈弁の前方に位置する。
c　大動脈弁は二尖弁である。
d　冠状動脈は右心房から分岐する。
e　冠状静脈洞は右心房に注ぐ。

問題 11

70 歳の男性。失神を主訴に来院した。1 年前から発作性心房細動と診断されていたが、無投薬で経過観察となっていた。最近 1 か月の間に 3 度失神したため受診した。Holter 心電図を施行したところ、心房細動から洞調律に復帰する際に約 10 秒のポーズを認めた。

この患者に対する方針として、**誤っている**のはどれか。

a　抗凝固療法開始
b　ペースメーカ植込み
c　カテーテルアブレーション
d　植込み型除細動器<ICD>植込み
e　緊急入院のうえモニター装着

問題 12

80 歳の男性。意識消失を主訴に来院した。ビールを飲みながら夕食をとった。昨日、夕食が終わって立ち上がり歩き始めたところ、突然意識が消失して倒れた。驚いた家族が声をかけると、すぐに意識は回復した。家族の話によると、倒れた際に明らかなけいれんはなかった。

意識消失の原因検索としてまず行うべき検査はどれか。

a　心エコー検査
b　脳波検査
c　頭部 MRI
d　立位での血圧測定
e　Holter 心電図検査

問題 13

四肢腱反射亢進を認める疾患はどれか。**2 つ選べ**。

a　脊髄性筋萎縮症

b　頸椎症性脊髄症

c　球脊髄性筋萎縮症

d　筋萎縮性側索硬化症<ALS>

e　慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー

問題 14

72 歳の男性。左手足の動きにくさを主訴に来院した。2 年前から左手足の動きにくさが出現した。ボタンがとめにくくなり、歩くときに左足でつまずくことが増えた。神経診察で、左上下肢に筋強剛と運動緩慢を認める。失行、眼球運動障害、小脳性運動失調、姿勢反射障害は認めない。頭部 MRI で特記すべき所見はない。ドパミントランスポーターSPECT を下記に示す。レボドパ<L-dopa>／カルビドパ水和物配合剤で治療を開始すると筋強剛や運動緩慢は改善した。

この時点で最も考えられる疾患について運動症状発現前から認められる可能性が高いのはどれか。**2 つ選べ**。



a　嗅覚障害

b　排尿障害

c　認知機能低下

d　起立性低血圧

e　レム<REM>睡眠行動障害

問題 15

鼠径ヘルニアについて正しいのはどれか。

a　鼠径管を通って脱出するものが内鼠径ヘルニアである。

b　小児に多い鼠径ヘルニアは内鼠径ヘルニアである。

c　成人鼠径ヘルニアの外科治療としてヘルニアサックの根部結紮を行う。

d　大腿ヘルニアは高齢男性に多く発症する。

e　小児鼠径ヘルニアは先天的要因で発症する。

問題 16

16 歳の男子。高校入学後、教師の指示が上手く理解できず、提出物の遅れや忘れ物が目立つようになったため、保護者に連れられて来院した。幼少期から集団になじめず、現在も他者の気持ちを汲み取ることが苦手である。本人は興味のある話題には熱心だが、質問に対してちぐはぐな返答が多く、冗談も通じにくい。学校の成績は平均程度である。既往歴、家族歴に特記すべきことはない。発達障害を疑い、心理検査を実施することとした。

この患者に対して最も適切な心理検査はどれか。

a　リバーミード行動記憶検査<RBMT>

b　Wechsler 成人知能検査<WAIS-Ⅲ>

c　Rorschach テスト

d　改訂長谷川式簡易知能評価スケール

e　Beck のうつ病自己評価尺度

問題 17

53 歳の男性、定期健康診断で便潜血反応が陽性であったため精査のため来院した。下部消化管内視鏡検査を施行したところ下行結腸にポリープを指摘された。内視鏡的切除術を受けた際に、止血困難となった。

インターベンショナルラジオロジー<IVR>で止血する際に使用するのはどれか。

a　コイル

b　リザーバー

c　ステント

d　エタノール

e　フィルター

問題 18

65 歳の女性。3 か月前からの不正性器出血と 1 か月前からの腰痛を主訴に来院した。臨床病期ⅢB 期の子宮頸癌と診断され、同時化学放射線療法の方針となった。

放射線治療の有害事象として最も早期に出現する可能性が高いのはどれか。

a　腸閉塞

b　膀胱炎

c　頭部脱毛

d　直腸腟瘻

e　二次発癌

問題 19

32 歳の女性。下腹部痛のため救急外来に来院した。腹部単純 CT を施行し、異常を認めなかったが、のちに妊娠 7 週であることが判明した。CT 被ばく線量は約 10 mGy と推定された。

この患者に対する医学的説明として最も適切なのはどれか。

a　人工妊娠中絶が推奨される。

b　妊娠の継続は医学的に問題ない。

c　自然流産のリスクが有意に増加する。

d　胎児の奇形発生リスクが有意に上昇する。

e　胎児の中枢神経障害のリスクが有意に増加する。

問題 20

下肢装具の写真を下記に示す。適応となる疾患はどれか。**2 つ選べ**。

a　足関節捻挫

b　腓骨神経麻痺

c　アキレス腱断裂

d　中大脳動脈領域の脳塞栓

e　L3 神経根障害

問題 21

40 歳の男性。頸椎損傷のため入院中である。6 か月前に高所から転落して頸髄損傷と診断された。退院に向けたリハビリテーションを施行している。自宅はバリアフリー改修工事を行った。現在の筋力は徒手筋力テストで両側とも上腕二頭筋 5、橈側手根伸筋 5、上腕三頭筋 4、深指屈筋 0、小指外転筋 0 である。体幹筋と下肢筋の随意運動は不可能である。両上肢尺側、体幹および両下肢の感覚は脱失している。

退院後の屋内での移動手段として考慮すべきなのはどれか。

a　自走用車いす

b　介助用車いす

c　松葉杖での歩行

d　長下肢装具と杖での歩行

e　下顎コントロール電動車いす

問題 22

急性中毒の原因薬物が不明な状態で搬送された患者に対し、まず行うべき初期対応として正しいのはどれか。**3 つ選べ**。

a　気道・呼吸・循環の安定化を優先する。
b　胃洗浄を直ちに行う。
c　バイタルサインと意識レベルの評価を行う。
d　広域抗菌薬を予防的に投与する。
e　家族や救急隊などから摂取物に関する情報を収集する。

問題 23

73 歳の男性。路上で倒れているところを発見され、救急車で搬入された。意識レベルは JCS Ⅲ-300 。両側瞳孔の散大を認め、対光反射は消失している。体温 36.0℃。心拍数 45/分、整。血圧 189/104 mmHg。自発呼吸があるが舌根が沈下している。体幹、四肢に明らかな外傷を認めない。頭部単純 CT を下記に示す。

直ちに行う処置として正しいのはどれか。**2 つ選べ**。

a　気管挿管
b　降圧薬投与
c　昇圧薬投与
d　胸腔ドレナージ術
e　脳室ドレナージ術

問題 24

17 歳の男子。心停止のため救急車で搬入された。夏場の炎天下で野球部の部活動をしていたところ突然倒れたため、救急車を要請した。救急隊到着時は、チームメイトによるバイスタンダーCPR が行われていた。救急隊員により心停止が確認され、心肺蘇生を継続された。現場で救急隊員により AED を用いて電気ショックが実施された。救急搬送途中に自己心拍の再開が確認された。

病院到着後に行うべきこととして、最も優先度が**低い**のはどれか。

a　血圧測定
b　救急隊員から現場状況の聴取
c　電気ショック
d　肩をたたいて反応を確認
e　心電図モニターの波形観察

問題 25

正常解剖で頸椎の神経根の片側本数として正しいのはどれか。

a　5本
b　6本
c　7本
d　8本
e　9本

問題 26

8 歳の男児。約 3 か月前から誘因なく、片側の股関節から大腿部の痛みを自覚するようになり来院した。股関節の写真を下記 A、B および C に示す。

この疾患の**特徴でない**のはどれか。

A



B

C

a　男児に多い。

b　肥満が関与する。

c　Romberg 徴候が陽性である。

d　Drehmann 徴候が陽性である。

e　Trethowan 徴候が陽性である。

問題 27

正期産児で新生児マススクリーニングを行うのに最も適切な時期はどれか。

a　出生当日

b　生後 5 日

c　生後 10 日

d　生後 20 日

e　生後 30 日

問題 28

6 か月の乳児。6 か月児健康診査で成長障害と発達遅滞が疑われ、母親とともに受診した。意識は清明。身長 66.0 cm(−0.7SD)、体重 6.0 kg(−2.0SD)。体温 36.9℃。心拍数 120/分、整。血圧 90/58 mmHg。①定頸を認める。②寝返りもできるが、③お座りはできない。④顔面、頭部および下腿に新旧混在した皮下出血が散在し、⑤両足底に多数の円形の熱傷痕を認める。

下線部のうち虐待を疑う所見はどれか。**2 つ選べ**。

a　①

b　②

c　③

d　④

e　⑤

問題 29
食品バランスガイドのイラストを下記に示す。
説明として適切なのはどれか。



a 「糖尿病患者の献立がわかります」
b 「食材を無駄にしないために使います」
c 「検査のための食事の選択に利用します」
d 「日常の活動に見合った運動がわかります」
e 「何をどれだけ食べたら良いか示しています」

問題 30
二次性徴について正しいのはどれか。
a 女子では陰毛の出現が最初の徴候である。
b 男子では腋毛の出現が最初の徴候である。
c 二次性徴の発現は暦年齢よりも骨年齢によく相関する。
d 陰茎の成長は思春期後期に出現する。
e 身長急伸は初経後に起こる。

次の文を読み、31〜33 の問いに答えよ。
出生直後の新生児。経腟分娩で出生した。**現病歴**：在胎 39 週 3 日、出生体重は 3,160g であった。分娩中に胎児心拍数陣痛図で遷延一過性徐脈が繰り返し出現していた。**現症**：出生 1 分後の時点では全身にチアノーゼを認め、心拍数 80/分、呼吸は不規則であった。刺激に対して顔をしかめるが全身がだらりとしていた。バッグバルブマスクを使って蘇生を行ったところ、出生 5 分後までに四肢末梢はチアノーゼが残るものの体幹がピンク色になり、心拍数 140/分、鼻腔内吸引によって強い咳嗽反射が出現した。強く啼泣しており、四肢をよく動かしていた。

問題 31
出生後 1 分の Apgar スコアは何点か。
a 1 点
b 3 点
c 5 点
d 7 点
e 9 点

問題 32
出生後 5 分の Apgar スコアは何点か。
a 1 点
b 3 点
c 5 点
d 7 点
e 9 点

問題 33
この児の出生 5 分後の所見に基づく判断について、適切なのはどれか。**2 つ選べ**。
a 酸素化は良好である。
b 末梢循環は良好である。
c 呼吸器疾患は否定できる。
d 先天性心疾患は否定できる。
e 今後の発達は正常である。

問題 34
乳汁分泌を抑制するのはどれか。
a　プロラクチン
b　ブロモクリプチン
c　オキシトシン
d　コルチゾール
e　スルピリド

問題 35
産褥期に好発しやすい疾患はどれか。
a　急性虫垂炎
b　ウイルス性肝炎
c　尿管結石
d　うつ病
e　脊柱管狭窄症

問題 36
28 歳の女性。挙児希望を主訴に来院した。月経周期は 28 日型、整、持続 5 日間。避妊せずに 3 か月経過したが妊娠しなかったため受診した。内診で子宮と卵巣とに異常を認めない。Douglas 窩に異常を認めない。基礎体温は 2 相性である。
この時点で適切な説明はどれか。
a　「体外受精をお勧めします」
b　「あなたの染色体検査をしましょう」
c　「まず排卵日をみつけましょう」
d　「排卵誘発薬を内服しましょう」
e　「ご主人に原因があると思います」

問題 37
18 歳の初妊婦。妊娠 35 週。胎動減少を主訴に来院した。妊娠 33 週までの妊婦健康診断では特に異常を認めなかった。1 週間前から腰痛が出現したため、自己判断で毎日非ステロイド性抗炎症薬を含有した市販薬を服用していた。胎児心拍数陣痛図では胎児心拍数基線は 130/分で、基線細変動は正常、一過性頻脈は認めない。腹部超音波検査を開始したが、胎盤や羊水量に異常を認めない。
次に超音波検査で注意して観察すべき胎児の部位はどれか。
a　心　臓
b　肺
c　脳
d　消化管
e　動脈管

問題 38
腹圧性尿失禁の原因はどれか。
a　過活動膀胱
b　尿　閉
c　前立腺全摘除術
d　脳梗塞
e　間質性膀胱炎

問題 39

80 歳の女性(2 妊 2 産)。大腿骨骨折のため入院中である。膀胱内留置カテーテルを抜去した翌日、外陰部の腫瘤を認めた。本人は 1 年前から外陰部のしこりを自覚していたが、日常生活に支障がないため受診していなかったという。意識は清明。身長 158 cm、体重 62 kg。体温 36.8 ℃。脈拍 70/分、整。血圧 120/74 mmHg。呼吸数 13/分。胸腹部の身体所見に異常を認めない。血液所見と血液生化学所見とに異常を認めない。診察時の外陰部写真を下記に示す。

この患者に認めた場合、腫瘤の用手還納を急ぐのはどれか。



a　尿　閉
b　帯　下
c　子宮腟部粘膜擦過傷
d　尿失禁
e　外痔核

問題 40

80 歳の男性。腎機能低下を主訴に来院した。10 年前から腎機能低下を指摘されて自宅近くの診療所を定期受診していた。1 か月前の定期受診で腎機能がさらに低下していたため、腎代替療法の準備を勧められて受診した。55 歳から高血圧症に対して内服治療を受けている。65 歳時に腎癌のため左腎を摘出し、再発なく経過している。会社員を定年退職後、高齢者向けのパソコン教室の講師を勤めている。78 歳の妻との 2 人暮らしである。身長 165 cm、体重 60 kg。脈拍 68/分、整。血圧 120/66 mmHg。腹部は平坦、軟で、左腰背部に手術痕がある。両下肢に軽度の浮腫を認める。**尿所見**：蛋白（−）、糖（−）、潜血（−）、沈渣に異常を認めない。**血液所見**：赤血球 330 万、Hb 9.8 g/dL、Ht 30%、白血球 6,300 、血小板 21 万。**血液生化学所見**：総蛋白 6.8 g/dL、アルブミン 3.7 g/dL、尿素窒素 58 mg/dL、クレアチニン 3.2 mg/dL、eGFR 15 mL/分/1.73m^2、Na 140 mEq/L、K 4.5 mEq/L、Cl 103 mEq/L。

腎代替療法の選択にあたりこの患者への適切な説明はどれか。

a　夫婦間腎移植は可能である。
b　腹膜透析は可能である。
c　療法選択前に認知機能評価が必要である。
d　療法開始時後の就業はできない。
e　療法開始後の旅行はできない。

問題 41

表皮を構成する細胞はどれか。**2 つ選べ**。

a　メラノサイト
b　マスト細胞
c　Langerhans 細胞
d　線維芽細胞
e　平滑筋細胞

問題 42

32 歳の女性。痒みを伴う皮疹を主訴に来院した。昨日夕食後に皮疹が下肢に出現しその後消退した。皮疹が出現した際の下肢の写真を下記に示す。

この皮疹の原因検索に有用な検査はどれか。

a　薬剤リンパ球刺激試験
b　パッチテスト
c　真菌検査法
d　ダーモスコピー
e　プリックテスト

問題 43

糖尿病網膜症の初期からみられる所見はどれか。**2 つ選べ**。

a　硬性白斑
b　硝子体出血
c　毛細血管瘤
d　網膜新生血管
e　軟性白斑

問題 44

眼圧で正しいのはどれか。**2 つ選べ**。

a　座位より仰臥位で高い。
b　中心角膜厚が薄い方が高く測定される。
c　冬より夏が高い。
d　日内変動がある。
e　正常範囲は 20〜25 mmHg である。

問題 45

内耳に含まれるのはどれか。

a　蝸　牛
b　耳　介
c　アブミ骨
d　鼓　膜
e　耳　管

問題 46

37 歳の男性。職業は小学校教諭。1 か月前にクラス担任となってから続く嗄声を主訴に来院した。咽頭痛、発熱および咳嗽はない。軟性喉頭内視鏡像を下記の図に示す。

説明として正しいのはどれか。



a　喫煙は影響ありません
b　窒息の危険があるため緊急気管切開術が必要です
c　声を出しすぎないようにしましょう
d　遺伝性疾患が考えられるので遺伝子検査をしましょう
e　抗菌薬が有効です

問題 47

病因物質別の月別食中毒発生件数の表を下記に示す。ウイルスはどれか。

ただし、ア、イ、ウ、エ、オは寄生虫、細菌、ウイルス、化学物質、自然毒のいずれかに該当する。



a　ア
b　イ
c　ウ
d　エ
e　オ

問題 48

世界保健機関<WHO>が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態（PHEIC）」に**指定しなかった**のはどれか。

a　重症急性呼吸器症候群<SARS>（2002）
b　新型インフルエンザ（2009）
c　エボラ出血熱（2014）
d　新型コロナウイルス感染症（2020）
e　エムポックス（2022）

問題 49

エタノールによる手指衛生の効果が高いのはどれか。

a　炭疽菌
b　ノロウイルス
c　ボツリヌス菌
d　ディフィシル菌
e　インフルエンザウイルス

問題 50

56 歳の男性。海外で多発している感染症 X に罹患していることを心配し検査目的で来院した。感染症 X が多発している国に半年間滞在し 2 週間前に帰国した。これまで特段の症状はないという。感染症 X の国外の発生動向および診断と治療に関する情報を入手したい。

入手先として最も適切かつ信頼されるサイトを運営しているのはどれか。

a　保健所
b　国土交通省
c　世界保健機関<WHO>
d　地域包括支援センター
e　都道府県感染症情報センター

問題 51

8 歳の男児。4 日前からの発熱、咳、鼻汁および流涙を主訴に来院した。体温は 38.1℃まで上昇したが現在は 37.2℃である。現在，皮疹は認めない。頬粘膜の写真を下記に示す。この患児の登校について正しいのはどれか。



a　全身状態が良好なら登校可能
b　発症後 5 日間は出席停止
c　頬粘膜の所見が消失するまで出席停止
d　解熱後 3 日を経過するまでは出席停止
e　発生した発疹がすべて痂皮化するまでは出席停止

問題 52

31 歳の初妊婦。妊娠 10 週。妊婦健康診査で HBs 抗原陽性、HBe 抗原陰性が判明した。対応として正しいのはどれか。

a　人工妊娠中絶を勧める。
b　B 型肝炎ワクチンを本人に接種する。
c　児への感染予防のため授乳を禁止する。
d　ウイルスが胎盤を通じて児に感染することが多い。
e　抗 HBs ヒト免疫グロブリンを出生直後の児に接種する。

問題 53

76 歳の女性。脳梗塞で入院し、急性期治療を終え、回復期病棟でリハビリテーションを行っている。この患者が介護保険を申請することになり、主治医意見書の記載を依頼された。①身体の状態は、左片麻痺があり、②移動は杖をついて平地歩行は可能だが、階段昇降には介助が必要である。③日常生活自立度は、A1（介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する）と考えられた。④認知症はない。これらを総合し、⑤要介護度は 1 と判定した。

下線部のうち主治医意見書の記載項目に**含まれない**のはどれか。

a　①
b　②
c　③
d　④
e　⑤

問題 54

特定機能病院について正しいのはどれか。

a　都道府県知事が承認する。
b　400 床以上の病床が必要である。
c　かかりつけ医を支援することが求められる。
d　二次医療圏ごとに 1 施設の設置が目標である。
e　地域の医療従事者に対する研修を実施する機関である。

問題 55

82 歳の女性。自宅で転倒し、疼痛により歩行不能となり救急車で搬入された。独居であり、近隣に血縁者はいない。股関節部写真で右大腿骨近位部骨折を認め、人工股関節全置換術が施行された。

各職種と担う役割の組合せで**適切でない**のはどれか。

a　理学療法士 ---------- 歩行練習の実施
b　管理栄養士 ---------- 術後食の栄養管理
c　医師 ---------- 術後の血栓予防の管理
d　医療ソーシャルワーカー ---------- 退院後の在宅医療サービスの調整
e　看護師 ---------- 術後のリハビリテーションの内容の指示

問題 56

頸静脈怒張が最も典型的に診られる病態はどれか。

a　肺　炎
b　肝硬変
c　脳梗塞
d　心タンポナーデ
e　甲状腺機能亢進症

問題 57

基準値に性差があるのはどれか。**2 つ選べ**。

a　血清 CK 値
b　血中白血球数
c　血清アルブミン値
d　血中ヘモグロビン値
e　プロトロンビン時間

問題 58

80 歳の男性。発熱と意識レベルの低下を主訴に来院した。慢性肺気腫があり治療中である。2 日前から 38℃の発熱、咳嗽および膿性痰が出現した。今朝から軽度の意識障害を認めたため受診した。SpO_2 88%（room air）

まず行う検査はどれか。

a　脳波検査
b　心電図検査
c　心エコー検査
d　呼吸機能検査
e　動脈血ガス分析

問題 59

70 歳の男性。血痰と発熱とを主訴に来院した。約 2 週間前から 38℃を超える発熱と咳嗽が持続し、抗菌薬を内服しても軽快しなかった。昨日から血痰と呼吸困難とを自覚するようになった。体温 38.5 ℃。脈拍 102/分、整。血圧 140/76 mmHg。呼吸数 20/分。SpO_2 92%（room air）。心音に異常を認めないが、呼吸音は両背下部に crackles を聴取する。神経学的所見に異常を認めない。

尿所見：蛋白 3＋、糖（－）、潜血 3＋、沈渣に赤血球 50～100/HPF、顆粒円柱 5/WF、尿蛋白 3.5 g/日。**血液所見**：赤血球 330 万、Hb 9.0 g/dL、Ht 30 %、白血球 11,200、血小板 22 万。**血液生化学所見**：総蛋白 6.0 g/dL、アルブミン 3.0 g/dL、尿素窒素 34 mg/dL、クレアチニン 2.1 mg/dL。CRP 8.5 mg/dL。

診断に最も有用な自己抗体はどれか。

a　抗 CCP 抗体
b　抗 RNP 抗体
c　抗 dsDNA 抗体
d　抗 MDA5 抗体
e　MPO-ANCA

問題 60

癌とリスクファクターの組合せで正しいのはどれか。**2 つ選べ**。

a　食道癌　----------　高脂肪食
b　胃　癌　----------　*Helicobacter pylori*
c　大腸癌　----------　飲酒
d　乳　癌　----------　高食塩食
e　卵巣癌　----------　ヒトパピローマウイルス〈HPV〉

問題 61

障害者への対応について正しいのはどれか。

a　生活空間のバリアフリーを図るべきである。
b　QOL よりも障害の治療を優先すべきである。
c　身体的な障害者が精神的な障害者より優先される。
d　事業主は障害者を雇用することを考慮しなくてよい。
e　障害者は身体障害者手帳の交付を申請しなければならない。

問題 62

24 歳の男性。幻聴を主訴に母親に連れられて来院した。昨日から「周りに人がいないのに、していることや考えていることを批判され、監視されているようだ。怖くて仕方がない」と苦痛を伴った幻聴を訴えるようになったため、精神科病院を受診した。この病院で 3 年前に統合失調症と診断され、通院中であった。患者はこの声が聞こえなくなるよう入院の上で治療して欲しいと訴えている。

適切な入院形式はどれか。

a　応急入院
b　臨時入院
c　任意入院
d　医療保護入院
e　緊急措置入院

問題 63

83 歳の男性。誤嚥性肺炎、脳梗塞による左片麻痺、脳血管性認知症および仙骨部褥瘡のため入院中である。寝たきりの状態で経口摂取が困難であり、経鼻経管栄養を行っている。肺炎は抗菌薬治療により改善し、在宅医療を担当する医師に診療情報提供を行うとともに、自宅への退院に向けて退院支援チームで相談をすることとなった。

正しい対応はどれか。**2 つ選べ**。

a　褥瘡チームの介入を中断する。
b　吸引器を自宅に準備してもらう。
c　看護師が胃管の挿入を家族に指導する。
d　主治医が退院後のケアプランを作成する。
e　ケアマネジャーが喀痰吸引を家族に指導する。

問題 64

WHO が現在取組んでいる重要課題に**あてはまらない**のはどれか。

a　感染症対策
b　たばこ対策
c　災害時の緊急対策
d　非感染性疾患<NCD>対策
e　ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ<UHC>

問題 65

78 歳の男性。健康診断で高血圧と脂質異常症を指摘された。4 年前に直腸癌の手術を受けている。喫煙は 25 本/日を 55 年間。身長 164 cm、体重 78 kg。家族で集まり男性の健康維持と治療方針について話し合っている。

男性へのアドバイスとして一次予防の趣意を**含まない**のはどれか。

a　「まずタバコをやめようよ」
b　「糖尿病を指摘されなくてよかったね」
c　「脂っこいものを控えないと癌が再発するよ」
d　「そういえばお兄さん、脳出血で亡くなったよね」
e　「コレステロールの薬をのまないと心臓病になるよ」

問題 66

じん肺法に基づく健康診断で必ず実施されるのはどれか。

a　喀痰細胞診
b　胸部単純 CT
c　スパイロメトリー
d　ツベルクリン反応検査
e　胸部エックス線直接撮影

問題 67

36 歳の初妊婦(1 妊 0 産)。妊娠 33 週 6 日。妊婦健康診査のため来院した。これまでの妊娠経過に異常を認めていなかった。脈拍 88/分、整。血圧 126/68 mmHg。**尿所見**：蛋白(−)、糖(−)。子宮底長 29 cm、腹囲 94 cm。内診で子宮口は閉鎖している。胎児推定体重 2,120 g、羊水指数<AFI> 18 cm。胎盤は子宮底部に位置している。職業は事務職である。明日から休業を申請するという。

この妊婦の休業を規定する法律はどれか。

a　健康増進法
b　母子保健法
c　母体保護法
d　労働基準法
e　労働安全衛生法

問題 68

保険医について正しいのはどれか。

a　医療法に規定されている。

b　医師免許を申請すれば、自動的に登録される。

c　保険診療に関する費用を任意に設定できる。

d　保険診療として健康診断を行うことができる。

e　保険診療を行うには医療機関も指定を受けていなければならない。

問題 69

在宅医療について正しいのはどれか。

a　緩和ケアは在宅医療の中で実施される。

b　緊急時に行う在宅医療は訪問診療である。

c　採血に利用した血液の付着したガーゼは一般廃棄物として処理する。

d　我が国では病院よりも在宅で死亡する高齢者が多い。

e　訪問看護を利用する場合は介護保険よりも医療保険が優先される。

問題 70

難民の帰還支援を行う国際機関はどれか。

a　JICA

b　UNESCO

c　UNHCR

d　UNICEF

e　WHO

問題 71

高齢者の誤嚥予防に有効なのはどれか。

a　顎を上げて食べる。

b　制吐薬を投与する。

c　腹臥位で食べる。

d　食べ物にとろみをつける。

e　食事を水分のみにする。

問題 72

70 歳の女性。腰痛を主訴に来院した。2 日前に屋内で段差につまずいて転倒した後から腰痛が出現した。歩行は可能である。下位腰椎に強い叩打痛がある。腰椎写真で第３腰椎の圧迫骨折を認める。

この患者の今後の生活に対する指導をする際に考慮する必要性が**低い**のはどれか。

a　フレイル

b　廃用症候群

c　サルコペニア

d　ホットフラッシュ

e　ロコモティブシンドローム

問題 73

高齢者が自室内において心停止状態で発見された。

外因死を最も強く示唆するのはどれか。

a　喀　血

b　便失禁

c　瞳孔不同

d　角膜混濁

e　鮮紅色の皮膚

問題 74

生後 4 か月の乳児。ぐったりしているとのことで母親に抱きかかえられて救急外来を受診した。児は呼吸、心拍および対光反射がなく、蘇生を試みたが反応なく、死亡が確認された。頭部や顔面に新旧混在した皮下出血の散在と両足底に多数の円形の熱傷痕とを認める。母親によるとこれまで病気を指摘されたことはなかったという。死後に行なった頭部 CT では、両側に硬膜下血腫を認める。

最も考えられるのはどれか。

a　虐待

b　血友病 A

c　細菌性髄膜炎

d　先天性心疾患

e　乳幼児突然死症候群<SIDS>

問題 75

4 歳の男児。5 日前から排便を認めないため、かかりつけ医を受診した。
排便を誘発するための処置を実施することにした。写真を下記（①～⑤）に示す。
この時使用するのはどれか。

①



②



③

④



⑤

a ①
b ②
c ③
d ④
e ⑤