

2023 年度 形成外科

次の文が正しければ①、誤りであれば②にマークしてください。

1. 一次治癒は、縫合糸などにより創縁を接着させる治癒形式である。
2. 閉鎖環境は創傷治癒に有利に働く。
3. 感染創には創傷被覆材が有用である。
4. 骨が露出した創傷に対しては、植皮術が最も良い適応である。
5. 分層植皮の方が全層植皮より生着しにくい。
6. レーザーには、熱凝固や蒸散作用がある。
7. 色素レーザーはヘモグロビンに高い吸収性を有し、血管性病変に対してよく用いられる。
8. 毛細血管奇形に対しては、硬化療法が行われることが多い。
9. 乳児血管腫は自然消退することもある。
10. 肥厚性瘢痕は創の範囲を超えて拡大する。
11. 塩酸による化学損傷をきたしたらまずアルカリ性の溶液で酸を中和する。
12. 深達性Ⅱ度熱傷は、1～2週間で治癒し、肥厚性瘢痕を残さない。
13. 錆びた釘等により受傷した汚染創は、破傷風などの感染に注意が必要である。
14. 小児の眼窩内骨折では、緊急手術の適応となることはない。
15. 顔面等の血流の良い部分は24時間以内に、体幹・四肢は6～8時間以内に縫合するのが望ましい。
16. 顔面骨骨折を疑いコンピュータ断層撮影検査を行う場合、水平断1方向の確認のみで良い。
17. 鼻骨骨折の整復においては、金属製のスクリューとプレートによる強固な固定が必須である。
18. ヒアルロン酸製剤は非吸収性注入材料である。
19. 皮下埋入金糸がアレルギーの原因となることもある。
20. 重瞼術における切開法は、ダウンタイムの点で埋没法よりも優れている。
21. 口唇裂の手術時期は生後3か月前後である。
22. 小耳症における耳介形成は、人口骨を用いることが多い。
23. 矢状縫合が早期癒合すると頭蓋が前後方向に延長しやすい。
24. 先天性眼瞼下垂症に対する吊り上げ術の移植材料として、大腿筋膜がよく用いられる。
25. 遊離皮弁では血管吻合の必要はない。
26. 先天異常や腫瘍切除、外傷などによって欠損した生体組織を再建する材料として、現在の医療技術では人工物が最も望ましい。
27. 再建手術においては、機能と同様に整容も考慮すべきである。
28. 病的共同運動は、陳旧性顔面神経麻痺の症状ではない。
29. 手指を再建する材料として足趾を用いることがある。
30. 日本における糖尿病患者は減少傾向にある。
31. 末梢動脈疾患による足潰瘍は趾先と踵部に形成しやすい。
32. 重症下肢虚血に対する血行再建術には、主に血管内治療と外科的バイパス術がある。
33. 褥瘡や熱傷瘢痕などは、有棘細胞癌の発生の危険因子となりうる。
34. リンパ浮腫となった四肢では、周径の増加や組織の硬化を認める。
35. リンパ節郭清術の既往がなければ、リンパ浮腫を発症することはない。