

2025 年度 形成外科

○×問題

- 問1 閉鎖療法では創傷がよく治癒する。
- 問2 二次治癒とは創傷の割線を縫合などで縫い合わせることである。
- 問3 咬傷は縫合して治療する。
- 問4 肥厚性瘢痕は創傷を超えて増殖する。
- 問5 感染創には創傷被覆材が有用である。
- 問6 手掌・足底は皮膚が厚いので必ず真皮縫合をする。
- 問7 骨が露出した創傷には植皮が有用である。
- 問8 分層植皮の方が全層植皮より生着しにくい。
- 問9 皮弁による再建では神経をつなぎ合わせることで、知覚が再獲得される場合がある。
- 問10 分層植皮の方が全層植皮より拘縮を起こしやすい。
- 問11 再建外科では機能だけでなく整容の再現も大事である。
- 問12 病的共同運動は陳旧顔面神経麻でおこることがある。
- 問13 足趾の再建に手指をお用いることがある。
- 問14 末梢神経障害が原因の足潰瘍に対し、血行再建術は必須である。
- 問15 血行再建術には主に血管内治療と外科的バイパス術がある。
- 問16 色素レーザーはメラニンによく反応する。
- 問17 乳児血管腫は放置していても自然消退しない。
- 問18 皮膚レーザー治療の合併症として、熱傷、炎症後色素沈着、色素脱失などが挙げられる。
- 問19 動静脈奇形では潰瘍や出血が生じることがある。
- 問20 口唇裂の手術は生後約 1 ヶ月で行われる。
- 問21 矢状縫合が早期癒合すると頭蓋が前後方向に延長しやすい。
- 問22 先天性眼瞼下垂症に対する吊り上げ術には大腿筋膜が移植材料としてよく使われる。
- 問23 ヒアルロン酸製剤は非吸収性注入材料である。
- 問24 鼻を高くする手術に肋軟骨が用いられる。
- 問25 埋没法では永久的に二重を作ることができる。
- 問26 鼻骨骨折の治療ではプレートによる強力な鼻腔内固定が必要である。
- 問27 眼高内骨折で複視が見られた場合、ただちに緊急手術が必要である。
- 問28 上顎骨骨折で特徴的な顔面の変形を Fish Bone Deformity という。
- 問29 顔面骨骨折を疑いコンピュータ断層撮影検査を行う場合、水平断 2 方向以上の CT を確認することが望ましい。

問30 褥瘡や熱傷瘢痕は有棘細胞癌の危険因子である。

問31 乳癌手術に併せて行われるリンパ郭清術はリンパ浮腫の原因の一つである。

問32 リンパ浮腫となった四肢では、周径の増加や組織の硬化を認める。

問33 塩酸による化学損傷は直ちにアルカリの溶液で酸を中和する。

問34 錆びた釘等により受傷した汚染創は、破傷風などの感染に注意が必要である。

問35 浅達性Ⅱ度熱傷は肥厚性瘢痕を残さない。