

形成外科 2021 試験

解答は Google form で確認済み

以下の文について○×で答えよ。

1. 顔面骨骨折の手術は 2～3 週間で行うことが多いが、眼窩内骨折ではそのタイプによっては緊急手術が必要な場合もある。

○

2. 末梢神経障害が主たる原因の足潰瘍に対し、血行再建術は必須である。

×

3. 形成外科の 4 本柱は、奇形、腫瘍、外傷、再建である。 *

×

4. ティッシュエキスパンダー法は、局所皮弁術の一つである。

○

5. 母指多指症の手術では機能面への配慮は不要である。 *

×

6. 分層植皮の方が全層植皮より生着しにくい。 *

×

7. 熱緩和時間よりも長い時間で照射すると、周辺組織への影響が少ない。

×

8. 褥瘡や熱傷瘢痕など慢性創傷は有棘細胞癌の危険因子の一つである。 * 2/2

○

9. レーザーの基本構成要素は、レーザー媒質、励起装置（励起源）、光共振器の三つである。

○

10. 口蓋裂の手術は言語獲得の少し前の 1 歳半を目安に行われる。 * 2/2

○

11. 乳癌手術に併せて行われるリンパ郭清術はリンパ浮腫の原因の一つである。 ☐
12. 皮弁による再建では神経をつなぎ合わせることで、知覚が再獲得される場合がある。 ☐
13. 鼻骨は顔面の中心軸に位置しているため、鼻骨骨折の整復においてはプレートによる強固な内固定が必要である。 * ☐
14. 皮膚良性腫瘍の外科的治療において皮弁作成術を行うことはない。 * 2/2 ☐
15. 動静脈奇形の stageⅢでは、潰瘍や出血が生じる。 * ☐
16. 仰臥位で最も体圧が高くなるのは仙骨部である。 * ☐
17. リンパ浮腫となった四肢は蜂窩織炎を起こしにくい。 * ☐
18. 顔面神経や耳下腺管の損傷は時間経過とともに改善するので放っておいても問題ない。 * ☐
19. 埋没耳、折れ耳等の軽微な耳介変形は非観血的矯正治療の適応がある。 * 2/2 ☐
20. アペルト症候群は頭蓋骨早期癒合症、中顔面低形成に合指症を伴う。 * 2/2 ☐
21. 局所皮弁(前進皮弁や回転皮弁)では必ずしも血管茎が含まれていない。 * 2/2 ☐

22. 遊離皮弁移植には吻合部血栓の危険性がある。 *

○

23. すべての人工物は、その合併症リスクを考えると、健康体への手術である美容外科で使うことは厳に慎むべきである。 *

×

24. 外傷性刺青は時間が経つと自然に消失する。 *

×

25. 褥瘡の好発部位は、1 番が仙骨部で 2 番が坐骨部である。 *

×

26. 植皮を行う場合は速やかな血流再開が必要なため、血管吻合を要する。 * 2/2

×

27. 単純な頬骨骨折により生じる咀嚼不全は、顎間固定が必要である。 * 2/2

×

28. 自家組織である脂肪は、美容外科手術の材料として安全なもので合併症の心配はしなくても良い。 *

×

29. 記録に残る最古の外科手術は、現在の形成外科・美容外科に通じる体表外科である。

○

30. 塩酸による化学損傷をきたしたらまずアルカリ性の溶液で酸を中和する。

×

31. 吻合できる脈管の最少口径は 1mm である。 *

×

32. 血行再建術には主に血管内治療と外科的バイパス術がある。 * 2/2

○

33. Burn Index は $1/2 \times \text{I 度熱傷の面積}(\%) + \text{II 度熱傷の面積}(\%)$ で計算する。 *

×

34. 熱傷の体表面積の診断では、小児は5の法則、成人は9の法則を用いる。

○

35. 乳児血管腫は通常消えることはない。 *

×