

2022 年度 形成外科

次の文が正しければ①、誤りであれば②にマークしてください。

1. 閉鎖環境は創傷治癒に有利に働く。
2. 真皮縫合は瘢痕の拡がりを防ぐ働きがある。
3. 一次治癒は、縫合糸などにより創縁を接着させる治癒方式である。
4. 骨が露出した創縁には植皮が有用である。
5. 分層植皮の方が全層植皮より拘縮を起こしやすい。
6. 皮膚レーザー治療の合併症として、熱傷、炎症後色素沈着、色素脱失などが挙げられる。
7. Q スイッチルビーレーザーはヘモグロビンに高い吸収性を有し、血管を破壊するため、血管性病変に対してよく用いられる。
8. 周囲の正常組織に対する影響を少なくするために、熱緩和時間よりも短い照射時間でレーザーを照射する。
9. 毛細血管奇形に対しては、硬化療法がよく行われる。
10. I 度熱傷は瘢痕を残さないで治癒する。
11. 酸やアルカリによる化学損傷をきたした場合はできるだけ早く長時間水で洗浄する。
12. 浅達性Ⅱ度熱傷の水疱底は白色である。
13. 表皮縫合には通常吸収糸を用いる。
14. 小児の眼窩内骨折で複視や眼球運動障害を認める場合、緊急手術の適応となることがある。
15. 顔面等の血流のよい部位は 24 時間以内に、体幹・四肢は 6～8 時間以内に縫合するのが望ましい。
16. 頬骨骨折では、咬合の再現が手術加療の要点である。
17. 上顎骨骨折で認められる特徴的な顔貌変形を fish face deformity という。
18. ボツリヌストキシンは、顔面の表情筋を減少させる。
19. b-FGF は線維芽細胞を刺激してコラーゲンを増生させるために、アンチエイジングに有効な薬剤として日本の薬事承認を取得した。
20. 重瞼術における切開法は、ダウンタイムの点で埋没法よりも優れている。
21. 口蓋裂の手術の目的は正常な言語の獲得である。
22. 小耳症における耳介形成は自家肋軟骨を用いて行う。
23. 矢状縫合が早期癒合すると頭蓋が前後方向に延長しやすい。
24. 先天性眼瞼下垂症に対する吊り上げ術には大腿筋膜が移植材料としてよく使われる。
25. 遊離植皮術では血管をつなぎ合わせる必要があり、遊離皮弁術では血管をつなぎ合わせる必要はない。
26. 現在の医療技術では、機能する（働く）筋を自家移植することができない。
27. 生活するうえで重要な機能と同様に、整容も再建手術の際には考慮するべきである。
28. 病的共同運動は、急性期顔面神経麻痺の症状である。
29. 先天異常や腫瘍切除、外傷などによって欠損した生体組織を再建する材料として、自家組織を用いることが多い。
30. 糖尿病患者は動脈硬化を発症しにくい。

31. 足部は難治性潰瘍を形成しやすい。
32. 末梢神経障害が主たる原因の足潰瘍に対し、血行再建術は必須である。
33. リンパ浮腫となった四肢は蜂窩織炎を起こしにくい。
34. 褥瘡や熱傷瘢痕などの慢性創傷は有棘細胞癌の危険因子の一つである。
35. 乳癌手術に併せて行われるリンパ郭清術はリンパ浮腫の原因の一つである。