

2024 年度 形成外科 本試験

次の文が正しければ①、誤りであれば②にマークしてください。

総論・一部、再建外科（5 問）

問 1. 創傷は身体の部位によって治りやすいものと治りにくいものがある。(形成外科総論)

問 2. 一次治癒は、縫合糸などにより創縁を接着させる治癒形式である。(形成外科総論)

問 3. ティッシュエキスパンダー法は、局所皮弁術の一つである。(形成外科総論・再建外科)

問 4. 皮膚欠損に対する手術では、遊離皮弁が第一選択になる。(形成外科総論・再建外科)

※新問。およそこんな文章だった。

問 5. 分層植皮の方が全層植皮より生着しやすい。(形成外科総論・再建外科)

レーザー・血管腫（4 問）

問 6. レーザーは媒質ごとに同じ波長をもつ。(レーザー・血管腫)

問 7. Q スイッチルビーレーザー (レーザー・血管腫)

Q スイッチルビーレーザーはヘモグロビンに高い吸収性を有し、
血管を破壊するため、血管性病変に対してよく用いられる。

問 8. 毛細血管奇形に対しては、硬化療法が行われることが多い。(レーザー・血管腫)

問 9. 乳児血管腫は自然消退することもある。(レーザー・血管腫)

創傷外科（4 問）

問 10. 肥厚性瘢痕は創の範囲を超えて拡大する。(創傷外科)

問 11. 塩酸による化学損傷をきたしたらまずアルカリ性の溶液で酸を中和する。(創傷外科)

問 12. 深達性Ⅱ度熱傷は、1～2 週間で治癒し、肥厚性瘢痕を残さない。(創傷外科)

問 13. 組織損傷の際は、挫滅の拡大を防ぐため、洗浄は最低限に留める。(創傷外科)

※新問。およそこんな文章だった。

顔面外傷（4問）

問 14. 小児の眼窩内骨折では、緊急手術の適応となることはない。（顔面外傷）

問 15. 顔面等の血流の良い部分は 24 時間以内に、体幹・四肢は 6～8 時間以内に縫合するのが望ましい。（顔面外傷）

問 16. 顔面神経や耳下腺管の損傷は時間経過とともに改善するので放っておいても問題ない。（顔面外傷）

問 17. 単純な頬骨骨折により生じる咬合不全は、顎間固定が必要である。（顔面外傷）

美容外科（3問）

問 18. ヒアルロン酸製剤は吸収性注入材料である。（美容外科）

問 19. 皮下埋入金糸がアレルギーの原因となることもある。（美容外科）

問 20. 脂肪を注入する際には、生着しやすくするように、脂肪を塊で入れる。（美容外科）

※新問。およそこんな文章だった。

先天異常（4問）

問 21. 口唇裂の手術時期は生後 1 歳前後である。（先天異常）

問 22. 小耳症における耳介形成は、人工骨を用いることが多い。（先天異常）

問 23. 矢状縫合が早期癒合すると頭蓋が前後方向に延長しやすい。（先天異常）

問 24. 睫毛内反症は上眼瞼にも生じうる。（先天異常）

※新問。およそこんな文章だった。

再建外科、（一部は総論とかぶる）（5問）

問 25. 血管吻合と神経吻合をすれば、遊離筋弁は植えられた場所で筋収縮できる。（形成外科総論・再建外科）

問 26. 生体組織の再建（再建外科）

先天異常や腫瘍切除、外傷などによって欠損した生体組織を再建する材料として、現在の医療技術では人工物が最も望ましい。

問 27. 再建手術においては、機能と同様に整容も考慮するべきである。（再建外科）

問 28. 病的共同運動は、急性期顔面神経麻痺の症状である。（再建外科）

問 29. 手指を再建する材料として足趾を用いることがある。（再建外科）

足病学（3問）

問 30. 重症下肢虚血に対する血行再建術には、主に血管内治療と外科的バイパス術がある。（足病学）

問 31. 末梢動脈疾患による足潰瘍は趾先と踵部に形成しやすい。（足病学）

問 32. 糖尿病患者は動脈硬化を発症しにくい。（足病学）

皮膚腫瘍外科・リンパ浮腫（3問）

問 33. 皮膚悪性腫瘍を切除する際は、傷を目立ちにくくするために、腫瘍辺縁を切除する。

（皮膚腫瘍外科・リンパ浮腫）

※新問。およそこんな文章だった。

問 34. リンパ節郭清術の既往がなければ、リンパ浮腫を発症することはない。（皮膚腫瘍外科・リンパ浮腫）

問 35. リンパ浮腫に対して外科的治療を行うことがある。（皮膚腫瘍外科・リンパ浮腫）

※新問。およそこんな文章だった。