

Tema 1. Incertidumbre y Decisiones Racionales

Ignacio Sanabria

Agosto 26

1. ¿Que es la teoría de juegos?

La teoria de juegos busca explicar la forma en que se toman decisiones racionales en el día a día.

Agente Racional: Un agente racional es aquel que busca siempre obtener su mayor utilidad.

1.1. Conceptos Básicos

- Triviales: no importan tanto, son superficiales.
- Trascendentales: Afectan mis pagos esperados a futuro.
- **Supuestos:** vitales para explicar un modelo. Un exceso de supuestos convierte el modelo en inexacto.

2. Basicos de Incertidumbre

Se platea un problema de decisión que incluye:

- Situaciones sobre las que se debe decidir.
- Conjunto de agentes económicos: Jugadores $J = \{\}$
- Conjunto de acciones a tomar: Acciones $A = \{\}$
- Conjunto de resultados: Resultados $R = \{\}$

Para que un problema de decisión tenga sentido, los agentes económicos deben tener preferencias sobre los resultados.

Estas vienen dadas por:

1. $x \succeq y \rightarrow$ Débilmente Preferido
2. $x \succ y \rightarrow$ Estrictamente preferido
3. $x \sim y \rightarrow$ Indiferente

3. Axiomas de Preferencias

1. **Axioma de Completitud:** Los agentes económicos siempre son capaces de ordenar sobre dos resultados.
No pueden quedar indiferentes ante dos resultados.
2. **Axioma de Transitividad:** Son capaces de ordenar todos los resultados. *Garantiza que no existen contradicción de elecciones de los jugadores.*

3.1. Paradoja de Condorcet 1785

Condorcet planteo que es posible al tener un grupo de agentes individualmente racionales, y ponerlos a tomar una decision en grupo, estos empiecen a tomar decisiones irracionales como grupo.

Sea $J = \{A, B, C\}$ un conjunto de estudiantes que deben elegir si prefieren un quiz teorico (t), practico (p), o mixto (m).

Con preferencias:

$$A: t \succ m \succ p$$

$$B: m \succ p \succ t$$

$$C: p \succ t \succ m$$

Si les pedimos votar obtendriamos:

$$t \text{ vs } m: t \succ m \quad A \text{ favor de } t: A, C$$

$$p \text{ vs } m: m \succ p \quad A \text{ favor de } m: A, B$$

$$t \text{ vs } p: p \succ t \quad A \text{ favor de } p: B, C$$

Sin embargo, esto rompe el **axioma de transitividad** dado que:

$$\begin{aligned} \text{Por transitividad: } & t \succ m \succ p \\ \text{pero la ultima votacion coloca: } & p \succ t \\ \therefore & t \succ p \Rightarrow \Leftarrow p \succ t \end{aligned}$$

4. Decisiones

A lo largo del curso las decisiones se verán representadas en arboles de decision, tal cual se muestra acontinuacion:

Figura 1: Arbol de Decision

4.1. Paradigma de la eleccion racional

Elegir la mejor accion del conjuntos A dadas su preferencias y restricciones. Tal que parten de $A \rightarrow X \Rightarrow$ Preferencias al respecto.

Para esto se establece una funcion de pago que viene a represetar la asociacion de preferencias de la eleccion.

La funcion de pagos esta dada por:

$$v(a) = u(x(a))$$

5. Incertidumbre

Los resultados estocasticos hacen rerenencia a la incertidumbre asociada a cada resultado.
Supuestos

1. Cada resultado se puede determinar objetivamente.
2. Los tomadores de decisiones se interesan en el resultado, no en el proceso para llegar a el.
3. $X \in R$, siendo R el conjunto finito de resultados.
4. cada posible resultado esta presente en la probabilidad.

A continuacion iremos trabajando un ejemplo con diversos conceptos relacionados.

Ejemplo

Ejemplo Proyecto de Investigacion y Desarrollo Parte 1 Una empresa E debe elegir si realizar (g) o no realizar (s) un proyecto de investigacion para mejorar su negocio. Ademas saben que en sus resultados X obtienen un 10 si resulta exitoso, y 0 si no.

Por lo tanto su conjunto de acciones (A) y resultados (X) es:

$$A = \{g, s\} \quad X = \{0, 10\}$$

Ademas se sabe que si deciden realizarlo g tienen un 10 % de probabilidad de obtener 10, y si deciden no realizarlo s tienen un 50 % de obtener 10.

Un arbol de decisiones se veria de la siguiente manera:

5.1. lotería Simple

Una lotería simple esta dada por un conjunto de resultados $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, se define una probabilidad $P = \{p(x_1), p(x_2), \dots, p(x_n)\}$ tal que

$$\sum_{k=1}^n p(x_k) = 1$$

La importancia de las loterías es marcar la presencia de la naturaleza en la toma de decisiones, estas al trabajar con probabilidades se basan en ideas basicas de las distribuciones de probabilidad.

5.1.1. Teorema de Bayes

Sea $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ un conjunto de eventos mutuamente excluyentes y exhaustivos, donde $P(A_i) > 0$. Y sea B un suceso del que se conocen sus probabilidades condicionales $P(B|A_i)$. Entonces el teorema de Bayes muestra que:

$$P(A_i|B) = \frac{P(B|A_i)P(A_i)}{P(B)}$$

5.2. lotería Compuesta

Cuando se tiene una lotería sobre una lotería, se clasifica como lotería compuesta.

Ejemplo

Ejemplo Proyecto de Investigación y Desarrollo. Parte 2

En este caso estamos cargando de probabilidad a la segunda lotería, podemos ver que la parte donde la naturaleza (N), ahora parte de nuevas probabilidades.

5.2.1. Lotería Simple Continua

Sobre el intervalo $X = \{\underline{x}, \bar{x}\}$ que viene de una Funcion de Distribucion Acumulada (FDA) $F : X \rightarrow [0, 1]$ donde $F(\hat{x}) = P(x \leq \hat{x})$ es la probabilidad de que un resultado sea menor o igual a $\hat{x}$.

Ejemplo

Ejemplo Proyecto de Investigación y Desarrollo. Parte 3

Ahora asumamos que existe un costo (c) por realizar (g) el proyecto de investigación, de forma que nuestro árbol de decisiones se vería así.

En este caso podemos ver la utilidad esperada para determinar cual es el C que pueda tomar la empresa.

$$\pi_s = 0,5 \cdot 10 + 0,5 \cdot 0 = 5$$

$$\pi_g = 0,625[0,9 \cdot (10 - c) + 0,1(0 - c)] + 0,375[0,5(10 - c) + 0,1(0 - c)]$$

$$\pi_g = 7,5 - c$$

Para ser congruentes se debe cumplir que:

$$\pi_g > \pi_s$$

$$7,5 - c > 5$$

$$2,5 > c$$

Por lo tanto descubrimos que el costo mínimo para decidir hacer o no la investigación es 2,5.

6. Axioma de Independencia

Se consideran cuatro loterías, tal que:

- Lotería I: resultados R con probabilidad de $1 - \alpha$ y P con probabilidad α .
- Lotería II: resultados R con probabilidad de $1 - \alpha$ y P con probabilidad α .
- Lotería III: resultados S con probabilidad de $1 - \beta$ y P con probabilidad β .
- Lotería IV: resultados S con probabilidad de $1 - \beta$ y Q con probabilidad β .

Establece que:

$$L_I > L_{II} \iff P > Q$$

$$L_{III} > L_{IV} \iff Q > P$$

Game Theory, Steven Tadelis

Según el libro, la ecuación de Euler caracteriza la senda óptima de consumo.

Comentario

El profesor enfatizó que esta condición solamente se cumple bajo determinadas condiciones de interioridad.

Importante

La tasa de interés afecta el costo de oportunidad del consumo presente.