

TRABAJO PRÁCTICO N°01

1)

d=m;	d=2.5	e=b/c;	e=2	s=3.0+4;	s=7.0	r=a+1.0;	r=8.0
d=n;	d=5.4	e=c/b;	e=0	0-1;	error	a++;	a=8
e=3.7;	e=3.7	r=a+b;	r=5	a=m;	a=2	r++;	r=9.0
d=a;	d=3	r=a/b;	r=1.5	a=m/2;	a=1	b --;	b=1
d=a+b;	d=5	r=a/2;	r=1.5	a=m/2.0	a=1	a+=5;	a = 13
d=a/b;	d=2	r=a/2.0;	r=1.5	a=3.0+4;	a= 7..0	s*=5;	s=35.0
d=a%b;	d=1	s+m=n;	error	0-1;	error		
d=a%2;	d=1	s=3+4-1	s=6.0	r=a+1;	r=8.0		

Variable	Salida
a	13
b	2
c	1
d	1
e	0
m	2.5
n	5.4
r	9.0
s	35.0

2) La salida sería:

```
8 -- 8.50
18
1
1
1
0
```

3) En la segunda vez que se ejecuta, no se vuelve a hacer el cálculo, por lo que daría el mismo resultado con diferente número.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(){
```

```
    int ecu, valor=0;
```

```
    ecu=valor*valor+1;
```

```
    printf ("Si el valor=%d, el resultado es =%d\n", valor, ecu);
```

```
    valor=2;
```

```
    ecu=valor*valor+1;
```

```
    printf ("Si el valor=%d, el resultado es =%d\n", valor, ecu);
```

```
    return 0;
```

```
}
```