

```
In [1]: from printer import Format
        from ga import Ga
        from sympy import symbols
```

```
In [2]: Format(ipy=True)
```

```
In [3]: coords = (x,y,z) = symbols('x,y,z',real=True)
        (o3d,ex,ey,ez) = Ga.build('e_x e_y e_z',g=[1,1,1],coords=coords)
```

```
In [4]: v = o3d.mv('v','vector')
```

```
In [5]: v.Fmt(3,'v')
```

$$v = v^x e_x + v^y e_y + v^z e_z$$

```
In [6]: V = o3d.mv('V','vector',f=True)
```

```
In [7]: V.Fmt()
```

$$V^x e_x + V^y e_y + V^z e_z$$

```
In [8]: gradV = o3d.grad*V
```

```
In [9]: gradV.Fmt(3,r'\nabla V')
```

$$\begin{aligned} \nabla V = & (\partial_x V^x + \partial_y V^y + \partial_z V^z) \\ & + (-\partial_y V^x + \partial_x V^y) e_x \wedge e_y \\ & + (-\partial_z V^x + \partial_x V^z) e_x \wedge e_z \\ & + (-\partial_z V^y + \partial_y V^z) e_y \wedge e_z \end{aligned}$$

```
In [10]: gradV.Fmt(2,r'\nabla V')
```

$$\begin{aligned} \nabla V = & (\partial_x V^x + \partial_y V^y + \partial_z V^z) \\ & + (-\partial_y V^x + \partial_x V^y) e_x \wedge e_y + (-\partial_z V^x + \partial_x V^z) e_x \wedge e_z + (-\partial_z V^y + \partial_y V^z) e_y \wedge e_z \end{aligned}$$

```
In [ ]:
```