

ДЗ 7 по Методам Оптимизации. Субградиент. Субдифференциал.

Соколов Игорь, группа 573

12 ноября 2017 г.

1

Докажите, что точка x_0 - является точкой минимума выпуклой функции $f(x)$ тогда и только тогда, когда $0 \in \partial f(x_0)$

Доказательство. \implies

Имеем: x_0 - точка минимума функции $f(x)$.

Тогда $\forall x \in \mathbb{R}^n \leftarrow f(x) - f(x_0) \geq 0$, что можно переписать в виде:

$$f(x) - f(x_0) \geq 0 = \langle 0_n, x - x_0 \rangle \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

$$\Rightarrow 0_n \in \partial f(x_0)$$

\Leftarrow

Имеем: x_0 такова, что $0_n \in \partial f(x_0)$

Тогда по определению субградиента

$$f(x) - f(x_0) \geq \langle 0_n, x - x_0 \rangle = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

Таким образом точка x_0 есть точка минимума функции $f(x)$ на \mathbb{R}^n □

2

Найти $\partial f(x)$, если $f(x) = \text{ReLU}(x) = \max\{0, x\}$

Решение:

$$\partial f = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x > 0 \\ ?, & x = 0 \end{cases}$$


Случай $x = 0$ требует более подробного рассмотрения.

Теорема о субдифференциале поточечного максимума:

Пусть $f_i(x)$ - выпуклые функции на открытом выпуклом множестве $S \subseteq \mathbb{R}^n$, $x_0 \in S$, а поточечный максимум определяется как $f(x) = \max_i f_i(x)$. Тогда:

$$\partial_S f(x_0) = \text{conv} \left\{ \bigcup_{i \in I(x_0)} \partial_S f_i(x_0) \right\}$$

где $I(x) = \{i \in [1 : m] : f_i(x) = f(x)\}$



В нашем случае $f_1(x) = 0$, $f_2(x) = x$

$\Rightarrow \partial f_1(0) = 0$, $\partial f_2(0) = 1$

$\Rightarrow \partial f(0) = \text{conv} \{ \{0\}, \{1\} \} = [0, 1]$

Ответ: $\partial f = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x > 0 \\ [0, 1], & x = 0 \end{cases}$

3

Найти $\partial f(x)$, если $f(x) = \|x\|_p$ при $p = 1, 2, \infty$

Решение:

- $p = 1$

Применим теорему Моро-Рокафеллара:

Пусть $f_i(x)$ - выпуклые функции на выпуклых множествах S_i , $i = \overline{1, n}$. Тогда, если $\bigcap_{i=1}^n \text{ri} S_i \neq \emptyset$ то функция $f(x) = \sum_{i=1}^n a_i f_i(x)$, $a_i > 0$ имеет субдифференциал $\partial_S f(x)$ на

множестве $S = \bigcap_{i=1}^n S_i$ и

$$\partial_S f(x) = \sum_{i=1}^n a_i \partial_{S_i} f_i(x)$$

$$\begin{aligned} \partial \|x\|_1 = & \mathbf{e}_1 \cdot \begin{cases} 1, & \text{если } x_1 > 0; \\ -1, & \text{если } x_1 < 0; \\ [-1, 1], & \text{если } x_1 = 0. \end{cases} + \mathbf{e}_2 \cdot \begin{cases} 1, & \text{если } x_2 > 0; \\ -1, & \text{если } x_2 < 0; \\ [-1, 1], & \text{если } x_2 = 0. \end{cases} + \dots + \\ & + \mathbf{e}_n \cdot \begin{cases} 1, & \text{если } x_n > 0; \\ -1, & \text{если } x_n < 0; \\ [-1, 1], & \text{если } x_n = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

где \mathbf{e}_i — единичный орт по оси $\mathbf{0x}_i$.

- $p = 2$

$$f(x) = \|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2} = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$$

$$\forall x \neq 0 \rightarrow f(x) \text{ является дифференцируемой функцией} \Rightarrow \partial f(x) = \nabla f(x) = \frac{x}{\|x\|}$$

- $p = \infty$

4

Найти $\partial f(x)$, если $f(x) = \|Ax - b\|_1^2$

5

Найти $\partial f(x)$, если $f(x) = e^{\|x\|}$