21 Grãos

correção e manutenção, número do cultivo e expectativa de rendimento; N pela matéria orgânica e pela cultura antecedente; leguminosas sem N

arroz de sequeiro · amendoim · aveia branca · aveia preta · canola · centeio · cevada · ervilha seca e forrageira · ervilhaca · feijão · girassol · linho · milho · milho pipoca · nabo forrageiro · painço · soja · sorgo · tremoço · trigo · triticale

18 Hortaliças

dose publicada por classe de teor de P e K, por cultura ou grupo de culturas

abóbora, abobrinha e moranga · alcachofra · alface, almeirão, chicória, rúcula e salsa · alho · aspargo · berinjela · beterraba e cenoura · brócolis e couve-flor · cebola · chuchu · ervilha · mandioquinha-salsa · melancia e melão · nabo e rabanete · pepino · pimentão · repolho · tomate

17 Frutíferas

três fases: pré-plantio, crescimento e produção; P e K de pré-plantio em tabela comum às frutíferas

abacateiro · ameixeira · amoreira-preta · bananeira · caquizeiro · citros · figueira · macieira · maracujazeiro · mirtileiro · morangueiro · nogueira-pecã · oliveira · pessegueiro e nectarineira · pereira · quivizeiro · videira

2 Tubérculos

dose por classe de teor

batata · batata-doce

1 Erva-mate

sem pH de referência: calagem por V% abaixo de 40%; programas de plantio e de recuperação

erva-mate

2 Cana e tabaco

cana-planta e cana-soca; tabaco Virgínia e Burley

cana-de-açúcar · tabaco

FORA DO ESCOPO DE RECOMENDAÇÃO

arroz irrigado · mandioca · espécies florestais (só aptidão) · forrageiras · palmeiras · medicinais, aromáticas e condimentares · ornamentais · sistemas especiais de produção