

例 7-1 某医院欲比较异梨醇口服液(试验组)和氢氯噻嗪 + 地塞米松(对照组)降低颅内压的疗效。将 200 例颅内压增高症患者随机分为两组, 结果见表 7-1。问两组降低颅内压的总体有效率有无差别?

表 7-1 两组降低颅内压有效率的比较

组别	有效	无效	合计	有效率(%)
试验组	99(90.48) <i>a</i>	5(13.52) <i>b</i>	104(<i>a</i> + <i>b</i>)	95.20
对照组	75(83.52) <i>c</i>	21(12.48) <i>d</i>	96(<i>c</i> + <i>d</i>)	78.13
合计	174(<i>a</i> + <i>c</i>)	26(<i>b</i> + <i>d</i>)	200(<i>n</i>)	87.00

例 7-2 某医师欲比较胞磷胆碱与神经节苷酯治疗脑血管疾病的疗效, 将 78 例脑血管疾病患者随机分为两组, 结果见表 7-2。问两种药物治疗脑血管疾病的有效率是否相等?

表 7-2 两种药物治疗脑血管疾病有效率的比较

组别	有效	无效	合计	有效率(%)
胞磷胆碱组	46	6	52	88.46
神经节苷酯组	18	8(4.67)	26	69.23
合计	64	14	78	82.05

例 7-3 某实验室分别用乳胶凝集法和免疫荧光法对 58 名可疑系统性红斑狼疮患者血清中抗核抗体进行测定, 结果见表 7-3。问两种方法的检测结果有无差别?

表 7-3 两种方法的检测结果

免疫荧光法	乳胶凝集法		合计
	+	-	
+	11(<i>a</i>)	12(<i>b</i>)	23
-	2(<i>c</i>)	33(<i>d</i>)	35
合计	13	45	58

例 7-4 某医师为研究乙肝免疫球蛋白预防胎儿宫内感染 HBV 的效果, 将 33 例 HBsAg 阳性孕妇随机分为预防注射组和非预防组, 结果见表 7-4。问两组新生儿的 HBV 总体感染率有无差别?

表 7-4 两组新生儿 HBV 感染率的比较

组别	阳性	阴性	合计	感染率(%)
预防注射组	4	18	22	18.18
非预防组	5(3)	6	11	45.45
合计	9	24	33	27.27

例 7-5 某单位研究胆囊腺癌、胆囊腺瘤的 P_{53} 基因表达, 对同期手术切除的胆囊腺癌、胆囊腺瘤标本各 10 份, 用免疫组化法检测 P_{53} 基因, 资料见表 7-6。问胆囊腺癌和胆囊腺瘤的 P_{53} 基因表达阳性率有无差别?

表 7-6 胆囊腺癌与胆囊腺瘤 P_{53} 基因表达阳性率的比较

病种	阳性	阴性	合计
胆囊腺癌	6(3.5)	4	10
胆囊腺瘤	1(3.5)	9	10
合计	7	13	20

例 7-6 某医师研究物理疗法、药物治疗和外用膏药 3 种疗法治疗周围性面神经麻痹的疗效, 资料见表 7-8。问 3 种疗法的有效率有无差别?

表 7-8 3 种疗法有效率的比较

疗法	有效	无效	合计	有效率(%)
物理疗法组	199	7	206	96.60
药物治疗组	164	18	182	90.11
外用膏药组	118	26	144	81.94
合计	481	51	532	90.41

例 7-7 某医师在研究血管紧张素 I 转化酶(ACE)基因 I/D 多态与 2 型糖尿病肾病(DN)的关系时, 将 249 例 2 型糖尿病患者按有无糖尿病肾病分为两组, 资料见表 7-9, 问两组 2 型糖尿病患者的 ACE 基因型总体分布有无差别?

表 7-9 DN 组与无 DN 组 2 型糖尿病患者 ACE 基因型分布的比较

组别	DD	ID	II	合计
DN 组	42(37.8)	48(43.3)	21(18.9)	111
无 DN 组	30(21.7)	72(52.2)	36(26.1)	138
合计	72(28.9)	120(48.2)	57(22.9)	249

例 7-8 测得某地 5801 人的 ABO 血型 and MN 血型结果如表 7-10, 问两种血型系统之间是否有关联?

表 7-10 某地 5801 人的血型

ABO 血型	MN 血型			合计
	M	N	MN	
O	431	490	902	1823
A	388	410	800	1598
B	495	587	950	2032
AB	137	179	32	348
合计	1451	1666	2684	5801