

Práctica de Álgebra y Geometría 1

Luciano N. Barletta & Iker M. Canut

March 22, 2020

Contents

1	Unidad 1: Números Complejos	3
1.1	Preámbulo	3
1.2	Demostraciones	3

1 Unidad 1: Números Complejos

1.1 Preámbulo

Definimos el conjunto de los números complejos de la siguiente manera:

$$\mathbb{C} = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$$

O sea que $\mathbb{C} = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

Dado un $z = (a, b) \in \mathbb{C}$, llamamos parte real de z al número real a y la notamos $\text{Re}(z) = a$. Análogamente llamamos parte imaginaria a b y la notamos $\text{Im}(z) = b$.

Definimos para todo $z = (a, b) \in \mathbb{C}$ y $w = (c, d) \in \mathbb{C}$:

$$z = w \Leftrightarrow a = c \wedge b = d$$

$$z + w = (a + c, b + d)$$

$$zw = (ac - bd, bc + ad)$$

1.2 Demostraciones

Conmutatividad de la suma

Sean $z = (a, b), w = (c, d) \in \mathbb{C}$

$$z + w =$$

<Definicion de suma de complejos>

$$(a + c, b + d) =$$

<Propiedad conmutativa de la suma de reales>

$$(c + a, d + b) =$$

<Definicion de suma de complejos>

$$w + z$$

□

Conmutatividad del producto

Sean $z = (a, b), w = (c, d) \in \mathbb{C}$:

$$zw =$$

<Definicion de producto de complejos>

$$(ac - bd, ad + cb) =$$

<Propiedad conmutativa de suma y producto de reales>

$$(ac - db, cb + da) =$$

<Definicion de producto de complejos>

$$wz$$

□

Asociatividad de la suma

Sean $z = (a, b), u = (c, d), w = (e, f) \in \mathbb{C}$:

$$z + (u + w) =$$

<Definicion de suma de complejos>

$$z + (c + e, d + f) =$$

<Definicion de suma de complejos>

$$(a + (c + e), b + (d + f)) =$$

<Propiedad asociativa de la suma de reales>

$$((a + c) + e, (b + d) + f) =$$

<Definicion de suma de complejos>

$$(a + c, b + d) + w =$$

<Definicion de suma de complejos>

$$(z + u) + w$$

□

Propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma

Por definición de igualdad de complejos, dados $z, w \in \mathbb{C}$

$$z = w \Leftrightarrow \operatorname{Re}(z) = \operatorname{Re}(w) \wedge \operatorname{Im}(z) = \operatorname{Im}(w)$$

llamemos $z = (a, b), u = (c, d), w = (e, f)$

Demostramos $\operatorname{Re}(z(uw)) = \operatorname{Re}((zu)w)$

$$\operatorname{Re}(z(uw)) =$$

<Def mult complejos>

$$(a\operatorname{Re}(uw)) - (b\operatorname{Im}(uw)) =$$

<Def mult complejos>

$$(a(ce - df)) - (b(cf + de)) =$$

<Distributiva>

$$(ace - adf) - (bcf + bde) =$$

<Propiedad -(a+b) = -a - b>

$$ace - adf - bcf - bde =$$

<Conmutativa>

$$ace - bde - adf - bcf =$$

<Distributiva>

$$(ac - bd)e - (ad + bc)f =$$

<Def mult complejos>

$$\operatorname{Re}(zu)e - \operatorname{Im}(zu)f =$$

<Def mult complejos>

$$\operatorname{Re}((zu)w)$$

Demostramos $\operatorname{Im}(z(uw)) = \operatorname{Im}((zu)w)$

$$\operatorname{Im}(z(uw)) =$$

<Def mult complejos>

$$(b\operatorname{Re}(uw)) + (a\operatorname{Im}(uw)) =$$

<Def mult complejos>

$$(b(ce - df)) + (a(cf + de)) =$$

<Distributiva>

$$bce - bdf + acf + ade =$$

<Conmutativa>

$$bce + ade + acf - bdf =$$

<Distributiva>

$$(bc + ad)e + (ac - bd)f =$$

<Def mult complejos>

$$\operatorname{Im}(zu)e + \operatorname{Re}(zu)f =$$

<Def mult complejos>

$$\operatorname{Im}((zu)w)$$

Reescribiendo:

$$\operatorname{Re}(z(uw)) = \operatorname{Re}((zu)w) \wedge \operatorname{Im}(z(uw)) = \operatorname{Im}((zu)w)$$

que por definición de igualdad de complejos implica

$$z(uw) = (zu)w$$

□

$$\exists (0, 0) \in \mathbb{C} / (0, 0) + z = z$$

Sea $z = (a, b) \in \mathbb{C}$:

$$(0, 0) + z =$$

<Definición de la suma de complejos>

$$(0 + a, 0 + b) =$$

<Existencia del elemento neutro de suma de reales>

$$(a, b) =$$

<Definición de número complejo>

$$z$$

□

$$\exists (1, 0) \in \mathbb{C} / (1, 0)z = z$$

$$\text{Sea } z = (a, b) \in \mathbb{C}:$$

$$(1, 0)z =$$

<Definición del producto de complejos>

$$(1a - 0b, 0a + 1b) =$$

<Existencia del elemento neutro del producto de reales>

$$(a - 0b, 0a + b) =$$

<a0 = 0>

$$(a - 0, 0 + b) =$$

<Existencia del elemento neutro de la suma de reales>

$$(a, b) =$$

<Definición de número complejo>

$$z$$

□

$$\forall z = (a, b) \exists w = (-a, -b) / z + w = (0, 0)$$

$$\text{Sea } z = (a, b), w = (-a, -b) \in \mathbb{C}$$

$$(0, 0) =$$

<Existencia del opuesto de la suma de reales>

$$(a + -a, b + -b) =$$

<Definición de suma de complejos>

$$(a, b) + (-a, -b) =$$

<sustituimos $z = (a, b)$, $w = (-a, -b)$ >

$$z + w$$

Por lo tanto:

$$\forall z = (a, b) \in \mathbb{Z} \exists w = (-a, -b) / z + w = (0, 0)$$

□

$$\forall z \neq (0, 0) \exists w / zw = (1, 0)$$

Llamemos $z = (a, b)$ y llamemos $w = (c, d)$.

Para que $zw = (1, 0)$, por definición de igualdad de complejos, tiene que ocurrir:

$$\text{Re}(zw) = 1 \wedge \text{Im}(zw) = 0 \quad (1)$$

Que exista algún w para todo z implica entonces que podamos escribir (c, d) en términos de (a, b) , basán-

donos en el siguiente sistema de ecuaciones:

$$ac - bd = 1 \quad (2)$$

$$bc + ad = 0 \quad (3)$$

$$ac - bd = 1 \quad (4)$$

$$bc = -ad \quad (5)$$

$$ac - bd = 1 \quad (6)$$

$$c = -\frac{ad}{b} \quad (7)$$

Continuamos con la ecuación de arriba

$$a\left(\frac{-ad}{b}\right) - bd = 1 \quad (8)$$

$$\left(\frac{-a^2}{b}\right)d - bd = 1 \quad (9)$$

$$\left(\frac{-a^2}{b} - b\right)d = 1 \quad (10)$$

$$\left(\frac{-a^2}{b} - \frac{b^2}{b}\right)d = 1 \quad (11)$$

$$\frac{-a^2 - b^2}{b}d = 1 \quad (12)$$

$$-\frac{a^2 + b^2}{b}d = 1 \quad (13)$$

$$d = -\frac{b}{a^2 + b^2} \quad (14)$$

Reemplazando en la de abajo

$$c = \left(-\frac{a}{b}\right)\left(-\frac{b}{a^2 + b^2}\right) \quad (15)$$

$$c = \frac{a}{b} \frac{b}{a^2 + b^2} \quad (16)$$

$$c = \frac{a}{a^2 + b^2} \quad (17)$$

La demostración queda entonces: $\forall z = (a, b) \neq (0, 0)$, supongo un $w = \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, -\frac{b}{a^2 + b^2}\right)$ y muestro que $zw = (1, 0)$

$$zw = \left(a\frac{a}{a^2 + b^2} - b\frac{-b}{a^2 + b^2}, b\frac{a}{a^2 + b^2} + a\frac{-b}{a^2 + b^2}\right) \quad (18)$$

$$\left(\frac{a^2}{a^2 + b^2} + \frac{b^2}{a^2 + b^2}, \frac{ba}{a^2 + b^2} - \frac{ab}{a^2 + b^2}\right) \quad (19)$$

$$\left(\frac{a^2 + b^2}{a^2 + b^2}, \frac{ba - ab}{a^2 + b^2}\right) = (1, 0) \quad (20)$$

$$\therefore \forall z = (a, b) \neq (0, 0), \exists w = \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, -\frac{b}{a^2 + b^2}\right) / zw = (1, 0)$$

□

Llamamos \mathbb{C}_0 al conjunto $\{z \mid z = (a, 0) \in \mathbb{C}, \forall a \in \mathbb{R}\}$.

Definimos $z - w = z + (-w)$.

Definimos $\frac{z}{w} \text{ con } w \neq (0, 0), zw^{-1}$

Suma cerrada en \mathbb{C}_0

Sean $z = (a, 0), w = (b, 0) \in \mathbb{C}_0$

$$z + w =$$

<Definición de suma de complejos>

$$(a + b, 0 + 0) =$$

$$(a + b, 0) =$$

si llamamos $a + b = c$, entonces $(c, 0) \in \mathbb{C}_0$ por definición

□

Producto cerrado en \mathbb{C}_0

Sean $z = (a, 0), w = (b, 0) \in \mathbb{C}_0$

$$zw =$$

<Definición de producto de complejos>

$$(ab - 0 \cdot 0, 0b + 0a) =$$

$$(ab, 0 + 0) =$$

$$(ab, 0) =$$

si llamamos $ab = c$, entonces $(c, 0) \in \mathbb{C}_0$ por definición

□

Producto cerrado en \mathbb{C}_0

Sean $z = (a, 0), w = (b, 0) \in \mathbb{C}_0$

$$zw =$$

<Definición de producto de complejos>

$$(ab - 0 \cdot 0, 0b + 0a) =$$

$$(ab, 0 + 0) =$$

$$(ab, 0) =$$

si llamamos $ab = c$, entonces $(c, 0) \in \mathbb{C}_0$ por definición

□

Opuesto y recíproco cerrado en \mathbb{C}_0

Sea $z = (a, 0) \in \mathbb{C}_0$

$$-z = (-a, 0) \in \mathbb{C}_0$$

Sea $z = (a, 0) \neq (0, 0) \in \mathbb{C}_0$

$$z^{-1} = (a^{-1}, 0) \in \mathbb{C}_0$$

□

Cociente cerrado en \mathbb{C}_0

Sean $z = (a, 0), w = (b, 0) \neq (0, 0) \in \mathbb{C}_0$

$$\frac{z}{w} =$$

$$zw^{-1}$$

<Definición de cociente de complejos>

Como el producto es cerrado en \mathbb{C}_0 , $\frac{z}{w} \in \mathbb{C}_0$

□

Notamos la correspondencia:

$$x \in \mathbb{R} \leftrightarrow (x, 0) \in \mathbb{C}_0$$

Ahora definimos:

$$i = (0, 1)$$

$\forall (a, b) \in \mathbb{C}$, (a, b) puede escribirse $a + bi$

$$(a, b)$$

<Definición de suma de complejos>

$$(a, 0) + (0, b)$$

$$(a, 0) + (0 - 0, 1b + 0)$$

$$(a, 0) + (0, b - 1, 0, 1b + 0.0)$$

<Definición de producto de complejos>

$$(a, 0) + (b, 0)(0, 1)$$

<Definición de i >

$$(a, 0) + (b, 0)i$$

<Notación de elementos de \mathbb{C}_0 >

$$a + bi$$

□

Entonces usaremos esta notación para referirnos a este tipo de números complejos, $\forall a, b \in \mathbb{R}$:

$$(a, 0) = a \tag{21}$$

$$(0, b) = bi(a, b) = a + bi \tag{22}$$

$$\tag{23}$$

La última se llama notación binómica de los números complejos.

$$i^2 = -1$$

$$i^2 =$$

<Definición de cuadrado>

$$i \cdot i =$$

<Definición de i >

$$(0, 1)(0, 1) =$$

<Definición de producto de complejos>

$$(0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1)$$

De esto resulta el número complejo $(-1, 0)$, que representa al número real -1 . Notamos que hacer raíz cuadrada de ambos lados nos deja $\pm i = \sqrt{-1}$. □

Fun Fact

$$a \in \mathbb{R}, a < 0, z^2 = a \Leftrightarrow z = \pm \sqrt{|a|}i$$

Sabemos que $z^2 = a$, pero por definición de valor absoluto

$$z^2 = -|a|, z^2 = -1|a|$$

Al hacer raíz cuadrada de ambos lados

$$\pm z = \sqrt{-1|a|}$$

Que reescribiendo sería

$$z = \mp \sqrt{|a|}\sqrt{-1}$$

Finalmente por definición de i

$$z = \pm \sqrt{|a|}i$$

□

Dado $z = a + bi$, llamamos conjugado de z al número complejo $a - bi$ y lo notamos \bar{z} .