

Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura

Departamento de Matemática - Escuela de Ciencias Exactas y Naturales

ANÁLISIS MATEMÁTICO II

Licenciatura y Profesorado en Física, Licenciatura en Ciencias de la Computación, Licenciatura y Profesorado en Matemática - Año 2020

Práctica 5: Aplicaciones del cálculo diferencial.

1. Represente gráficamente las siguientes funciones y halle, si es posible sus extremos relativos y absolutos.

i)
$$f_1: [-1,0) \longrightarrow \mathbb{R}$$
 tal que $f_1(x) = 2 - 2x^2$;

$$ii)$$
 $f_2:(-3,1) \longrightarrow \mathbb{R}$ tal que $f_2(x) = 2x^2 + 3x - 2;$

$$f_3:[0,2)\longrightarrow \mathbb{R}$$
 tal que $f_3(x)=-x^2+2x-2$;

$$iv)$$
 $f_4: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ tal que $f_4(x) = x^2 + |2 - 4x| + 1$;

$$i) \quad f_{1}: [-1,0) \longrightarrow \mathbb{R}$$
 tal que $f_{1}(x) = 2 - 2x^{2};$

$$ii) \quad f_{2}: (-3,1) \longrightarrow \mathbb{R}$$
 tal que $f_{2}(x) = 2x^{2} + 3x - 2;$

$$iii) \quad f_{3}: [0,2) \longrightarrow \mathbb{R}$$
 tal que $f_{3}(x) = -x^{2} + 2x - 2;$

$$iv) \quad f_{4}: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$
 tal que $f_{4}(x) = x^{2} + |2 - 4x| + 1;$

$$v) \quad f_{5}(x) = \begin{cases} \cos(2x) & \text{si } x \ge 0, \\ \arctan x & \text{si } x < 0; \end{cases}$$
 $vi) \quad f_{6}(x) = \begin{cases} x^{3} + 1 & \text{si } x \le 0, \\ \frac{1}{2}|x - 2| & \text{si } x > 0. \end{cases}$

- 2. Sea la función $f(x) = ax^2 + bx + 1$. Determine los valores de a y b de manera que el máximo absoluto de f sea 3 y alcance el mismo en x = 1.
- 3. Determine para qué valores de a y b la función $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 2$ tiene un máximo relativo en x = -3 y un mínimo relativo en x = -1.
- 4. Sea $k \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$. Muestre que la función $f: \mathbb{R}^+ \longrightarrow \mathbb{R}$ con $f(x) = x^k kx$ posee un extremo relativo en x = 1, tratándose de un máximo relativo si 0 < k < 1 y de un mínimo relativo si k > 1.
- 5. Halle los valores máximos y mínimos absolutos de las siguientes funciones en el intervalo indicado en cada caso:

$$i) \quad f_1(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x \quad \text{en} \quad [0,3]; \quad ii) \quad f_2(x) = x^2 + \frac{16}{x} \qquad \text{en} \quad [1,3];$$

$$iii) \quad f_3(x) = x\sqrt{1-x} \qquad \text{en} \quad [-1,1]; \quad iv) \quad f_4(x) = x - \sin x \qquad \text{en} \quad [-\pi,\pi];$$

$$v) \quad f_5(x) = \frac{\cos x}{2 + \sin x} \qquad \text{en} \quad [0,2\pi]; \quad vi) \quad f_6(x) = (x-1)^{1/3} + \frac{1}{2}(x+1)^{2/3} \qquad \text{en} \quad [-2,7].$$

$$f_3(x) = x\sqrt{1-x}$$
 en $[-1,1]$; $iv) f_4(x) = x - \sin x$ en $[-\pi, \pi]$;

v)
$$f_5(x) = \frac{\cos x}{2 + \sin x}$$
 en $[0, 2\pi]$; vi) $f_6(x) = (x - 1)^{1/3} + \frac{1}{2}(x + 1)^{2/3}$ en $[-2, 7]$.

6. Calcule los siguientes límites:

a)
$$\lim_{x \to 2} \frac{3x^2 + 2x - 16}{x^2 - x - 2}$$
, b) $\lim_{x \to 3} \frac{x^2 - 4x + 3}{2x^2 - 13x + 21}$, c) $\lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{senh} x - \operatorname{sen} x}{x^3}$,

b)
$$\lim_{x \to 3} \frac{x^2 - 4x + 3}{2x^2 - 13x + 21}$$
,

c)
$$\lim_{x\to 0} \frac{\sinh x - \sin x}{x^3}$$
,

d)
$$\lim_{x \to 0} \frac{(2x-1)e^x - x - 2}{x^3}$$
, e) $\lim_{x \to 0} \frac{\ln(\cos(ax))}{\ln(\cos(bx))}$, f) $\lim_{x \to 0^+} \frac{x - \sin x}{(x \sin x)^{\frac{3}{2}}}$,

$$e) \lim_{x\to 0} \frac{\ln(\cos(ax))}{\ln(\cos(bx))},$$

$$f) \lim_{x \to 0^+} \frac{x - \sin x}{(x \sin x)^{\frac{3}{2}}},$$

g)
$$\lim_{x \to a^+} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a} + \sqrt{x - a}}{\sqrt{x^2 - a^2}}$$
,

$$g) \lim_{x \to a^+} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a} + \sqrt{x - a}}{\sqrt{x^2 - a^2}}, \quad h) \lim_{x \to 0} \frac{\arcsin(2x) - 2 \arcsin x}{x^3}, \quad i) \lim_{x \to 1^+} \frac{x^x - x}{1 - x + \ln x}.$$

i)
$$\lim_{x \to 1^+} \frac{x^x - x}{1 - x + \ln x}$$

$$j) \lim_{x \to 0^+} \frac{\left(a \arctan \frac{\sqrt{x}}{a} - b \arctan \frac{\sqrt{x}}{b}\right)}{x\sqrt{x}}, \quad k) \lim_{x \to 1} \frac{\sum\limits_{k=1}^n x^k - n}{x-1}, \qquad \quad l) \lim_{x \to +\infty} \frac{a^x}{x^b}, \quad a > 1,$$

$$k) \lim_{x \to 1} \frac{\sum_{k=1}^{n} x^k - n}{x - 1},$$

$$l) \lim_{x \to +\infty} \frac{a^x}{x^b}, \quad a > 1,$$

$$m) \lim_{x \to 0^+} \left[\frac{\ln x}{(1+x)^2} - \ln \left(\frac{x}{1+x} \right) \right]$$

m)
$$\lim_{x \to 0^+} \left[\frac{\ln x}{(1+x)^2} - \ln \left(\frac{x}{1+x} \right) \right],$$
 n) $\lim_{x \to +\infty} \frac{\cosh(x+1)}{e^x},$ o) $\lim_{x \to 0^+} x^{x^x} - 1.$

- 7. ¿Para qué valores de las constantes a y b es $\lim_{x\to 0} (x^{-3}\sin(3x) + ax^{-2} + b) = 0$?
- 8. Halle c de modo que $\lim_{x \to +\infty} \left(\frac{x+c}{x-c} \right)^x = 4$.
- 9. Represente gráficamente una función que satisfaga simultáneamente las condiciones dadas en cada caso.

a)
$$g(-1) = 4$$
, $g(1) = 0$, $g'(-1) = 0$, $g'(1)$ no existe, $g'(x) > 0$ si $|x| > 1$, $g'(x) < 0$ si $|x| < 1$, $g''(x) < 0$ si $|x| \neq 1$.

b)
$$f'(2) = 0$$
, $f'(0) = 1$, $f'(x) > 0$ si $0 < x < 2$, $f'(x) < 0$ si $x > 2$, $f''(x) < 0$ si $0 < x < 4$, $f''(x) > 0$ si $x > 4$, $\lim_{x \to +\infty} f(x) = 0$, $f(-x) = -f(x)$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

c) Suponga que f'(x) > g'(x) para todo x y que f(a) = g(a). Demuestre que f(x) > g(x) para x > a y f(x) < g(x) para x < a.

Busque un ejemplo donde se muestre que lo anterior no es válido sin la hipótesis f(a) = g(a).

- d) Suponga que f es continua y derivable en [0,1], que f(x) está en [0,1] para todo x y que $f'(x) \neq 1$ para todo $x \in [0,1]$. Demuestre que existe exactamente un $x_0 \in [0,1]$ tal que f(x) = x.
- e) Demuestre que si f y g son convexas y f es creciente, entonces $g \circ f$ es convexa.

- 10. Para cada una de las siguientes funciones se pide:
 - a) determine el dominio de f y estudiar su paridad;
 - b) determine los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y la existencia de extremos relativos;
 - c) determine los intervalos de concavidad y de convexidad y la existencia de puntos de inflexión;
 - d) analice la existencia o no de asíntotas horizontales y/o verticales para f;
 - e) construya un boceto de la gráfica de f utilizando la información de los items anteriores;
 - f) analice la existencia de máximo o mínimo absoluto para esta función.

$$ii) f(x) = x^3 - 4x,$$

$$ii) f(x) = (x - 1)^2 (x + 2),$$

$$iii) f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 5,$$

$$iv) f(x) = 2 + (x - 1)^4,$$

$$v) f(x) = x + \frac{1}{x^2},$$

$$vi) f(x) = \frac{1}{(x - 1)(x - 3)},$$

$$vii) f(x) = \frac{x}{1 + x^2},$$

$$viii) f(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2 - 9},$$

$$ix) f(x) = \sec^2 x,$$

$$x) f(x) = x - \sec x,$$

11. Suponga que f es una función tal que f'(x) = 1/x para todo x > 0 y que f(1) = 0. Demuestre que f(xy) = f(x) + f(y) (sin usar la función vista en apunte anterior!).

 $xii) f(x) = \ln(x^2 + x + 1).$

Ayuda: Halle g'(x) cuando g(x) = f(xy).

 $xi) f(x) = x e^x$,

- 12. Demuestre que entre todos los rectángulos de igual perímetro, el de mayor área es el cuadrado.
- 13. Convengamos en medir las alturas hacia arriba desde el nivel del suelo. Si s(t) representa la posición de un cuerpo en tiempo t al ser arrojado hacia arriba, entonces su aceleración es $s''(t) = -9, 8m/s^2$.
 - a) Si se lanza un cuerpo con velocidad inicial v_0m/s y a 1 metro del suelo, ¿a qué altura llegará?
 - b) ¿Cuál será su velocidad al tocar el suelo? (calcule una velocidad inicial de modo que el golpe en la mano no sea muy duro, suponiendo que su mano está a 1 m del suelo...)

3

c) ¿Cuánto tardará en llegar al suelo?