

# Производная через предел

$$f(x) = x^2$$

$$1) f(x_0) = x_0^2 ; f(x_0 + \Delta x) = (x_0 + \Delta x)^2 = x_0^2 + 2x_0\Delta x + \Delta x^2$$

$$2) \Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = x_0^2 + 2x_0\Delta x + \Delta x^2 - x_0^2 = 2x_0\Delta x + \Delta x^2$$

$$3) f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2x_0\Delta x + \Delta x^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} 2x_0 + \Delta x = 2x_0$$

## Основные правила нахождения производных

1.  $(c \cdot f)' = c \cdot f'$ ,  $c$  - константа

$$(c)' = 0, c - \text{const}$$

2.  $(u \pm v)' = u' \pm v'$

3.  $(uv)' = u'v + uv'$

4.  $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

5.  $(f(g))' = f' \cdot g'$

$$y = f(x^n)' = n \cdot x^{n-1} = \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$
$$(x^3)' = 3x^2; (\sqrt{x})' = (x^{\frac{1}{2}})' = \frac{1}{2} x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$(ax + b)' = (ax)' + (b)' = a$$

$$(ax^2 + bx + c)' = 2ax + b$$

# Таблица производных

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = (x^{-1})' = -1 \cdot x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$$

$$f(\sin x)' = \cos x$$

$$f(x_0) = \sin x_0, f(x_0 + \Delta x) =$$

$$= \sin x_0 + \sin \Delta x$$

$$\Delta y = \sin(x + \Delta x) - \sin(x) = 2 \sin \frac{x + \Delta x - x}{2} \cos \frac{x + \Delta x + x}{2} =$$

## Справочные материалы

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

$$1. c' = 0, c = \text{const}$$

$$2. (x^n)' = nx^{n-1}$$

$$3. (a^x)' = a^x \cdot \ln a$$

$$4. (e^x)' = e^x$$

$$5. (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$6. (\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$7. (\sin x)' = \cos x$$

$$8. (\cos x)' = -\sin x$$

$$9. (\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$10. (\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$11. (\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

$$12. (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$13. (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$14. (\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$15. (\operatorname{arcc} \operatorname{tg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

$$16. (\operatorname{sh} x)' = \operatorname{ch} x$$

$$17. (\operatorname{ch} x)' = \operatorname{sh} x$$

$$18. (\operatorname{th} x)' = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$$

$$19. (\operatorname{th} x)' = -\frac{1}{\operatorname{sh}^2 x}$$

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2 \sin \frac{\Delta x}{2} \cos \frac{2x + \Delta x}{2}}{\Delta x} =$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{\Delta x}{2}}{\frac{\Delta x}{2}}$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \cos \frac{2x + \Delta x}{2} = 1 \cdot \cos \frac{2x + 0}{2}$$

$$\cos x$$

$$y = \sin x$$

$$y = f(x) \Rightarrow f'(x) = \cos x$$

$$y = (\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\tan x)' = \left( \frac{\sin x}{\cos x} \right)' = \frac{\cos x}{-\sin x} = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$(\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

# <https://studfile.net/preview/2868310/page:14/>

Определение: нормалью к плоской кривой  $\gamma$  в т.  $M_0$  называется перпендикуляр к касательной к кривой  $\gamma$  в этой точке.

Угловые коэффициенты двух перпендикулярных прямых связаны соотношением  $k_2 = -1/k_1$ . Отсюда получаем уравнение нормали к графику  $f(x)$  в точке  $x_0$ :

$$n: y - y_0 = -1/f'(x_0)(x - x_0)$$

Пусть  $u = u(x)$  и  $v = v(x)$  - функции, определенные в некоторой окрестности точки  $x$  и имеют производные в этой точке. Обозначим  $\Delta u = u(x + \Delta x) - u(x)$  и  $\Delta v = v(x + \Delta x) - v(x)$  приращения этих функций, соответствующие приращению  $\Delta x$ . Эти формулы можно записать в виде  $u(x + \Delta x) = u + \Delta u$  и  $v(x + \Delta x) = v + \Delta v$

Теорема: производная суммы (разности) равна сумме (разности) производных:  $(u + v)' = u' + v'$

Производная произведения  $(uv)' = u'v + u v'$ , в частности, постоянную можно выносить за знак производной:  $(Cv)' = Cv'$



$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

1.  $(c \cdot f)' = c \cdot f'$ ,  $c$  - константа

2.  $(u \pm v)' = u' \pm v'$

3.  $(uv)' = u'v + uv'$

4.  $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

5.  $(f(g))' = f' \cdot g'$

$$1) (x^5 + 4x^3 - 7x^2 + 6)' = 5x^4 + 12x^2 - 14x$$

$$2) \left( \frac{1}{x\sqrt{x}} + \sqrt[7]{x^2} \right)' = \left( x^{-\frac{3}{2}} + x^{\frac{2}{7}} \right)' = -\frac{3}{2}x^{-\frac{5}{2}} + \frac{2}{7}x^{-\frac{5}{7}}$$

$$= \frac{2}{7\sqrt[7]{x^5}} - \frac{3}{2\sqrt{x^5}} = \frac{2}{7\sqrt[7]{x^5}} - \frac{3}{2x^2\sqrt{x}} +$$

$$3) \left( \frac{x}{1+x^2} \right)' = \frac{x'(1+x^2) - x(1+x^2)'}{(1+x^2)^2} = \frac{1 \cdot (1+x^2) - x(2x)}{(1+x^2)^2} = \frac{1+x^2-2x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}$$

+

## Правило дифференцирования сложной функции

$$f(t(x))' = f'(t(x)) \cdot t'(x) \quad \sqrt{2-x} \cdot \sqrt{2+x} = \sqrt{2^2 - x^2} = 2 - x$$

## Правило дифференцирования обратной функции

$$y_x'(x) = \frac{1}{x_y'}$$

$$f'(2-x) = 1 - \frac{2}{\sqrt{2-x}} \quad (+)$$

$$y = \left( \frac{2}{\sqrt[3]{x}} - 3x^2 \log_3 x + \frac{e^x}{5\sqrt{x}} \right)'$$


$$f(x) = x - 4\sqrt{x}, \text{ найти max } f'(4); f'(0,01); f'(2-x)$$

$$f(x)' = 1 - 4 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = 1 - \frac{2}{\sqrt{x}} \quad (+) \quad f'(4) = 0; f'(0,01) = 1 - \frac{2}{\sqrt{0,01}} = 1 - \frac{2}{0,1} = -19$$



$y = f(x)$  кривая

AM — касательная в (.)  $M(x_0, y_0)$



$$y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$$

$$y = f(x_0) \text{ и } M(x_0, y_0)$$

$$f'(x_0) = \operatorname{tg} \alpha, \alpha - \text{угол касательной}$$

Пример:  
 $f(x) = x^2, M(-3, 9)$

$$f'(x) = 2x$$

$$x_0 = -3$$

$$\operatorname{tg} \alpha = f'(-3) = 2x_0 = 2 \cdot (-3) = -6$$

$$f(x) = \frac{4x - x^2}{4}; M_1(0;0); M_2(2,1) \quad M_3(4;0)$$

$$f'(x) = \frac{4x}{4} - \frac{x^2}{4} = \left(x - \frac{x^2}{4}\right)' = 1 - \frac{1}{4} \cdot 2x = 1 - \frac{1}{2}x$$

$$\text{tg} \alpha_1 = f'(0) = 1$$

$$\text{tg} \alpha_2 = f'(2) = 0$$

$$\text{tg} \alpha_3 = f'(4) = -1$$

(+)

$$\left( \frac{3}{\sqrt[3]{9x^2 - 16}} \right)' = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{(9x^2 - 16)^2}} \cdot (9x^2 - 16)' = (*)$$

$$u^n(x)' = n \cdot u^{n-1}(x) \cdot u'_x(x)$$

$$(au - bv)' = a \cdot u' - b \cdot v'$$

$$= (*) = \frac{1}{3 \sqrt[3]{9x^2 - 16)^2}} \cdot (9 \cdot 1x^2)' - 16)'_x$$

$$= \frac{1 \cdot 9 \cdot 2x}{3 \sqrt[3]{9x^2 - 16)^2}} = \frac{6x}{\sqrt[3]{(9x^2 - 16)^2}}$$

1.  $(c \cdot f)' = c \cdot f'$ ,  $c$  - константа

2.  $(u \pm v)' = u' \pm v'$

3.  $(uv)' = u'v + uv'$

4.  $\left( \frac{u}{v} \right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

5.  $(f(g))' = f' \cdot g'$



## Уравнение нормали

Нормаль к графику ф-ции  $y=f(x)$  в точке  $\{x_0; f(x_0)\}$  называется прямая проходящая через данную точку перпендикулярно касательной к графику ф-ции в этой точке.

Нормаль - перпендикулярная к касательной прямая, проходящая через точку касания

Если существует конечная и отличная от 0 производная отличная от  $x_0$ , то уравнение нормали к графику функции  $y = f(x)$  в точке  $\{x_0, f(x_0)\}$

$$y - f(x_0) = f'(x_0) \cdot (x - x_0) \quad \text{Уравнение касательной}$$

Если существует бесконечная производная то касательная будет параллельная оси OY,

$$f'(x_0) = \pm \infty$$

уравнение касательной  $x - x_0 = 0$

уравнение нормали


$$y - f(x_0) = -\frac{1}{f'(x_0)} (x - x_0)$$

$$f(x) = \sqrt[3]{x}$$

$$f'(x) = \frac{1}{3 \sqrt[3]{x^2}}$$


Критическая точка  $x_0=0$ , где производная обращается в  $\inf$

$f'(x_0)$  не существует общей касательной



$$f(-x) = f(x)$$

четность по определению



$$y = f(x) = \sqrt{\frac{6-x^2}{3}} \quad \text{взяли } x_0 = -\sqrt{3}$$

→ составим уравнение касательной

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$



$$f(x_0) = f(1-\sqrt{3}) = \sqrt{\frac{6 - (-\sqrt{3})^2}{3}} = \sqrt{\frac{3}{3}} = 1$$

$$f'(x) = \left( \frac{6-x^2}{3} \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot (\sqrt{6-x^2})' = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{6-x^2}} \cdot (-2x)$$

$$\frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{6-x^2}} \cdot (-2x) = -\frac{x}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{6-x^2}}$$

правило дифференцирования сложной функции

$$f'(x_0) = f'(1-\sqrt{3}) = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{6 - (-\sqrt{3})^2}} = \frac{1}{\sqrt{6-3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$f(x_0) = 1$$

$$f'(x_0) = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) = 1 - \frac{1}{\sqrt{3}}(x - 1 + \sqrt{3})$$

$$\sqrt{3}(y-1) = x + \sqrt{3}$$

$$\sqrt{3}y - \sqrt{3} = x + \sqrt{3}$$

$$K: x - \sqrt{3}y + 2\sqrt{3} = 0$$

$$y - f(x_0) = -\frac{1}{f'(x_0)} \cdot (x - x_0)$$


$$y - 1 = -\frac{1}{\sqrt{3}} (x - (1 - \sqrt{3}))$$

$$y - 1 = -\sqrt{3}(x + \sqrt{3})$$

$$y - 1 = -\sqrt{3}x - 3$$

$$n: \sqrt{3}x + y + 2 = 0$$

Implied:  $K: x - \sqrt{3}y + 2\sqrt{3} = 0$   
 $n: \sqrt{3}x + y + 2 = 0$



$$y = \sqrt{\frac{5-x^2}{3}}$$

Касательная к графику ф-ции - это предельное положение секщей, стремящейся к точке  $X_0$ .

$$f'(x_0) = \left( \tan \frac{\pi}{4} \right)' = (1)' = 0$$

2)  $y = f(x) = \tan \frac{x}{4}$  ;  $x_0 = \pi$  ;

1)  $y_0$  - e крив.

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$

$$y - f(x_0) = 0$$

касательная параллельна оси OX

$\Rightarrow$  нормаль параллельна оси OY


$\Rightarrow$  уравнение нормали

$$x - x_0 = 0$$



производная существует в точке  $X_0$  и бесконечна. Те  $f'(X_0) = \pm \infty$ .

Касательная парал-на ОХ, нормаль парал-на ОУ. Ур-е нормали  $y - f(x_0) = 0$ .



$$f(x) = -2x - x^2$$

$$x_0 = -1$$

$$\begin{array}{l} x: -1; 1; -2; 0 \\ y: 1; -3; 0; 0 \end{array}$$

$$f(x_0) = -2 \cdot (-1) - (-1)^2 = 2 - 1 = 1$$

$$f'(x) = (-2x - x^2)' = -2 - 2x$$

$$f'(x_0) = -2 - 2(-1) = 0$$

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$

$$y - 1 = 0 \quad | \quad x - (-1)$$

$$K: y - 1 = 0 \quad \text{— ур кас-ой}$$

Ур-е нормали при кас парал оси ОХ

$$x - x_0 = 0$$

$$x - (-1) = 0$$

$$n: x + 1 = 0 \quad \text{— ур-е нормали}$$

# Анализ функций с пом производных или применение производной при исследовании функции

1) Достаточным условием возрастания, убывания ф-ции(монотонности )

если для  $f$  на промежутке  $I$  выполняется условие  $f' > 0$  в каждой точке из  $I$ , то  $f$  возрастает на  $\{I\}$ .  $\nrightarrow$  иначе  $f' < 0$  - функция убывает

2) Экстремумы функции

точки в которых производная функции  $= 0$  или не существует - КРИТИЧЕСКИЕ ТОЧКИ

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЭКСТРЕМУМА(ПО КРИТЕРИЮ ТЕОРЕМЫ ФЕРМА) не гарантирует существование экстремума

1. если точка  $X_0$  - т-ка экстремума для  $f(x)$  и в этой т-ке суц. производная  $f'(x_0) = 0$

Первое ДОСТАТОЧНОЕ УСЛОВИЕ СУЩ-Я ЭКСТРЕМУМА

Если  $f(x)$  - непрерывна в точке  $x_0$  и  $x' > 0$  на интервале от  $(a; x_0)$  и  $f'(x) < 0$  на  $(x_0; b)$ , то  $x_0$  - максимум ф-ции  $(a, b)$

Если  $f(x)$  - непрерывна в точке  $x_0$  и  $x' < 0$  на интервале от  $(a; x_0)$  и  $f'(x) > 0$  на  $(x_0; b)$ , то  $x_0$  - мин ф-ции  $(a, b)$

Если при переходе через точку  $X_0$ , производная меняет знак с  $+$  на  $-$ , то производная точка МАКС. Если с  $-$  на  $+$ , то точка МИН



$$y = f(x) = 3x - x^3$$

Найти участки убывания и возрастания ф-ии на ее D(F)  
и экстремумы

$$1) f'(x) = 3 - 3x^2$$

$$2) f'(x) = 0 \Leftrightarrow$$

$$3 - 3x^2 = 0$$

$$-3x^2 = -3 \quad | : -3$$

$$x^2 = 1$$

$$x_1 = 1$$

$$x_2 = -1$$

Критические точки (где  $f'(x) = 0$  или не сущ-ет)

$x$	$(-\infty; -1)$	$-1$	$(-1; 1)$	$1$	$(1; +\infty)$
$f'(x)$	$-$	$0$	$+$	$0$	$-$
$f(x)$	$\searrow$	$3(-1) - (-1)^3 = -2$	$\nearrow$	$2$	$\searrow$
		$\min$		$\max$	

$$D(f) = (-\infty; +\infty)$$

$$y_{\min} = f(-1) = -3 + 1 = -2$$

$$y_{\max} = f(1) = 3 - 1 = 2$$

## Второе достаточное условие существования экстремума

Если для ф-ции  $f$  в точке  $C$  вып-ся условие  $f'(C)=0$  и  $f''(C)>0$ , то  $C$  - точка MIN для  $f(x)$ .

ИНАЧЕ если  $f'(C)=0$  и  $f''(C)<0$ , то  $C$  - точка MAX для  $f(x)$

$\exists f'(x), f(x)$  непрерывна на  $[a; b]$  и  $f(x)=0 \forall x \in C$

Если во всех точках  $[a; b]$   $f''(x) > 0$ , ТО значение ф-ции в т-ке  $C$ , явл-ся наименьшим значением на отрезке от  $[a, b]$ .

Иначе Если во всех точках  $[a; b]$   $f''(x) < 0$ , ТО значение ф-ции в т-ке  $C$ , явл-ся наибольшим значением на отрезке от  $[a, b]$



—

$y = x^3 - 3x$

