

1 Теория вероятностей.

Монетка:

$\Omega = \{O; P\}$. Ω — множество элементарных исходов; \leq счетное.

Случайное событие: $A \subset \Omega$.

$P: \Omega \rightarrow \mathbb{R}_+$:

1. $P(x) \geq 0$
2. $\sum_{x \in \Omega} P(x) = 1$

(Ω, P) — вероятностное пространство.

Вероятность события A — $P(A) = \sum_{x \in A} P(x)$.

Случайное событие — измеримое подмножество вероятностного пространства.

Сумма событий — объединение множеств.

Произведение событий — пересечение множеств.

$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB)$.

$P(A + B + C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(BC) - P(AC) + P(ABC)$.

Опр. A и B называются независимыми, если $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$.

Пример:

Ω_1 и Ω_2 — вероятностные пространства.

$\Omega_1 \times \Omega_2$ — вероятностное пространство.

$A \subset \Omega_1$ — случайное событие.

$P(x, y) = P_1(x) \cdot P_2(y)$.

$P_1(A) = P(A \times \Omega_2)$.

$AB \leftrightarrow (A \times \Omega_2) \cap (\Omega_1 \times B) = A \times B$.

A, B, C — независимы, если $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$.

События A_1, A_2, \dots, A_n независимы, если $\forall A_{i_1}, \dots, A_{i_k}$ верно $P(A_{i_1}A_{i_2} \dots A_{i_k}) = \prod_{j=1}^k P(A_{i_j})$.

Опр. Условная вероятность. $P(A|B)$ — вероятность A при условии, что B произошло.

Теорема. Формула полной вероятности. Пусть A_1, A_2, \dots, A_n — система попарно несовместимых событий, в сумме дающих достоверное. Тогда для любого события B выполнена формула $P(A) = \sum_{i=1}^k P(A|B_i) \cdot P(B_i)$. Доказательство:

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}.$$

$$P(A) = \sum_{i=1}^k P(AB_i).$$

1.1 Случайные величины.

Опр. Ω — вероятностное пространство, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. f называется случайной величиной.

Пример:

Бросаем кубик. $\Omega = 1, 2, 3, 4, 5, 6$, $p(x) = \frac{1}{6}$. $f(1) = 1, f(2) = 2$, и т. д.

На \mathbb{R} введем структуру вероятностного пространства: $1 - \frac{1}{6}, 2 - \frac{1}{6}, 3 - \frac{1}{6}, 4 - \frac{1}{6}, 5 - \frac{1}{6}, 6 - \frac{1}{6}$, остальные 0.

Опр. $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R} \Rightarrow$ на \mathbb{R} вводится структура вероятностного пространства. $\forall x \in \mathbb{R} P_{\mathbb{R}}(x) = P_{\Omega}(f^{-1}(x))$.

Опр. Распределение случайной величины f — структура вероятностного пространства на \mathbb{R} .

Стандартное распределение:

1. Дискретное равномерное. $x_1 - \frac{1}{n}, x_2 - \frac{1}{n}, \dots, x_n - \frac{1}{n}$.

2. Распределение Бернулли.

$$f(x) = \begin{cases} 1 & p \\ 0 & q = 1 - p \end{cases}$$

$$f = \sum_{i=1}^n f_i.$$

$$0 - q^n, 1 - C_n^1 p q^{n-1}, \dots, n.$$

$$P(f(x) = k) = C_n^k \cdot p^k \cdot q^{n-k}.$$

3. Геометрическое распределение. Бросаем неравновесную монетку до выпадения орла. Случайная величина — количество испытаний.

$$P(f(x) = k) = q^{k-1} \cdot p.$$

4. Распределение Пуассона.

$$P(f = k) = \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda}. e \approx 2.718281828459045, \lambda > 0.$$

5. Гипергеометрическое распределение. В сосуде N белых шаров и M черных. Мы не глядя вытаскиваем n шаров без возвращения. Случайная величина — количество белых шаров.

$$P(f = k) = \frac{C_N^k \cdot C_M^{n-k}}{C_{N+M}^n}.$$

Опр. Сложение. $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $g : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$.

Опр. $f(x) = a$ — случайное событие.

Опр. f и g независимые, если $\forall A, B \in \mathbb{R} : P(f(x) \in A; g(x) \in B) = P(f(x) \in A) \cdot P(g(x) \in B)$. Или: $P(f(x) = a; g(x) = b) = P(f(x) = a) \cdot P(g(x) = b)$.