

№ 1 (1.4 [Каргальцев]) Для любого числа $u \in \mathbb{C}$ определим множество $\mathbb{Z}[u] = \cup_{n=0}^{\infty} \{a_0 + a_1 u + \dots + a_n u^n \mid a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}\}$.

► а) Докажите, что $\mathbb{Z}[u]$ является областью целостности.

То, что $\mathbb{Z}[u]$ кольцо проверяется непосредственно. Поскольку $\mathbb{Z}[u] \subset \mathbb{C}$ и \mathbb{C} — область целостности (потому что \mathbb{C} — поле), то и $\mathbb{Z}[u]$ область целостности.

б) При каких $u \in \mathbb{C}$ данное $\mathbb{Z}[u]$ “конечномерно над \mathbb{Z} ”, то есть найдётся такое N , что $\mathbb{Z}[u] = \cup_{n=0}^{\infty} \{a_0 + a_1 u + \dots + a_n u^n \mid a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}\}$?

Покажем, что $\mathbb{Z}[u]$ “конечномерно над \mathbb{Z} ”, $\Leftrightarrow \exists f \in \mathbb{Z}[x] : f(u) = 0, f \neq 0$ и старший коэффициент $f(x)$ равен 1 (*).

\Rightarrow

Поскольку $u^{N+1} \in \mathbb{Z}[u] \Rightarrow \exists a_0, \dots, a_N \in \mathbb{Z} : u^{N+1} = \sum_0^N a_k u^k \Rightarrow u$ — корень $f(x) = x^{N+1} - \sum_0^N a_k x^k$

\Leftarrow

Пусть u — корень многочлена $f(x) = x^N + \sum_0^{N-1} a_k x^k$, удовл. условию (*). Тогда u^N выражается через меньшие степени. ($u^N = -\sum_0^{N-1} a_k u^k$)

Индукцией по $k \geq N$ легко показать, что u^k выражается через $1, u, \dots, u^{N-1}$.

$(u^{k+1} = u \cdot u^k \xrightarrow{\text{предположение индукции}} u \cdot (\sum_0^{N-1} b_k u^k) = (\sum_1^{N-1} b_{k-1} u^k) + b_{N-1} u^N \xrightarrow{\text{база индукции}} (\sum_1^{N-1} b_{k-1} u^k) + b_{N-1} \sum_0^{N-1} -a_k u^k)$

◀

№ 2. (1.2) Для комплексного числа $z \in \mathbb{C}$ введём норму $N(z) = |z|^2$.

а) $N(zw) = N(z)N(w)$.

Для каждого $z \in D$:

б) Верно ли, что $N(z)$ — натуральное число?

в) Верно ли, что $N(z) = 1 \Leftrightarrow z$ — обратим?

г) Какие неразложимые элементы имеют одинаковую норму?

► а) Просто проверим: $N(zw) = N(a_z + b_z i)(a_w + b_w i) = N(a_z a_w - b_z b_w + (a_z b_w + a_w b_z)i) = (a_z a_w - b_z b_w)^2 + (a_z b_w + a_w b_z)^2 = (a_z^2 + b_z^2)(a_w^2 + b_w^2) = N(z)N(w)$

б) Заметим, что $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$

Значит, $|a + bi| = a^2 + b^2 \in \mathbb{N}$. Аналогично:

$\mathbb{Z}[2i] = \{a + 2bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\} \Rightarrow |a + 2bi| = a^2 + 4b^2 \in \mathbb{N}$

$\mathbb{Z}[\sqrt{2}i] = \{a + \sqrt{2}bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\} \Rightarrow |a + \sqrt{2}bi| = a^2 + 2b^2 \in \mathbb{N}$

$\mathbb{Z}[\sqrt{3}i] = \{a + \sqrt{3}bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\} \Rightarrow |a + \sqrt{3}bi| = a^2 + 3b^2 \in \mathbb{N}$

в) \Rightarrow

$N(z) = a^2 + b^2 = 1$

$\frac{1}{z} = \frac{1}{a+bi} = \frac{a-bi}{a^2+b^2} = \frac{a-bi}{1} = a-bi = \bar{z}$, а z и \bar{z} одновременно лежат в D , значит $\exists z^{-1} = \bar{z}$.

\Leftarrow

$zz^{-1} = 1 \Rightarrow \begin{cases} N(zz^{-1}) = N(z)N(z^{-1}) = 1 \\ N(z) = a^2 + b^2 \geq 1 \end{cases} \Rightarrow N(z) = 1$

г) TODO

◀

№ 3 Пример нефакториального кольца вида $\mathbb{Z}[u]$.

► Пример: $\mathbb{Z}[2i]$ не является факториальным кольцом, потому что $4 = 2 \cdot 2 = (2i)(-2i)$, но при этом $2 \not\sim 2i$ — противоречие с единственностью разложения в факториальном кольце.

Еще пример: $\mathbb{Z}[\sqrt{3}i]$ (аналогичное рассуждение $4 = 2 \cdot 2 = (1 + \sqrt{3}i)(1 - \sqrt{3}i)$). ◀

№ 4 (2.7 [Каргальцев]) Простой элемент области целостности является неразложимым.

► Пусть p — простой и $p = xy \Rightarrow x|p \wedge y|p$. Из определения простоты $p|x \vee p|y$. Но тогда или $x|p \wedge p|x$, или $y|p \wedge p|y$. Тогда $p \sim y \vee p \sim x \Rightarrow y \in K^* \vee x \in K^*$, то есть p — неразложимый. ◀

№ 5 (2.8) В факториальном кольце любой неразложимый элемент является простым.

► Пусть $x = ab$ — неразложимый. $x = ab \Rightarrow x|ab$.

x неразложимый, значит б.о.о. $a \in K^*$. Тогда в силу единственности разложения $x = ab = ap_1 \dots p_k \Rightarrow x \sim b \Rightarrow x|b$. ◀

№ 6 (часть 2.9 [Каргальцев]) K — евклидово кольцо. Верно ли, что если для $a, b \neq 0$ выполнено равенство $N(ab) = N(a)$, то b обратим?

► Поделим a с остатком на ab :

$$a = abq + r : r = 0 \vee N(r) < N(ab)$$

.

$$r = a(1 - bq)$$

.

Если $r = 0$, то $bq = 1$ и b обратим. Иначе $N(ab) > N(r) = N(a(1 - bq)) \geq N(a) = N(ab)$. Противоречие. ◀

№ 7 (2.10) Геометрический способ доказательства того, что $\mathbb{Z}[i]$, $\mathbb{Z}[\omega]$ — евклидово кольцо.

► ВСТАВИТЬ КАРТИНКУ Пусть $a, b \in \mathbb{Z}[i]$. Поделим a на b с остатком:

$$a = pb + q.$$

Надо доказать, что если $q \neq 0$, то $N(q) < N(b)$. Рассмотрим точку $\frac{a}{b}$, пусть ближайший к ней узел в решетке p , тогда $\frac{a}{b} = p + \frac{q}{b}$. Но $\frac{q}{b}$ по модулю меньше половины диагонали единичного квадрата $\left|\frac{q}{b}\right| \leq \left|\frac{\sqrt{2}}{2}\right| \leq 1$, т.е. $|q|^2 < |b|^2 \Rightarrow N(q) < N(b)$, если $\frac{q}{b}$ не совпадает с центром квадрата.

(TODO иначе)

$\mathbb{Z}[\omega]$ аналогично. ◀

№ 10 (2.7 [Каргальцев]) Если $z \in D$, $z|x$, и $N(z) = N(x)$, то $z \sim x$.

► Пусть $x = yz$. Тогда $N(yz) = N(z) \Rightarrow y$ обратим (по №6) и, значит, $x \sim z$. ◀

№ ?? [Каргальцев]

► а) Если z — неразложимый элемент D , то существует такое простое целое число p , что $N(z) = p$ или $N(z) = p^2$. $N(z) = z\bar{z}$. Разложим $N(z)$ в произведение простых как натуральное число:

$$z\bar{z} = N(z) = p_1^{\alpha_1} \cdot \dots \cdot p_n^{\alpha_n}.$$

Так как z неразложим, а D — евклидово, то z — прост, значит $\exists k : z|p_k$.

$p_k = zu \Rightarrow p_k = \overline{p_k} = \overline{zu} \Rightarrow \bar{z}|p_k \Rightarrow N(z)|p_k^2 \Rightarrow N(z) = 1, p_k$ или p_k^2 . Но так как если $N(z) = 1$, то z — обратим (а, следовательно, неразложим), то $N(z) = p_k \vee N(z) = p_k^2$.

б) Если z — неразложимый элемент D и $N(z) = p^2$, то $z \sim p$.

Пусть $\bar{z} = ab \Rightarrow z = \overline{ab} \Rightarrow \bar{z}$ — неразложим.

$z\bar{z} = N(z) = p \cdot p$. В силу единственности разложения на неразложимые, $z \sim p$.

в) Если $N(z) = p$, то z — неразложимый элемент D .

в $Da|b \Rightarrow N(a)|N(b)$.

Пусть $a|z \Rightarrow N(a)|N(z)$. В силу простоты $N(z)$ либо $N(a) = 1$ и, следовательно, a — обратимый, либо $N(a) = N(z)$ и тогда $a \sim z$. То есть z неразложим.

г) Пусть p — простое целое число. Тогда есть два варианта: либо p неразложимо в D , либо $p = z\bar{z}$, где z — неразложимо в D . Таким образом описываются все неразложимые элементы D .

Пусть p разложимо в D . Тогда найдется такой неразложимый $z : z|p$. Поскольку z не ассоциирован с p , $N(z) \neq N(p) \Rightarrow N(z) = p$. Тогда z — неразложимый и $z\bar{z} = N(z) = p$.

Любой неразложимый элемент D — либо простое целое число, либо его норма — простое целое число. ◀

№ 11 (3.3 [Каргальцев]) (Простые гауссовы числа) Пусть p — простое целое число.

► а) Если $p = 4k + 3$, то p — неразложим в $\mathbb{Z}[i]$.

Если p разложим, тогда $p = z\bar{z} = Re^2z + Im^2z$. Но число, дающее остаток 3 при делении на 4 не может быть представлено в виде суммы двух квадратов (квадраты дают остаток 1 при делении на 4).

б) Если $p = 4k + 1$, то p — разложим в $\mathbb{Z}[i]$.

Если $p = 4k + 1$, то -1 — вычет по модулю p , т. е. $\exists x \in \mathbb{Z} : p|x^2 + 1 \Rightarrow p|(x+i)(x-i)$. Если p — неразложим, тогда p — прост и или $p|(x+i)$, или $p|(x-i)$. В любом случае, т.к. x — целое в силу задачи 18 из задач на 3-4 $p|1$, что плохо. Значит, p разложим.

в) Если $p = 4k + 1$, то $p = z\bar{z}$, где z — неразложим в $\mathbb{Z}[i]$.

Следует из предыдущего пункта и пункта г) предыдущей задачи.

г) Неразложимые элементы $\mathbb{Z}[i]$, не описанные в предыдущих пунктах — $\pm 1 \pm i$.

Неразложимые элементы, не описанные в предыдущих задачах могут иметь норму или 2, или 4. Норму 4 имеет только 2 и ассоциированные с ней, но $2 = (1+i)(1-i)$.

С другой стороны, $N(\pm 1 \pm i) = 2$, то есть силу пункта в) предыдущей задачи $\pm 1 \pm i$ неразложимы. ◀

№ 25 [Каргальцев] Докажите, что в кольце главных идеалов любая возрастающая цепочка идеалов

$$(a_1) \subset (a_2) \subset \dots \subset (a_n) \subset \dots$$

стабилизируется, то есть найдется такое k , то $(a_k) = (a_{k+1}) = \dots$

► Поскольку $(a_i) \subset (a_{i+1}) \Rightarrow a_{i+1}|a_i$.

Возьмем $I = \bigcup_{k=1}^{\infty} (a_k)$. покажем, что I — идеал. Пусть $a \in I, b \in I \Rightarrow \exists k_1, k_2 : a \in (a_{k_1}), b \in (a_{k_2})$. Тогда положим $k = \max(k_1, k_2)$. $a, b \in (a_k) \Rightarrow (a+b) \in (a_k) \subset I$ — идеал $\Rightarrow (a+b) \in I$. Аналогично $\forall x \in K, xa \in (a_k) \Rightarrow xa \in I$.

Поскольку K — КГИ, то существует $x : I = (x)$. $x \in I \Rightarrow \exists k : x \in (a_k)$. Но $a_k \in (x)$. Тогда $x|a_k \wedge a_k|x \Rightarrow x \sim a_k$. Но в силу вложенности это верно и для всех $j > k$, то есть $\forall j \geq k, a_j \sim a_k \Rightarrow (a_j) = (a_k)$. То есть цепочка действительно стабилизируется. ◀