

№ 1 (1.1) Для любых  $a, b, c \in K$  выполнены равенства

$\forall a, b, c \in K$ :

а)  $a0 = 0a = 0$

►  $a0 = a(0 + 0) = a0 + a0 \Rightarrow a0 = 0$

$0a = 0$  — аналогично. ◀

б)  $a(-b) = (-a)b = -ab$

►  $0 = a0 = a(b - b) = ab + a(-b) \Rightarrow -ab = a(-b)$  ◀

с)  $(a - b)c = ac - bc$  и  $a(b - c) = ab - ac$

►  $(a - b)c + bc = (a - b + b)c = ac \Rightarrow (a - b)c = ac - bc$

$a(b - c) + ac = a(b - c + c) = ab \Rightarrow a(b - c) = ab - ac$  ◀

№ 2(1.2)

а) В кольце не может быть двух различных единиц.

►  $1_1 \underbrace{=}_{\text{т. к. } 1_2 \text{ — единица}} 1_1 \cdot 1_2 \underbrace{=}_{\text{т. к. } 1_1 \text{ — единица}} 1_2$  ◀

б) Пусть кольцо с единицей содержит не меньше двух элементов. Тогда  $1 \neq 0$ .

►  $\forall a \in K \underbrace{a}_{\text{св-во } 1} = a \cdot e \underbrace{=}_{\text{св-во } 0} 0$  ◀

с) Может ли элемент ассоциативного кольца иметь более одного обратного элемента?

► Пусть  $a_1 \neq a_2$  — обратные к  $a$  элементы. Тогда  $a_1 a a_2 = \begin{cases} a_1 \cdot 1 = a_1 \\ 1 \cdot a_2 = a_2 \end{cases}$

Получается, они равны. ◀

№ 3(1.3, 2.4) Уметь отвечать на вопросы: является ли данное кольцо  $K$  коммутативным? ассоциативным? кольцом с единицей? областью целостности? полем? евклидово кольцо? Какие в  $K$  есть обратимые элементы? неразложимые? простые?

№ 4 (2.1(в)) Обратимый элемент кольца не может быть делителем нуля.

► Пусть  $a \in K$  обратим,  $\exists a^{-1} \in K : aa^{-1} = 1$ . Если  $a$  — делитель нуля, то  $\exists 0 \neq b \in K : ab = 0$ . Тогда  $a^{-1}ab = \begin{cases} a^{-1} \cdot 0 = 0 \\ 1 \cdot b = b \neq 0 \end{cases}$ . Противоречие. ◀

№ 5(2.1(д)) Если  $K$  — кольцо без делителей нуля, то возможно сокращение: если  $ac = bc$  и  $c \neq 0$ , то  $a = b$ .

►  $ac = bc \Leftrightarrow (a - b)c = 0 \Rightarrow$  т. к. нет делителей нуля и  $c \neq 0$ , д. б.  $a - b = 0$ , т. е.  $a = b$ . ◀

№ 6(2.1(г)) В конечном коммутативном кольце если ненулевой элемент не является делителем нуля, то он обратим.

► Кольцо конечно  $\Rightarrow$  его элементы можно занумеровать:  $a_1, \dots, a_n$ . Элементы  $a \cdot a_1, \dots, a \cdot a_n$  должны быть все разные (иначе  $\forall i \neq j, a \neq 0 \ a \cdot a_i = a \cdot a_j \Rightarrow \underbrace{a}_{\neq 0} \underbrace{(a_i - a_j)}_{\neq 0, \text{ т. к. } i \neq j} = 0$ , т. е.  $a$  — делитель нуля).

Тогда  $\exists i : a \cdot a_i = 1$ , т. к.  $1 \in K$  (т. е.  $a \cdot a_1, \dots, a \cdot a_n$  —  $n$  разных элементов кольца, а в кольце всего  $n$  элементов; значит, какое-то  $aa_i$  должно быть 1). ◀

№ 7 Конечная область целостности (состоящая из более чем одного элемента) — поле.

► В области целостности нет делителей нуля, а если в конечном коммутативном кольце элемент — не делитель нуля, то он обратим (№6). Т. е. все элементы обратимы.

Имеем  $\geq 2$  элементов по условию. ◀

№ 8 Множество  $K^*$  обратимых элементов коммутативного кольца  $K$  является группой по умножению. Она называется мультипликативной группой, или группой обратимых элементов кольца  $K$ .

► Пусть  $K$  — кольцо,  $a, b \in K^*$ . Тогда  $\exists a^{-1}, b^{-1} \in K^*$ . Проверим групповые свойства.

1.  $a(bc) = (ab)c$  — ассоциативность в  $K^*$  следует из свойств кольца  $K$ .

2.  $\exists 1 \in K^*$  (т. к.  $K^* \neq \emptyset$ ,  $\exists a \in K^*$ , по свойству обратимости  $\exists a^{-1} \in K^* : aa^{-1} = 1$  — единица в  $K$  будет являться единицей в  $K^*$ ).

3.  $(b^{-1}a^{-1})(ab) = (ab)(b^{-1}a^{-1}) = 1 \Rightarrow (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} \in K^*$  — обратимость.

Значит,  $K^*$  — группа по умножению. ◀

№ 9(1.5-1.7) Базовые знания про комплексные числа: сложение, умножение, модуль, аргумент, извлечение корней  $n$ -ой степени.

► **Компл'ексное число**  $z$  — это выражение вида  $z = a + bi$ , где  $a$  и  $b$  — числа из  $\mathbb{R}$ , а  $i$  — **мнимая единица**. По определению  $i^2 = -1$ . Число  $a$  называют **вещественной частью** комплексного числа  $z$  (пишется  $a = \operatorname{Re}(z)$ ), а число  $b$  — **мнимой частью**  $z$  (пишется  $b = \operatorname{Im}(z)$ ). Комплексные числа можно складывать и умножать, «раскрывая скобки и приводя подобные». Множество комплексных чисел обозначают буквой  $\mathbb{C}$ .

Каждому комплексному числу  $z = a + bi$  сопоставим точку  $(a, b)$  и вектор  $(a, b)$ . Длина этого вектора называется **модулем** числа  $z$  и обозначается  $|z|$ . Пусть  $z \neq 0$ . Угол (в радианах), отсчитанный против часовой стрелки от вектора  $(1, 0)$  до вектора  $(a, b)$ , называется **аргументом** числа  $z$  и обозначается  $\operatorname{Arg}(z)$ . Аргумент определен с точностью до прибавления числа вида  $2\pi n$ , где  $n \in \mathbb{Z}$ .

**Тригонометрическая форма записи.** Для любого ненулевого комплексного числа  $z$  имеет место равенство  $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ , где  $r = |z|$ ,  $\varphi = \operatorname{Arg}(z)$ .

Для комплексного числа  $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$  и натурального числа  $n \in \mathbb{N}$  выполнена **формула Муавра**  $z^n = r^n(\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$ .

Для комплексного числа  $z = a + bi$ , где  $a, b \in \mathbb{R}$  число  $\bar{z} = a - bi$  называется **комплексно-сопряжённым** к  $z$ . Выполнены следующие равенства:

$$|z|^2 = z\bar{z}, \quad \overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w}, \quad \overline{zw} = \bar{z}\bar{w}.$$

№ 10(2.2)

а) Следующие условия эквивалентны:

- (1)  $x \sim y$ ;
- (2)  $x \mid y$  и  $y \mid x$ ;
- (3) множество делителей  $x$  и множество делителей  $y$  равны.

- • (1)  $\Rightarrow$  (2) :  $\exists r \in K^* : x = ry \Rightarrow y \mid x$  по определению. Т. к.  $r \in K^*$ ,  $\exists r^{-1} \in K^* : r^{-1}x = y \Rightarrow x \mid y$  по определению.
- (2)  $\Rightarrow$  (3) : Пусть  $x \mid y, x \mid a$ . Тогда  $y = xc, x = ab$  (по опр.)  $\Rightarrow y = xc = abc = a(bc) \Rightarrow y \mid a$ .
- (3)  $\Rightarrow$  (2) : Множества делителей  $x$  и  $y$  совпадают,  $x \mid x \Rightarrow x$  будет во множестве делителей  $y$ , т. е.  $x \mid y$ . Симметрично,  $y \mid x$ .
- (2)  $\Rightarrow$  (1) :  $\begin{cases} x \mid y \Rightarrow y = kx \\ y \mid x \Rightarrow x = ty \end{cases}$  Тогда  $y = kty \Rightarrow kt = 1$  Значит,  $k$  и  $t$  обратимы. Значит,  $x = ty, t \in K^* \Rightarrow x \sim y$  по определению.

б) Отношение  $\sim$  является отношением эквивалентности.

► 1.  $x \sim x$ , т. к.  $\exists 1 \in K^* : x = 1x$

$$2. x \sim y \Rightarrow \exists r \in K^* : x = ry \Rightarrow y = r^{-1}x \Rightarrow y \sim x$$

$$3. x \sim y, y \sim z \Rightarrow \begin{cases} \exists r_1 \in K^* : x = r_1 y \\ \exists r_2 \in K^* : y = r_2 z \end{cases} \Rightarrow x = \underbrace{r_1 r_2}_{\in K^*, \text{ т. к. } (r_1 r_2)^{-1} = r_2^{-1} r_1^{-1}} z \Rightarrow x \sim z$$

№ 11 (2.5) Если  $a, b, k \in \mathbb{Z}$ ,  $u \notin \mathbb{Q}$ , то  $z = a + bu \in \mathbb{Z}[u]$  делится на  $k$  тогда и только тогда, когда  $a$  и  $b$  делятся на  $k$ .

$$\bullet \Rightarrow: \begin{cases} a \div k \\ b \div k \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = ka' \\ b = kb' \end{cases} \Rightarrow z = a + bu = ka' + kb'u = k(a' + b'u) \Rightarrow z \div k$$

•  $\Rightarrow$ : Пусть  $z = a + bu = ka' + kb'u$ . Тогда  $(a - ka') = u(b - kb')$ .

Обе части целые  $\Rightarrow$  нули, потому что  $u$  не рациональное.

$$\text{Отсюда } \begin{cases} a = ka' \\ b = kb' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a \div k \\ b \div k \end{cases}.$$

№ 12(2.9  $\Leftarrow$ )  $K$  — евклидово кольцо. Верно ли, что для  $a \neq 0, b \in K^*$  выполнено равенство  $N(ab) = N(a)$ ?

►  $b \in K^* \Rightarrow N(a) \leq N(ab) \leq N(abb^{-1}) = N(a)$

№ 13 (3.2) Для  $u = i, \omega$  и простого целого числа  $p \leq 40$  выясните, существует ли  $z \in D$  с  $N(z) = p$ . Сформулируйте гипотезу о том, какие простые целые числа являются простыми в  $D$ .

► Выпишем все варианты  $a, b$  с нормой  $\leq 40$ .

**Зам.** Можно опустить перебор по  $ka', kb'$  при  $k > 1$ , потому что тогда обе нормы делятся на  $k^2$ .

TODO: отрицательные значения.

| a | b | $\mathbb{Z}[i], N = a^2 + b^2$ | $\mathbb{Z}[\omega], N = a^2 - ab + b^2$ |
|---|---|--------------------------------|--|
| 1 | 1 | 2                              | 1  |
| 1 | 2 | 5                              | 3  |
| 1 | 3 | 10                             | 7  |
| 1 | 4 | 17                             | 13                                       |
| 1 | 5 | 26                             | 21                                       |
| 1 | 6 | 37                             | 31                                       |
| 2 | 2 | -                              | -  |
| 2 | 3 | 13                             | 7  |
| 2 | 4 | -                              | -  |
| 2 | 5 | 29                             | 19                                       |
| 2 | 6 | -                              | -  |
| 2 | 7 | 53                             | 39                                       |
| 3 | 3 | -                              | -  |
| 3 | 4 | 25                             | 13                                       |
| 3 | 5 | 34                             | 19                                       |
| 3 | 6 | -                              | -  |
| 3 | 7 | 58                             | 37                                       |
| 4 | 4 | -                              | -  |
| 4 | 5 | 41                             | 21                                       |
| 4 | 6 | -                              | -  |
| 4 | 7 | 65                             | 37                                       |
| 5 | 5 | -                              | -  |
| 5 | 6 | 61                             | 31                                       |
| 5 | 7 | 74                             | 39                                       |
| 6 | 6 | -                              | -  |

Пользуемся утверждением с лекции: Пусть  $p$  – простое целое,  $\forall z \in D : N(z) \neq p \Rightarrow p$  неразложим в  $D$ .

Выпишем все простые числа  $\leq 40$  и вычеркнем те, которые являются нормой. Берём оставшиеся.

|   | $\mathbb{Z}[i]$ |   | $\mathbb{Z}[\omega]$ |    |
|---|-----------------|---|----------------------|----|
|   | 2               | ✗ | ✓                    | 2  |
| ✓ | 3               |   | 3                    | ✗  |
|   | 5               | ✗ | ✓                    | 5  |
| ✓ | 7               |   | 7                    | ✗  |
| ✓ | 11              |   | ✓                    | 11 |
|   | 13              | ✗ |                      | 13 |
|   | 17              | ✗ | ✓                    | 17 |
| ✓ | 19              |   |                      | 19 |
| ✓ | 23              |   | ✓                    | 23 |
|   | 29              | ✗ | ✓                    | 29 |
| ✓ | 31              |   |                      | 31 |
|   | 37              | ✗ |                      | 37 |

Гипотеза: \* у  $\mathbb{Z}[i]$   $4k + 3$  \* у  $\mathbb{Z}[\omega]$   $3k + 2$  или TODO.

№ 14 (3.9)

► а)  $0 \subset K, K \subset K$  — идеалы. Они называются **тривиальными**.

•  $\{0\}$ :

1. Тривиальная группа по сложению:  
– Ассоциативность наследуется

- $0$  — нейтральный элемент, т. к.  $0 + a = a + 0 = 0 \forall a \in \{0\}$
- $0^{-1} = 0 = -0$
- 2. Замкнутость относительно умножения:  $\forall a \in K 0a = 0 \in \{0\}$
- $K$ :
  1. Тривиальная группа по сложению:
    - Ассоциативность наследуется
    - $0$  — нейтральный элемент, т. к.  $0 + a = a + 0 = 0 \forall a \in K$
    - $a^{-1} = -a \in K$
  2. Замкнутость относительно умножения:  $\forall a \in K \forall b \in I = K \quad ab \in I = K$  — по свойству кольца
- б)  $(a) = \{ax \mid x \in K\}$  — **главный идеал** или **идеал, порождённый одним элементом**
  1. Подгруппа по сложению:
    - $ax_1 + ax_2 = a(x_1 + x_2) \in (a)$  — замкнутость относительно сложения
    - Ассоциативность наследуется
    - $0$  — нейтральный элемент:  $ax + 0 = 0 + ax = ax$
    - $ax + a(-x) = a(x - x) = a \cdot 0 = 0$
  2. Замкнутость относительно умножения:  $\forall b \in K \forall ax \in (a) \quad b \cdot ax = bx \cdot a \in (a)$
- с)  $(a_1, \dots, a_n) = \{a_1x_1 + \dots + a_nx_n \mid x_1, \dots, x_n \in K\}$  — **конечно-порождённый идеал**, то есть идеал, порождённый конечным количеством элементов.
  1. Подгруппа по сложению:
    - $(a_1x_1 + \dots + a_nx_n) + (a_1y_1 + \dots + a_ny_n) = a_1(x_1 + y_1) + \dots + a_n(x_n + y_n) \in I$  — замкнутость относительно сложения
    - Ассоциативность наследуется
    - $0 = a_1 \cdot 0 + \dots + a_n \cdot 0$  — нейтральный элемент:  $ax + 0 = 0 + ax = ax$
    - $(a_1x_1 + \dots + a_nx_n) + (a_1(-x_1) + \dots + a_n(-x_n)) = 0$
  2. Замкнутость относительно умножения:  $\forall y \in K \quad y \cdot (a_1x_1 + \dots + a_nx_n) = a_1(x_1y) + \dots + a_n(x_ny) \in I$

№ 15(3.11) а) Докажите, что  $(a) \subset (b)$  тогда и только тогда, когда  $b \mid a$ .

б) Докажите, что  $a \sim b$  тогда и только тогда, когда  $(a) = (b)$ .

- а) •  $\Leftarrow: b \mid a \Rightarrow \exists c : a = cb \Rightarrow ka = (kc)b \Rightarrow (a) \subset (b)$
- $\Rightarrow: (a) \subset (b) \Rightarrow a \in (b) \Rightarrow a = cb \Rightarrow a \mid b$
- б) •  $\Rightarrow: a \sim b \Rightarrow \begin{cases} a \mid b \\ b \mid a \end{cases} \Rightarrow (a) \subset (b) \subset (a) \Rightarrow (a) = (b)$
- $\Leftarrow: (a) = (b) \Rightarrow \begin{cases} a \mid b \\ b \mid a \end{cases} \Rightarrow a \sim b$

№ 16(3.12) Пусть  $I, J \subset K$  — идеалы. Сумма  $I + J = \{x + y \mid x \in I, y \in J\}$  и пересечение  $I \cap J$  идеалов являются идеалами.

- а) 1. •  $(x_1 + y_1) + (x_2 + y_2) = \underbrace{(x_1 + x_2)}_{\in I} + \underbrace{(y_1 + y_2)}_{\in J} \in I + J$
- Ассоциативность следует.
  - $0$  — нейтральный.
  - $(x + y) + \underbrace{(-x - y)}_{\in I + J} = (x - x) + (y - y) = 0$  — обратный
2.  $\forall a \in K \hookrightarrow a(x + y) = \underbrace{ax}_{\in I} + \underbrace{ay}_{\in J} \in I + J$
- б) 1. •  $x, y \in I \cap J \Rightarrow \begin{cases} x, y \in I \\ x, y \in J \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + y \in I \\ x + y \in J \end{cases} \Rightarrow x + y \in I + J$
- Ассоциативность следует.
  - $0$  — нейтральный
  - $x \in I \cap J \Rightarrow \begin{cases} x \in I \\ x \in J \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^{-1} \in I \\ x^{-1} \in J \end{cases} \Rightarrow x^{-1} \in I + J$  — обратный
2.  $\forall a \in K \quad \forall x \in I \cap J \hookrightarrow \begin{cases} x \in I \\ x \in J \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} ax \in I \\ ax \in J \end{cases} \Rightarrow ax \in I \cap J$

№ 17(3.15) Пусть  $K \neq 0$ . Докажите, что  $K$  является полем тогда и только тогда, когда  $K$  не содержит нетривиальных идеалов.

► •  $\Rightarrow$ : Пусть  $K$  — поле,  $I \subset K$  — идеал.

- $x = 0 \Rightarrow (x) = \{0\}$  — тривиальный идеал.
- $\forall x \in I, x \neq 0$ ,  $x$  обратим по свойству поля, значит,  $I \supset (x) = (1) = K$ .

•  $\Leftarrow$ : Пусть  $K$  — коммутативное кольцо без нетривиальных идеалов. Пусть  $x \in K, x \neq 0$ , — произвольный элемент. Тогда  $(x) \neq \{0\}$ . Значит, поскольку у нас нет нетривиальных идеалов,  $(x) = K$ .

В частности,  $1 \in (x) = K \Rightarrow \exists x^{-1}$ , т. е. элемент  $x$  обратим.

В силу произвольности  $x$ , любой ненулевой элемент обратим  $\Rightarrow K$  — поле (в  $K \geq 2$  элементов, т. к.  $0 \in K$ , и мы брали  $0 \neq x \in K$ ).

№ 18(4.1) Верно ли, что при гомоморфизме колец  $\varphi : K \rightarrow L$  а) образ; б) прообраз идеала является идеалом?

а)

► Неверно. Контрпример:  $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}, \varphi(x) = x$  — поэлементное вложение.

$I = \mathbb{Z}$  в  $\mathbb{Z}$  — тривиальный идеал. Но  $\varphi(I) = \mathbb{Z}$  — не идеал в  $\mathbb{Q}$ , ибо, например,  $\underbrace{\frac{1}{2}}_{\in \mathbb{Q}} \cdot \underbrace{1}_{\in \mathbb{Z}} = \frac{1}{2} \notin I$ .

б)

► Верно. Пусть  $J$  — идеал в  $L$ .  $\varphi^{-1}(J) = \{a \in K : \varphi(a) \in J\}$ .

$$\forall a, b \in \varphi^{-1}(J) : \begin{cases} \varphi(a+b) = \varphi(a) + \varphi(b) \Rightarrow a+b \in \varphi^{-1}(J) \\ \varphi(a^{-1}) = (\varphi(a))^{-1} \in J \end{cases}$$

$$\forall x \in K \forall a \in \varphi^{-1}(J) \quad \varphi(ax) = \varphi(a)\varphi(x) \in J.$$

Значит,  $\varphi^{-1}(J)$  — действительно идеал.

№ 19(4.2)

а) Всегда ли факторкольцо коммутативного кольца является коммутативным кольцом?

- • Ассоциативность по сложению — из ассоциативности коммутативного кольца.
- $0 \in K$  — ноль в  $K \Rightarrow 0 + I = I$  — ноль в  $K^*$ :  $(I)(a+I) = (a+I)(I) = aI + I^2 = I$ .
  - Обратный по сложению:  $(a+I) + (-a+I) = (-a+I) + (a+I) = I$ .
  - Дистрибутивность:  $(a+I)(b+I+c+I) = (ab+I) + (ac+I)$ .
  - $1 \in K$  — единица в  $K \Rightarrow 1+I$  — единица в  $K^*$ :  $(1+I)(a+I) = (a+I)(1+I) = a+I + aI + I^2 = a+I$ .
  - Ассоциативность по умножению — из ассоциативности коммутативного кольца.
  - $(a+I)(b+I) = ab + aI + bI + II = ab + I = ba + I = ba + bI + aI + II = (b+I)(a+I)$  — коммутативность.

б) Имеется **канонический** гомоморфизм  $\varphi : K \rightarrow K/I$ , который переводит  $a \mapsto a+I$ .

► Проверим свойства гомоморфизма:

- $\varphi(a) + \varphi(b) = a+I + b+I = (a+b)+I = \varphi(a+b)$
- $\varphi(a)\varphi(b) = (a+I)(b+I) = ab + aI + bI + II = ab + I = \varphi(ab)$
- $\varphi(1) = 1+I = 1_{K/I}$

№ 20(4.5) Пусть  $K$  — область целостности. Идеал  $(x)$  является простым тогда и только тогда, когда  $x$  прост.

►  $(x)$  — простой  $\Leftrightarrow$  если  $ab \in (x)$ , то  $\begin{cases} a \in (x) \\ b \in (x) \end{cases}$

$$x \text{ — простой} \Leftrightarrow \text{если } ab : x, \text{ то } \begin{cases} a : x \\ b : x \end{cases}$$

Но  $ab \in (x) \Leftrightarrow ab : x$  (ибо  $(x) = \{ax \mid a \in K\}$  по определению, и  $ab \in K$ ).

№ 21(4.6) Пусть  $K$  — область целостности. Нетривиальный идеал  $I$  является максимальным тогда и только тогда, когда  $K/I$  поле.

► Знаем (№17):  $K/I$  — поле  $\Leftrightarrow$  в  $K/I$  нет нетривиальных идеалов.

Пусть  $K/I$  — поле, пусть  $\exists I : I \subset J \subset K$  — нетривиальный идеал. Подействуем на него каноническим гомоморфизмом  $\varphi : K \rightarrow K/I$ .

**Лемма.** Пусть  $f : K \rightarrow L$  — гомоморфизм колец,  $I \subset K, J \subset L$  — идеалы. Тогда а)  $f(I)$  — идеал в  $f(K)$ , б)  $f^{-1}(J)$  — идеал в  $K$ .

► а) Пусть  $x \in f(I), y \in f(K)$ . Тогда найдутся такие  $x'$  и  $y'$ , где  $x' \in I, x = f(x'), y' \in K, y = f(y')$ . Имеем:  $xy = f(x')f(y') = f(x'y') \in f(I)$ , так как  $x'y' \in I$ .

б) Пусть теперь  $x \in f^{-1}(J), y \in K$ . Тогда  $f(xy) = f(x)f(y) \in J$ , следовательно,  $xy \in f^{-1}(J)$ . ◀

Из Леммы следует, что в  $K/I$  существует нетривиальный идеал  $\Leftrightarrow$ , когда существует идеал в  $K$ , содержащий  $I$ . ◀

**№ 22(4.7)** Пусть  $K$  — область целостности. Нетривиальный идеал  $I$  является простым тогда и только тогда, когда  $K/I$  область целостности.

- •  $\Rightarrow$ : Пусть  $I$  — простой, но  $K/I$  — не область целостности. Тогда  $\exists a, b \in K : (a + I)(b + I) = ab + I = 0 + I = 0_{K/I}$ . Но тогда должно быть  $ab \in I$ , т. е. идеал не простой. Противоречие.
- $\Leftarrow$ : Пусть  $I$  непростой. Тогда  $\exists a, b : a, b \in I$ , но  $ab \notin I$ . Рассмотрим  $0 \neq (a + I)(b + I) = ab + \underbrace{I}_{ab \in I} = 0_{K/I}$ . ◀

**№ 23(5.1, 5.2)** Пусть  $K$  — область целостности. Рассмотрим множество пар  $\tilde{K} = \{a, b\}$  элементов кольца  $K$ , где  $b \neq 0$ . На этом множестве введем отношение следующим образом:  $\{a, b\} \sim \{c, d\}$ , если  $ad = bc$ .

а) Докажите, что  $\{a, b\} \sim \{ac, bc\}$ . б) Докажите, что это отношение эквивалентности.

Элемент множества классов эквивалентности  $F = \text{Quot}(K)$  будем записывать как  $\frac{a}{b}$  или  $ab^{-1}$ . Введем операции сложения и умножения на  $F = \text{Quot}(K)$ :

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd},$$

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}.$$

Докажите, что

с) сложение и умножение корректно определено; д)  $F$  является коммутативным кольцом; е)  $F$  является полем; ф) существует инъекция  $K \rightarrow F$ .

► а)  $a \cdot bc = b \cdot ac$  — из коммутативности.

б) •  $\{a, b\} \sim \{a, b\}$ , т. к.  $ab = ab$

•  $\{a, b\} \sim \{c, d\} \Leftrightarrow ad = bc \Leftrightarrow cb = da \Leftrightarrow \{c, d\} \sim \{a, b\}$

•  $\{a, b\} \sim \{c, d\} \sim \{e, f\} \Rightarrow \begin{cases} ad = bc \\ cf = de \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} adf = bcf \\ bcf = bde \end{cases} \Rightarrow adf = bde \Rightarrow af = be \Rightarrow \{a, b\} \sim \{e, f\}$

с) Корректность определения означает, что операция замкнута, и что результат её всегда определён.

• Сложение:

—  $\frac{ad+bc}{bd} \in \text{Quot}(K)$ , т. к.  $ad + bc \in K$  и  $bd \in K$  по свойствам кольца  $K$ .

—  $\nexists \frac{ad+bc}{bd} bd \neq 0$ , т. к.  $b \neq 0$  и  $d \neq 0$ .

• Умножение:

—  $\frac{ac}{bd} \in \text{Quot}(K)$ , т. к.  $a \in K$  и  $bd \in K$  по свойствам кольца  $K$ .

—  $\nexists \frac{ac}{bd} bd \neq 0$ , т. к.  $b \neq 0$  и  $d \neq 0$ .

д) • Это кольцо:

—  $\frac{a}{b} + (\frac{c}{d} + \frac{e}{f}) = \frac{a}{b} + (\frac{cf+de}{df}) = \frac{adf+bcf+bde}{bdf} = \frac{ad+bc}{bd} + \frac{e}{f} = (\frac{a}{b} + \frac{c}{d}) + \frac{e}{f}$

— Ноль — элемент класса эквивалентности  $\{\frac{0}{a} \mid a \neq 0\}$ . Возьмём  $0_F := \frac{0}{1}$ . Тогда  $\frac{a}{b} + \frac{0}{1} = \frac{0}{1} + \frac{a}{b} = \frac{0}{1}$

— Для  $\frac{a}{b}$  обратный по сложению  $\frac{-a}{b} : \frac{a}{b} + \frac{-a}{b} = \frac{a-a}{b} = \frac{0}{b} = \frac{0}{1}$

—  $\frac{a}{b}(\frac{c}{d} + \frac{e}{f}) = \frac{a}{b} \cdot \frac{cf+de}{df} = \frac{acf+ade}{bdf} = \frac{acf+ade}{bdf} = \frac{ac}{bd} + \frac{ae}{bf} = \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} + \frac{a}{b} \cdot \frac{e}{f}$

• Оно ассоциативно по умножению:  $\frac{a}{b}(\frac{c}{d} \cdot \frac{e}{f}) = \frac{a}{b}(\frac{ce}{df}) = \frac{ace}{bdf} = (\frac{ac}{bd})\frac{e}{f} = (\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}) \cdot \frac{e}{f}$

• Единица — элемент класса эквивалентности  $\{\frac{a}{a} \mid a \neq 0\}$ . Возьмём  $1_F = \frac{1}{1}$ . Тогда  $\frac{a}{b} \frac{1}{1} = \frac{1}{1} \frac{a}{b} = \frac{a}{b}$

• Оно коммутативно:  $\frac{a}{b} \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} = \frac{ca}{db} = \frac{c}{d} \frac{a}{b}$

- е) • Каждый ненулевой элемент имеет обратный по умножению  $(\frac{a}{b})^{-1} = \frac{b}{a} : \frac{a}{b} \frac{b}{a} = \frac{ab}{ba} = \frac{ab}{ab} = \frac{1}{1}$ .  
 • Элементов  $\geq 2$ , т. к.  $0 \neq 1$ .
- ф) Возьмём  $\varphi : K \rightarrow F, \varphi(a) = \frac{a}{1}$ .  
 Это гомоморфизм:  $\frac{ab}{1} = \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) = \frac{a}{1} \frac{b}{1} = \frac{a \cdot 1 + 1 \cdot b}{1 \cdot 1} = \frac{ab}{1}$ .  
 Это инъекция:  $\forall a \neq b \in K \hookrightarrow \varphi(a) = \frac{a}{1} \neq \frac{b}{1} = \varphi(b)$ , ибо  $\frac{a}{1} - \frac{b}{1} = \frac{a-b}{1} \neq 0_F$ .

## № 24(6.1) Признак неприводимости Эйзенштейна

Пусть  $f(x)$  — многочлен с целыми коэффициентами и существует такое простое число  $p$ , что:

1. старший коэффициент  $f(x)$  не делится на  $p$ ; 2. все остальные коэффициенты  $f(x)$  делятся на  $p$ ; 3. свободный член  $f(x)$  не делится на  $p^2$ .

Тогда многочлен  $f(x)$  неприводим над полем рациональных чисел.

- Пусть, напротив  $f$  не неприводим над  $\mathbb{Q}$ . Тогда существуют два таких многочлена  $g, h \in \mathbb{Q}[x]$ , что  $f = \tilde{g}\tilde{h}$  и  $\deg \tilde{g}, \deg \tilde{h} > 0$ . Положим  $d_1 = (\text{НОД знаменателей коэффициентов } \tilde{g})$  и  $d_2 = (\text{НОД знаменателей коэффициентов } \tilde{h})$ . Тогда есть разложение  $d_1 d_2 f = gh$ , где  $g, h \in \mathbb{Z}[x]$  — многочлены, полученные домножением  $\tilde{g}, \tilde{h}$  на  $d_1, d_2$  соответственно. Так как  $g$  и  $h$  примитивны, то их произведение примитивно, а значит,  $d_1 d_2 = 1$  и верно просто  $f = gh$ .

Заметим, что  $f_0 = g_0 h_0$ . Так как  $f_0$  не делится на  $p^2$ , то одно из чисел  $g_0, h_0$  не делится на  $p$ . Пусть для определенности  $h_0$  не делится на  $p$ , тогда  $g_0$  делится на  $p$ . Пусть число  $k > 0$  таково, что  $g_0, \dots, g_{k-1}$  делятся на  $p$ , а  $g_k$  не делится на  $p$ . По формуле коэффициентов для произведения многочленов  $f_k = g_k h_0 + g_k h_1 + \dots$ . Если  $k < \deg f$ , то по модулю  $p$  имеем  $0 = g_k h_0$ , где  $g_k, h_0$  не делятся на  $p$ . Значит,  $k = \deg f > \deg g$ . Это означает, что все коэффициенты  $g$  делятся на  $p$ , то есть  $g$  не примитивен. Противоречие.

## № 25(указано 6.2, но на самом деле в нём точно такого пункта нет) Многочлен $x^n - p$ ( $p$ — простое число) неприводим над $\mathbb{Q}$ .

- По критерию Эйзенштейна:  $1 \not\equiv p, -p \not\equiv p, -p \not\equiv p^2$ , где  $p$  — простое.

## № 26(6.3) Характеристика поля — простое число.

- Если  $k$  непростое,  $k = m \cdot n$ , то  $m \cdot n = 0$ , т. е. есть делители нуля — противоречие с тем, что у нас поле.

## № 27(6.4(Lecture\_all.pdf №6.2(3))) Пусть $F \subset G$ — поля. Верно ли, что $\text{char}(F) = \text{char}(G)$ ?

- Так как  $\varphi(1) = 1$ , имеем  $\varphi(\underbrace{1 + \dots + 1}_m) = \underbrace{1 + \dots + 1}_m$ . Т. к.  $\text{Ker } \varphi = \{0\}$ , то  $\underbrace{1 + \dots + 1}_m = 0$  в  $K$  и  $F$  одновременно.

Следовательно,  $\text{char } F = \text{char } K$ .

## № 28(6.5) Любое конечное поле имеет положительную характеристику.

- Пусть  $F$  конечно, а  $\text{char } F = 0$ . Тогда  $\underbrace{1 + \dots + 1}_k$  для любого  $k$  будет давать элемент поля, не совпадающий с предыдущими (иначе  $\text{char}$  была бы конечна).

Получается, что  $F$  бесконечно. Противоречие.

## № 29(№6.7) Нетривиальный гомоморфизм полей $\varphi : F \rightarrow L$ является инъекцией.

- **Лемма.**  $\varphi : F \rightarrow L$  — инъекция  $\Leftrightarrow \text{Ker } \varphi = \{0\}$ .  
 ► •  $\Rightarrow$ :  $\varphi$  — инъекция  $\Leftrightarrow \forall a, b \in F, a \neq b, \varphi(a) \neq \varphi(b)$ .

$$\text{Ker } \varphi = \{a \in F : \varphi(a) = 0_L\}.$$

Имеем  $\varphi(0) = 0$  по свойству гомоморфизма, тогда по инъективности  $\forall a \neq 0 \varphi(a) \neq \varphi(0) = 0$ , т. е.  $\text{Ker } \varphi = \{0\}$ .

- $\Leftarrow$ : Пусть не так.  $\text{Ker } \varphi \neq \{0\} \Rightarrow \exists 0 \neq a \in \text{Ker } \varphi$ . Тогда  $\forall b \in K \hookrightarrow \varphi(b+a) = \varphi(b) + \varphi(a) = \varphi(b)$  — нарушение инъективности.

**Лемма.**  $\text{Ker } \varphi$  — идеал в  $F$

- $\forall a \in F \forall x \in \text{Ker } \varphi \varphi(ax) = \varphi(a)\varphi(x) = \varphi(a) \cdot 0 = 0 \Rightarrow ax \in \text{Ker } \varphi$

В поле  $F$  идеал  $I = \begin{cases} \{0\} \\ F \end{cases}$ , т. е.  $\text{Ker } \varphi = \begin{cases} \{0\} \\ F \end{cases}$  — но в этом случае гомоморфизм тривиален, но у нас нетривиальный по

№ 30(№6.8)  $K$  образует линейное пространство над  $F$ .

- Проверка свойств. Свойства линейного пространства следуют из аксиом поля. TODO: скопировать из вики свойства. ◀

№ 31(Lecture\_all.pdf утв. 6.2(2)) Любое поле  $F$  нулевой характеристики содержит  $\mathbb{Q}$  в качестве подполя.

$$\tilde{m} := \underbrace{1 + \dots + 1}_{m \text{ штук}}$$

$$\tilde{n} := \underbrace{1 + \dots + 1}_{n \text{ штук}}$$

Для  $m \neq n$  имеем  $\tilde{m} \neq \tilde{n}$  (иначе  $\tilde{m} - \tilde{n} = 0$ , и  $\text{char } F \neq 0$ ).

Противоположный к элементу  $\tilde{m}$  обозначим  $-\tilde{m}$ .

Получили  $\mathbb{Z} \subset F$ .  $\mathbb{Q} = \text{Quot } \mathbb{Z} \subset F$ , так как если  $A \subset B$ , то  $\text{Quot } A \subset \text{Quot } B$  для всех колец и  $\text{Quot } F = F$  для поля. У нас  $\mathbb{Z} \subset F \Rightarrow \mathbb{Q} = \text{Quot } \mathbb{Z} \subset \text{Quot } F = F$  (используется №21 из exam\_5-6).

№ 32 (Lecture\_all.pdf утв. 6.5(2)) Пусть  $f(x)$  — неприводимый многочлен степени  $n$ , и  $K = F[x]/(f(x))$ . Тогда многочлен  $\bar{f}(x)$  имеет корень в  $K$ .

- Обозначим смежный класс многочлена  $g(x) \in F$  как  $\bar{g}(x) \in K$ . Тогда имеем:  $\bar{x} \in K$  — корень многочлена  $f(x)$ , т. к.  $f(\bar{x}) = \bar{f}(x) = 0$ . ◀

№ 33 Пусть  $f(x)$  — неприводимый многочлен степени  $n$ , и  $K = F[x]/(f(x))$ . Чему равна степень  $[K : F]$  этого расширения?

- Обозначим смежный класс многочлена  $g(x) \in F$  как  $\bar{g}(x) \in K$ . Рассмотрим  $\bar{1}, \bar{x}, \dots, \bar{x}^{n-1}$ . Пусть они ЛЗ, т. е.  $\exists \lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_{n-1} \in F : \lambda_0 \cdot \bar{1} + \lambda_1 \cdot \bar{x} + \dots + \lambda_{n-1} \cdot \bar{x}^{n-1} = 0$ . Тогда  $g(x) = \lambda_0 + \lambda_1 x + \dots + \lambda_{n-1} x^{n-1} \in (f(x))$ , а по неприводимости  $f(x)$  имеем  $g(x) = 0$ , т. е.  $\lambda_0 = \lambda_1 = \dots = \lambda_{n-1} = 0$ , и данная ЛК тривиальна. Поэтому  $\bar{1}, \bar{x}, \dots, \bar{x}^{n-1}$  ЛНЗ.

$\forall$  многочлена  $h(x) \in F[x]$   $\bar{h}(x)$  — образ при факторизации по идеалу  $(f(x))$  — совпадает с  $\bar{r}(x)$ , где  $r(x)$  — остаток от деления  $h(x)$  на  $f(x)$ . Поэтому  $\bar{1}, \bar{x}, \dots, \bar{x}^{n-1}$  образуют базис  $K$  как линейного пространства над  $F$ , т. е.  $[K : F] = n$ . ◀

№ 34(7.9,7.10) Умение находить степень расширения и минимальный многочлен для алгебраического над полем элемента.

- •  $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) \supset \mathbb{Q} - 2$
- $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{5}) \supset \mathbb{Q} - 7$
- $\mathbb{R}(2 - 3i) \supset \mathbb{R} - 2$
- $\mathbb{C}(2 - 3i) \supset \mathbb{C} - 1$
- $\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3}) \supset \mathbb{Q} - 4$
- $\mathbb{Q}(1 + \sqrt{2}) \supset \mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3}) - 1$
- $\mathbb{Q}(\omega) \supset \mathbb{Q} - 2$
- $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega) \supset \mathbb{Q} - 6$
- $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2}, i) \supset \mathbb{Q} - 8$
- $\mathbb{Q}(\sqrt[5]{2}, i) \supset \mathbb{Q} - 10$

TODO: почему???

№ 6.10,8.9a,9.5) Умение описывать расширения степени 2: минимальный многочлен, поле разложения, нормальность, группа Галуа.

- На примере  $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) \supset \mathbb{Q}$ . Степень 2. Мин. многочлен  $x^2 - 2$  — степени 2.  $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$  — поле разложения многочлена  $x^2 - 2$ , т. к. все его корни  $\sqrt{2}, -\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ . Не существует промежуточных, потому что тогда они имеют степень 1 или 2, т. е. совпадают с  $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$  или с  $\mathbb{Q}$ .

Рассмотрим автоморфизмы  $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) \rightarrow \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ . Их всего 2:

$$a + \sqrt{2}b \mapsto a + \sqrt{2}b$$

$$a + \sqrt{2}b \mapsto a - \sqrt{2}b$$

Других нет, т. к. достаточно рассматривать только перестановки корней минимального многочлена:

$$\sqrt{2} \mapsto \pm\sqrt{2}$$

$$-\sqrt{2} \mapsto \mp\sqrt{2}$$



Другие не рассматриваются, поскольку 1 и ЛНЗ корни многочлена образуют базис в  $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$  как линейном пространстве над  $\mathbb{Q}$ ; 1 при этом должен перейти в 1, т. к.  $\mathbb{Q}$  сохраняется.

Таких автоморфизмов  $2 \Rightarrow$  степень расширения  $2 \Rightarrow$  это расширение Галуа. Группа из двух элементов —  $\mathbb{Z}_2$  — то группа Галуа данного расширения (других (с точностью до изоморфизма) групп из 2-х элементов не бывает). ◀

№ 36(9.1) Для производной выполнены формулы  $(f + g)' = f' + g'$  и  $(fg)' = f'g + fg'$ .

► Для  $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$  и  $b(x) = b_n x^n + \dots + b_1 x + b_0$ :

$$(f + g)' = n(a_n + b_n)x^{n-1} + \dots + (a_2 + b_2)x + (a_1 + b_1) = (na_n x^n + a_2 x + a_1) + (nb_n x^n + \dots + b_2 x + b_1) = f' + g'$$

Рассмотрим  $f(x) - f(y) = \sum_{k=1}^n na_k(x^k - y^k) = (x - y) \sum_{k=1}^n na_k(x^{k-1} + x^{k-2}y + \dots + y^{k-1}) = (x - y)\Phi(x, y)$ , где  $\Phi(x, y) = \sum_{k=1}^n na_k(x^{k-1} + x^{k-2}y + \dots + y^{k-1})$ . Заметим, что  $\Phi(x, x) = f'(x)$ .

Тогда имеем для  $\varphi = fg$ :  $\varphi(x) - \varphi(y) = f(x)g(x) - f(y)g(y) = f(x)(g(x) - g(y)) + g(y)(f(x) - f(y)) = (x - y)[f(x)G(x, y) + g(y)\Phi(x, y)]$ . Отсюда  $\varphi' = f(x)G(x, x) + g(x)\Phi(x, x) = f(x)g'(x) + g(x)f'(x)$ . ◀

№ 37 (9.2) Многочлен  $f$  не имеет кратных корней тогда и только тогда, когда  $(f, f') = 1$ .

► Пусть  $f(x) = (x - a)^m f_1(x)$ ,  $f_1(x) \not\equiv (x - a)$ ,  $m \geq 2$ . Тогда  $f'(x) = m(x - a)^{m-1} f_1(x) + (x - a)^m f_1'(x)$ .

- Если  $m > 1$ , то  $f'(a) = 0$ .
- Если  $m = 1$ , то  $f'(x) = (x - a)f_1'(x) + f_1(x) \Rightarrow f'(a) = f_1(a) \neq 0 \Rightarrow f(x)$  имеет кратные корни  $\Leftrightarrow$  эти корни являются корнями  $f'(x)$ .


№ 38(9.6) Докажите, что можно построить

а) все точки с рациональными координатами; б)  $\xi_n$ , где  $n = 3, 4, 6$ ; в)  $\xi_5$ .

Если мы построили точки  $z, w$ , то можно ли построить точки д)  $\bar{z}, -z$ ? е)  $z + w, z - w$ ? ф)  $z \cdot w, \frac{z}{w}$  (при  $w \neq 0$ )? г)  $\sqrt{z}$ ?

► При помощи гутля учимся строить: перпендикулярную прямую (через заданную точку), параллельную прямую (через заданную точку).


Как обосновать то, что мы можем брать раствор циркуля, равный расстоянию между какими-то двумя точками, и переносить его на другое место? Пусть есть отрезок  $AB$ , и мы хотим окружность с радиусом  $AB$  и центром в т.  $C$ .



Строим параллелограмм как на рисунке.  $CD = AB$ .

- Берём отрезок  $01$  и произвольную точку  $A$ , не лежащую на нём. Проводим  $0A$ . На луче  $0A$  начиная от точки  $0$  откладываем  $n$  равных отрезков произвольной длины. Пусть их концы, лежащие на  $0A$ , есть  $A_1, \dots, A_n$  (считая от точки  $0$ ). Проводим  $A_n 1 =: A_n B_n$  и параллельно ей  $A_{n-1} B_{n-1}, \dots, A_1 B_1$ . По теореме Фалеса  $0B_1 = B_1 B_2 = \dots = B_{n-1} 1$ . Сделав так для любого  $n$ , получим все точки с рациональными координатами на  $01$ , разложить на ось  $OX$  тривиально, получить так же поделенную ось  $OY$  тривиально, а т. к. любая точка однозначно задаётся проекциями и мы умеем строить перпендикуляры, можем строить любую точку с рациональными координатами.
- Шестиугольник — откладывая на окружности хорды длиной с радиус, треугольник — по шестиугольнику, четырёхугольник — строя перпендикуляр из центра окружности, в которую он вписан.
- Отражение относительно осей.
- Тривиально.

- е) В экспоненциальной записи:  $z\omega = r_1 e^{i\varphi_1} r_2 e^{i\varphi_2} = (r_1 r_2) e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}$ . Итого, надо научиться строить сумму углов и отрезок с длиной, равной произведению двух других. Сумма углов: тривиально. Произведение: пользуемся теоремой из геометрии о соотношении высоты прямоугольного треугольника со всякими другими отрезками (та, которая выводится из подобия).



Взяв  $BH = h^2$ ,  $AH = a^2$ ,  $CH = b^2$ , получим  $BH^2 = AH \cdot CH \Rightarrow BH = ab$ .  
Как строить  $a^2$  и  $b^2$ ? Взяв  $BH = a^2$ ,  $AH = 1$ ,  $CH = x$ , получим  $a^2 = 1 \cdot x \Rightarrow x = a^2$ .

№ 39 (9.12a) Докажите невозможность удвоения куба, то есть построение куба объёма 2, имея куб объёма 1 с помощью циркуля и линейки.

- Задача сводится к построению циркулем и линейкой числа  $\sqrt[3]{2}$ . Но  $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$  — расширение степени 3 над  $\mathbb{Q}$ , поэтому не существует башни промежуточных расширений размерности 2.

**TODO: Больше объяснений!**

№ 40 (10.2) Пусть  $\varphi : F \rightarrow F$  — автоморфизм поля  $F$  (изоморфизм поля на себя). а) Пусть  $\text{char} F = 0$ . Верно ли, что  $\varphi$  сохраняет  $\mathbb{Q}$ ? (то есть при  $q \in \mathbb{Q}$  выполнено равенство  $\varphi(q) = q$ ). б) Пусть  $\text{char} F = p$ . Верно ли, что  $\varphi$  сохраняет  $\mathbb{Z}_p$ ?

- а) Автоморфизм переводит единицу в единицу:  $\varphi(1) = 1$  по свойствам гомоморфизма. Тогда  $\forall p \in \mathbb{Z} \hookrightarrow \varphi(p) = \varphi(\underbrace{1 + \dots + 1}_p) = \underbrace{1 + \dots + 1}_p = p$ . Получили, что  $\mathbb{Z}$  сохраняется. Имеем:  $\frac{p}{q} \xrightarrow{\text{определение экв-ти}} \frac{pq^{-1}}{1} \xrightarrow{\text{изоморфизм}} pq^{-1}$   
 $\varphi(\frac{p}{a}) = \varphi(pa^{-1}) = \varphi(p) \underbrace{[\varphi(a)]^{-1}}_{\text{свойство гомоморфизма}} = pa^{-1} = \frac{p}{a}$  б) Да, т. к. если  $m \in \mathbb{Z}_p$ , то  $\varphi(m) = \underbrace{\varphi(1) + \dots + \varphi(1)}_m = m$

№ 41 (10.4 (Lectures\_all.pdf задача 9.1, утв. 9.1)) Пусть  $F \subset K$  — расширение полей. Множество автоморфизмов  $K$ , оставляющих  $F$  на месте, является группой и называется группой автоморфизмов и обозначается  $\text{Aut}_F(K) = \text{Aut}([K : F])$ . а)  $\text{Aut}_F(K)$  — группа. б) Пусть  $H \subset \text{Aut}_F(K)$  — подгруппа. Тогда  $K^H = \{x \in K \mid \forall h \in H \hookrightarrow h(x) = x\}$  является полем, причём  $K \supset K^H \supset F$ .

- а) Композиция автоморфизмов, сохраняющих  $F$ , — автоморфизм, сохраняющий  $F \Rightarrow$  замкнутость.  $id$  — нейтральный элемент. Ассоциативность следует из свойств композиции. Обратный существует, т. к. автоморфизм — биекция. Обратный сохраняет  $F$ . б) Пусть  $a, b \in K^H, h \in H$ . Тогда  $h(a + b) = h(a) + h(b) = a + b$ , и поэтому  $a + b \in K^H$ . Аналогично,  $ab \in K^H$ . С другой стороны,  $h \in H \subset G$ , и поэтому  $h$  сохраняет  $F$ . Значит,  $F \subset K^H$ .  $K^H \subset K$  по определению.

№ 42 (10.5) Опишите группы автоморфизмов  $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ .

- $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$  — группа  $\{id\}$ , т. к. все другие перестановки корней дают комплексные числа.

Знаем, что любой автоморфизм задаётся перестановкой корней минимального многочлена.

Пусть  $\varphi$  — автоморфизм. Тогда  $\varphi(m_\gamma(\gamma)) = 0 \Rightarrow 0 = a_n \varphi(\gamma)^m + \dots + a_0 \Rightarrow \varphi(\gamma)$  — корень  $m_\gamma \Rightarrow$  сопряжён с  $\gamma$ .

№ 43 (11.1 (Lectures\_all.pdf теор. 11.1)) а) Конечное поле характеристики  $p$  состоит из  $p^n$  элементов. б) Поле  $F$  является полем разложения многочлена  $x^{p^n} - x$ . в) Существует единственное поле из  $p^n$  элементов.

- а) Так как  $K$  — конечное расширение поля  $\mathbb{Z}_p$ , то  $K$  является  $n$ -мерным линейным пространством над  $\mathbb{Z}_p$ , и поэтому состоит из  $p^n$  элементов. б) Пусть  $\alpha \in K, \alpha \neq 0$ . Тогда  $\alpha^{p^n-1} = 1$ . Следовательно,  $\alpha$  является корнем многочлена  $f$ . Степень многочлена  $f$  равна  $p^n$ , все элементы  $K$  являются его корнями. Ясно, что  $K$  — минимальное поле, в котором  $f$  раскладывается на линейные множители. Следовательно,  $K$  — его поле разложения. в) Поле разложения многочлена  $f$  единственно с точностью до изоморфизма.

№ 44 (11.2) Найдите все неприводимые многочлены (со стар. коэффициент 1) степени 2, 3 над полем а)  $\mathbb{F}_2$ , б)  $\mathbb{F}_3$ .

- Выписываем все возможные многочлены и вычёркиваем те, которые разложимы.

- а)  $\mathbb{F}_2$ : Неразложимые степени 1:  $x$  и  $x+1$ . Разложимые степени 2 — какая-то комбинация многочленов степени 1. Оставшиеся — неразложимы. Теперь смотрим все возможные многочлены степени 3, которые можно получить, перемножая многочлены степени 1 и многочлены степени 2.

$$\deg = 2: x^2, \underbrace{x^2+1}_{(x+1)(x+1)}, x^2+x, x^2+x+1$$

$$\deg = 3: x^3, \underbrace{x^3+1}_{(x^2+1)(x^2+x+1)}, x^3+x, x^3+x+1, x^3+x^2, x^3+x^2+1, x^3+x^2+x, \underbrace{x^3+x^2+x+1}_{(x^2+1)(x+1)}$$

- б)  $\mathbb{F}_3$ : Рассуждения аналогичны.

$$\deg = 2: x^2, x^2+1, \underbrace{x^2+2}_{(x+2)(x+1)}, x^2+x, x^2+x+1, \underbrace{x^2+x+2}_{(x+1)(x+2)}, x^2+2x, x^2+2x+1, x^2+2x+2$$

$$\begin{aligned} \deg = 3: x^3, & \underbrace{x^3+1}_{(x^2+1)(x^2+x+1)}, x^3+2, x^3+x, x^3+x+1, x^3+x+2, x^3+2x, x^3+2x+1, x^3+2x+2, x^3+x^2, x^3+x^2+1, x^3+ \\ & x^2+2, x^3+x^2+x, \underbrace{x^3+x^2+x+1}_{(x^2+1)(x+1)}, x^3+x^2+x+2, x^3+x^2+2x, x^3+x^2+2x+1, \underbrace{x^3+x^2+2x+2}_{(x^2+2)(x+1)}, x^3+2x^2, x^3+ \\ & 2x^2+1, x^3+2x^2+2, x^3+2x^2+x, x^3+2x^2+x+1, \underbrace{x^3+2x^2+x+2}_{(x^2+1)(x+2)}, x^3+2x^2+2x, \underbrace{x^3+2x^2+2x+1}_{(x^2+2)(x+2)}, x^3+2x^2+2x+2 \end{aligned}$$

**№ 45 (11.3)** Постройте поле из а) 4; б) 8; в) 9 элементов.

- Для  $p^n$ :  $F_{p^n} = F_p[x]/(f(x))$ , где  $f(x)$  — примитивный многочлен степени  $n$ . Итого, надо просто найти многочлен над  $F_p$  степени  $n$ .

а)  $4 = 2^2$   $\mathbb{F}_4 = F_2[x]/(x^2+x+1) = \{0; 1; x; 1+x\}$

б)  $8 = 2^3$   $\mathbb{F}_8 = F_2[x]/(x^3+x^2+1) = \{0; 1; x; x+1; x^2; x^2+1; x^2+x; x^2+x+1\}$

в)  $9 = 3^2$   $\mathbb{F}_9 = F_3[x]/(x^2+2x+2)$

TODO: почему так? Как явно выписывать?