

Drug Name (İlaç Adı): Flagyl

Generic (Etken Madde): Metronidazole

Use (Kullanım Alanı):

Used to treat bacterial and parasitic infections, including vaginal infections, gastrointestinal infections, dental infections, and some skin infections.

Vajinal enfeksiyonlar, sindirim sistemi enfeksiyonları, diş enfeksiyonları ve bazı cilt enfeksiyonları dahil olmak üzere bakteri ve parazit kaynaklı enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Common Side Effects (Yaygın Yan Etkiler):

- Nausea
- Metallic taste
- Headache
- Loss of appetite
- Bulantı
- Ağızda metalik tat
- Baş ağrısı
- İştah kaybı

Serious Side Effects (Ciddi Yan Etkiler):

- Severe allergic reactions
- Numbness or tingling in hands/feet (neuropathy)
- Severe abdominal pain
- Seizures (rare)
- Şiddetli alerjik reaksiyonlar
- El ve ayaklarda uyuşma-karıncaalanma (nöropati)
- Şiddetli karın ağrısı
- Nadir olarak nöbet geçirme

Warnings (Uyarılar):

- **Absolutely avoid alcohol during treatment and for 48 hours after** (causes severe nausea/vomiting).
- Do not use in severe liver disease unless advised by a doctor.
- May cause dizziness—avoid driving if affected.
- **Tedavi sırasında ve bittikten sonraki 48 saat boyunca kesinlikle alkol alınmamalıdır** (şiddetli bulantı/kusma yapar).
- Ciddi karaciğer hastalığında doktor önerisi olmadan kullanılmamalıdır.
- Baş dönmesi yapabilir—etkilenirseniz araç kullanmayın.

Interactions (Etkileşimler):

- Alcohol (strong contraindication)
- Blood thinners (warfarin)
- Lithium
- Certain seizure medications
- Alkol (kesinlikle birlikte kullanılmaz)
- Kan sulandırıcılar (varfarin)
- Lityum
- Bazı epilepsi ilaçları

Disclaimer (Uyarı):

This document is for informational purposes only and not a substitute for professional medical advice.

Bu belge sadece bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi tavsiye yerine geçmez.