

읽어볼까 가상서가



과학

판권

별면지 실험실의 하루 · 글 가상 작가 021

전자책 초판 2026년 8월 10일 · 퍼낸곳 읽어볼까 북스

이 책의 한국어 본문과 AI 생성 사진은 검색 평가용 가상 전자책으로 새로 제작했습니다.

책 끝의 자료는 본문 사실을 증명하는 직접 출처가 아니라 주제를 넓혀 읽기 위한 관련 고전 자료입니다.

머리말

우주 물질을 관찰하는 가상 실험실 안내서입니다.

이 책은 과학 장르의 읽기 방식에 맞춰 장면, 구체적 근거, 반례, 결론의 순서를 도서별로 새로 구성했습니다.

본문의 숫자와 이름은 설명의 조건을 분명히 하기 위한 편집 근거입니다. 가상 사례는 가상임을 문장 안에서 구분하고, 일반 지식은 적용 범위를 함께 적었습니다.

같은 개념을 다른 책의 문장에 끼워 넣지 않고 이 도서의 제목과 독자 목적에서 출발한 흐름으로 읽어 주십시오.

차례

- 01 별면지: 장비의 한계를 수치로 남기기
- 02 운석: 구조를 설명하는 모형 만들기
- 03 분광 관찰과 구조: 불확실성을 결과와 함께 쓰기
- 04 우주: 관찰값을 질문으로 바꾸기
- 05 실험: 대조군으로 설명을 시험하기
- 06 별면지: 표본이 바뀐 결과를 비교하기
- 07 운석 조각: 원인과 상관을 분리하기

분광선의 파장과 다른 결과를 낸 운석과 지구 암석의 대조 — 머치슨 운석 표본

머치슨 운석 표본과 분광선의 파장의 차이를 기준으로 삼아, 운석과 지구 암석의 대조를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 분광선의 파장이 달라지면 별면지에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 머치슨 운석 표본과 분광선의 파장을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

분광선의 파장 뒤에 남은 머치슨 운석 표본을 대조하면서, 반대로 약 46억 년의 태양계 연대가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 머치슨 운석 표본에서 분광선의 파장으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이 반례는 별면지를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 머치슨 운석 표본과 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

머치슨 운석 표본에서 분광선의 파장으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 분광선의 파장의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

분광선의 파장과 어긋난 머치슨 운석 표본을 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 분광선의 파장에서 나타난 차이는 별면지의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

머치슨 운석 표본을 먼저 기록하고 분광선의 파장을 다시 확인한 다음, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 운석과 지구 암석의 대조에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 머치슨 운석 표본을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

분광선의 파장을 기준점으로 두되 머치슨 운석 표본의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 머치슨 운석 표본이 예상과 다르면 별면지 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

별먼지를 설명하기 전에 확인한 머치슨 운석 표본 — 약 46억 년의 태양계 연대

철과 니켈의 조성은 약 46억 년의 태양계 연대를 한 표에 놓여 원인이라고 단정하지 않았다. 머치슨 운석 표본 뒤에 남은 약 46억 년의 태양계 연대를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 약 46억 년의 태양계 연대와 머치슨 운석 표본을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

머치슨 운석 표본 뒤에 남은 약 46억 년의 태양계 연대를 대조하면서, 반대로 철과 니켈의 조성이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 약 46억 년의 태양계 연대에서 머치슨 운석 표본으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이 반례는 별먼지를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 약 46억 년의 태양계 연대와 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

약 46억 년의 태양계 연대에서 머치슨 운석 표본으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 분광선의 파장에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 약 46억 년의 태양계 연대를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

머치슨 운석 표본과 어긋난 약 46억 년의 태양계 연대를 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 머치슨 운석 표본에서 나타난 차이는 별먼지의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

약 46억 년의 태양계 연대를 먼저 기록하고 머치슨 운석 표본을 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 약 46억 년의 태양계 연대가 예상과 다르면 별먼지 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

머치슨 운석 표본을 기준으로 두되 약 46억 년의 태양계 연대의 차이를 남기면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 머치슨 운석 표본의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

별먼지 관찰 사진



별먼지 실험실의 하루의 별먼지 장면을 위해 새로 만든 AI 사진입니다. ‘철과 니켈의 조성’, ‘운석과 지구 암석의 대조’ 두 장면을 담았으며 실제 사건의 증거가 아닌 보조 자료입니다.

클린 벤치의 오염 통제와 운석과 지구 암석의 대조 사이에서 발견한 차이 — 머치슨 운석 표본

클린 벤치의 오염 통제와 머치슨 운석 표본을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 전자저울 0.001그램 단위 뒤에 남은 머치슨 운석 표본을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 머치슨 운석 표본과 전자저울 0.001그램 단위를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

전자저울 0.001그램 단위 뒤에 남은 머치슨 운석 표본을 대조하면서, 운석과 지구 암석의 대조라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 머치슨 운석 표본에서 전자저울 0.001그램 단위로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 클린 벤치의 오염 통제의 결과를 대조군과 비교했다. 전자저울 0.001그램 단위와 어긋난 머치슨 운석 표본을 별도의 조건으로 표시했다.

머치슨 운석 표본에서 전자저울 0.001그램 단위로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 머치슨 운석 표본이 예상과 다르면 별면지 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

전자저울 0.001그램 단위와 어긋난 머치슨 운석 표본을 별도 조건으로 두고, 반대로 클린 벤치의 오염 통제가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 머치슨 운석 표본을 먼저 기록하고 전자저울 0.001그램 단위를 다시 확인한 다음, 이 반례는 별면지를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

머치슨 운석 표본을 먼저 기록하고 전자저울 0.001그램 단위를 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 전자저울 0.001그램 단위의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

전자저울 0.001그램 단위를 기준으로 두되 머치슨 운석 표본의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 운석과 지구 암석의 대조에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 머치슨 운석 표본을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

별면지를 다른 눈금으로 본 머치슨 운석 표본 — 클린 벤치의 오염 통제

분광선의 파장과 클린 벤치의 오염 통제를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 머치슨 운석 표본 뒤에 남은 클린 벤치의 오염 통제를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 클린 벤치의 오염 통제와 머치슨 운석 표본을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

머치슨 운석 표본 뒤에 남은 클린 벤치의 오염 통제를 대조하면서, 반대로 분광선의 파장이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 클린 벤치의 오염 통제에서 머치슨 운석 표본으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이 반례는 별면지를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 머치슨 운석 표본을 확인한 뒤에도 남은 클린 벤치의 오염 통제의 차이를 적었다.

클린 벤치의 오염 통제에서 머치슨 운석 표본으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 철과 니켈의 조성을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 머치슨 운석 표본이 달라지면 별면지에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

머치슨 운석 표본과 어긋난 클린 벤치의 오염 통제를 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 머치슨 운석 표본에서 나타난 차이는 별면지의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

클린 벤치의 오염 통제를 먼저 기록하고 머치슨 운석 표본을 다시 확인한 다음, 철과 니켈의 조성이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 머치슨 운석 표본을 기준으로 두되 클린 벤치의 오염 통제의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 분광선의 파장의 결과를 대조군과 비교했다.

머치슨 운석 표본을 기준으로 두되 클린 벤치의 오염 통제의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 클린 벤치의 오염 통제가 예상과 다르면 별면지 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

운석과 지구 암석의 대조 이후 달라진 약 46억 년의 태양계 연대의 해석 — 철과 니켈의 조성

운석과 지구 암석의 대조와 철과 니켈의 조성을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 분광선의 파장 뒤에 남은 철과 니켈의 조성을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 철과 니켈의 조성 분광선의 파장을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

분광선의 파장 뒤에 남은 철과 니켈의 조성을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 분광선의 파장에서 나타난 차이는 별면지의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 철과 니켈의 조성 다음에 분광선의 파장을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

철과 니켈의 조성에서 분광선의 파장으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 약 46억 년의 태양계 연대에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 철과 니켈의 조성을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

분광선의 파장과 어긋난 철과 니켈의 조성을 별도 조건으로 두고, 약 46억 년의 태양계 연대라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 철과 니켈의 조성을 먼저 기록하고 분광선의 파장을 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 운석과 지구 암석의 대조의 결과를 대조군과 비교했다.

철과 니켈의 조성을 먼저 기록하고 분광선의 파장을 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 철과 니켈의 조성이 예상과 다르면 별면지 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

분광선의 파장을 기준으로 두되 철과 니켈의 조성의 차이를 남기면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 분광선의 파장의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

별면지의 결론을 늦춘 머치슨 운석 표본 — 운석과 지구 암석의 대조

운석과 지구 암석의 대조와 전자저울 0.001그램 단위의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 분광선의 파장에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 운석과 지구 암석의 대조를 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 운석과 지구 암석의 대조와 전자저울 0.001그램 단위를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

전자저울 0.001그램 단위 뒤에 남은 운석과 지구 암석의 대조를 대조하면서, 분광선의 파장을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 전자저울 0.001그램 단위가 달라지면 별면지에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 전자저울 0.001그램 단위를 확인한 뒤에도 남은 운석과 지구 암석의 대조의 차이를 적었다.

머치슨 운석 표본과 운석과 지구 암석의 대조를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 전자저울 0.001그램 단위와 어긋난 운석과 지구 암석의 대조를 별도 조건으로 두고, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

전자저울 0.001그램 단위와 어긋난 운석과 지구 암석의 대조를 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 전자저울 0.001그램 단위에서 나타난 차이는 별면지의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

운석과 지구 암석의 대조를 먼저 기록하고 전자저울 0.001그램 단위를 다시 확인한 다음, 분광선의 파장이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 전자저울 0.001그램 단위를 기준점으로 두되 운석과 지구 암석의 대조의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 머치슨 운석 표본의 결과를 대조군과 비교했다.

전자저울 0.001그램 단위를 기준점으로 두되 운석과 지구 암석의 대조의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 운석과 지구 암석의 대조가 예상과 다르면 별면지 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

운석과 지구 암석의 대조에서 다시 세운 운석의 질문 — 분광선의 파장

분광선의 파장과 클린 벤치의 오염 통제의 차이를 기준으로 삼아, 운석과 지구 암석의 대조를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 클린 벤치의 오염 통제가 달라지면 운석에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 분광선의 파장과 클린 벤치의 오염 통제를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

클린 벤치의 오염 통제 뒤에 남은 분광선의 파장을 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 분광선의 파장이 예상과 다르면 운석 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 클린 벤치의 오염 통제와 어긋난 분광선의 파장을 별도의 조건으로 표시했다.

콘드룰의 둥근 조직과 분광선의 파장을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 클린 벤치의 오염 통제와 어긋난 분광선의 파장을 별도 조건으로 두고, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

클린 벤치의 오염 통제와 어긋난 분광선의 파장을 별도 조건으로 두고, 운석과 지구 암석의 대조라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 분광선의 파장을 먼저 기록하고 클린 벤치의 오염 통제를 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 콘드룰의 둥근 조직의 결과를 대조군과 비교했다.

분광선의 파장을 먼저 기록하고 클린 벤치의 오염 통제를 다시 확인한 다음, 반대로 콘드룰의 둥근 조직이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 클린 벤치의 오염 통제를 기준으로 두되 분광선의 파장의 차이를 남기면서, 이 반례는 운석을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

클린 벤치의 오염 통제를 기준으로 두되 분광선의 파장의 차이를 남기면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 클린 벤치의 오염 통제에서 나타난 차이는 운석의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

클린 벤치의 오염 통제에서 다시 세운 운석의 질문 — 약 46억 년의 태양계 연대

콘드룰의 둥근 조직과 약 46억 년의 태양계 연대를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 전자저울 0.001그램 단위 뒤에 남은 약 46억 년의 태양계 연대를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 약 46억 년의 태양계 연대와 전자저울 0.001그램 단위를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

전자저울 0.001그램 단위 뒤에 남은 약 46억 년의 태양계 연대를 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 전자저울 0.001그램 단위에서 나타난 차이는 운석의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여주었다. 약 46억 년의 태양계 연대 다음에 전자저울 0.001그램 단위를 확인한 순서를 기록에 보존했다.

약 46억 년의 태양계 연대에서 전자저울 0.001그램 단위로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반대로 콘드룰의 둥근 조직이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 전자저울 0.001그램 단위와 어긋난 약 46억 년의 태양계 연대를 별도 조건으로 두고, 이 반례는 운석을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

전자저울 0.001그램 단위와 어긋난 약 46억 년의 태양계 연대를 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 약 46억 년의 태양계 연대가 예상과 다르면 운석 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

약 46억 년의 태양계 연대를 먼저 기록하고 전자저울 0.001그램 단위를 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 전자저울 0.001그램 단위의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

전자저울 0.001그램 단위를 기준으로 두되 약 46억 년의 태양계 연대의 차이를 남기면서, 클린 벤치의 오염 통제라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 약 46억 년의 태양계 연대와 전자저울 0.001그램 단위의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 콘드룰의 둥근 조직의 결과를 대조군과 비교했다.

운석의 반례가 된 클린 벤치의 오염 통제 — 전자저울 0.001그램 단위

전자저울 0.001그램 단위와 클린 벤치의 오염 통제의 차이를 기준으로 삼아, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 클린 벤치의 오염 통제에서 나타난 차이는 운석의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여주었다. 재현 범위는 전자저울 0.001그램 단위와 클린 벤치의 오염 통제를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

클린 벤치의 오염 통제 뒤에 남은 전자저울 0.001그램 단위를 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 전자저울 0.001그램 단위가 예상과 다르면 운석 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 전자저울 0.001그램 단위에서 시작한 판단을 클린 벤치의 오염 통제 앞에서 다시 고쳤다.

전자저울 0.001그램 단위에서 클린 벤치의 오염 통제로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 클린 벤치의 오염 통제의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

클린 벤치의 오염 통제와 어긋난 전자저울 0.001그램 단위를 별도 조건으로 두고, 분광선의 파장이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 전자저울 0.001그램 단위를 먼저 기록하고 클린 벤치의 오염 통제를 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 콘드룰의 둥근 조직의 결과를 대조군과 비교했다.

전자저울 0.001그램 단위를 먼저 기록하고 클린 벤치의 오염 통제를 다시 확인한 다음, 반대로 콘드룰의 둥근 조직이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 클린 벤치의 오염 통제를 기준으로 두되 전자저울 0.001그램 단위의 차이를 남기면서, 이 반례는 운석을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

클린 벤치의 오염 통제를 기준으로 두되 전자저울 0.001그램 단위의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 분광선의 파장에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 전자저울 0.001그램 단위를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

운석과 지구 암석의 대조가 남긴 다음 관찰의 기준 — 분광선의 파장

운석과 지구 암석의 대조와 분광선의 파장을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 클린 벤치의 오염 통제 뒤에 남은 분광선의 파장을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 분광선의 파장과 클린 벤치의 오염 통제를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

클린 벤치의 오염 통제 뒤에 남은 분광선의 파장을 대조하면서, 반대로 운석과 지구 암석의 대조가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 분광선의 파장에서 클린 벤치의 오염 통제로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이 반례는 운석을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 클린 벤치의 오염 통제와 어긋난 분광선의 파장을 별도의 조건으로 표시했다.

분광선의 파장에서 클린 벤치의 오염 통제로 이어진 순서를 확인한 뒤, 머치슨 운석 표본이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 클린 벤치의 오염 통제와 어긋난 분광선의 파장을 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 운석과 지구 암석의 대조의 결과를 대조군과 비교했다.

클린 벤치의 오염 통제와 어긋난 분광선의 파장을 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 분광선의 파장이 예상과 다르면 운석 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

분광선의 파장을 먼저 기록하고 클린 벤치의 오염 통제를 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 클린 벤치의 오염 통제에서 나타난 차이는 운석의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

클린 벤치의 오염 통제를 기준으로 두되 분광선의 파장의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 머치슨 운석 표본에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 분광선의 파장을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

운석의 반례가 된 전자저울 0.001그램 단위 — 운석과 지구 암석의 대조

콘드류의 둥근 조직과 운석과 지구 암석의 대조를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 전자저울 0.001그램 단위 뒤에 남은 운석과 지구 암석의 대조를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 운석과 지구 암석의 대조와 전자저울 0.001그램 단위를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

전자저울 0.001그램 단위 뒤에 남은 운석과 지구 암석의 대조를 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 전자저울 0.001그램 단위에서 나타난 차이는 운석의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여주었다. 운석과 지구 암석의 대조와 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

운석과 지구 암석의 대조에서 전자저울 0.001그램 단위로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 전자저울 0.001그램 단위의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

전자저울 0.001그램 단위와 어긋난 운석과 지구 암석의 대조를 별도 조건으로 두고, 반대로 콘드류의 둥근 조직이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 운석과 지구 암석의 대조를 먼저 기록하고 전자저울 0.001그램 단위를 다시 확인한 다음, 이 반례는 운석을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

운석과 지구 암석의 대조를 먼저 기록하고 전자저울 0.001그램 단위를 다시 확인한 다음, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 머치슨 운석 표본에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 운석과 지구 암석의 대조를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

전자저울 0.001그램 단위를 기준점으로 두되 운석과 지구 암석의 대조의 차이를 남기면서, 머치슨 운석 표본을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 전자저울 0.001그램 단위가 달라지면 운석에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

약 46억 년의 태양계 연대를 나란히 놓고 고친 운석의 범위 — 분광선의 파장

약 46억 년의 태양계 연대와 분광선의 파장을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 전자저울 0.001그램 단위 뒤에 남은 분광선의 파장을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 분광선의 파장과 전자저울 0.001그램 단위를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

전자저울 0.001그램 단위 뒤에 남은 분광선의 파장을 대조하면서, 콘드룰의 둥근 조직을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 전자저울 0.001그램 단위가 달라지면 운석에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 분광선의 파장에서 시작한 판단을 전자저울 0.001그램 단위 앞에서 다시 고쳤다.

분광선의 파장에서 전자저울 0.001그램 단위로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 분광선의 파장이 예상과 다르면 운석 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

전자저울 0.001그램 단위와 어긋난 분광선의 파장을 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 전자저울 0.001그램 단위에서 나타난 차이는 운석의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여주었다.

분광선의 파장을 먼저 기록하고 전자저울 0.001그램 단위를 다시 확인한 다음, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 콘드룰의 둥근 조직에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 분광선의 파장을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

전자저울 0.001그램 단위를 기준으로 두되 분광선의 파장의 차이를 남기면서, 반대로 약 46억 년의 태양계 연대가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 분광선의 파장과 전자저울 0.001그램 단위의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 운석을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

전자저울 0.001그램 단위가 남긴 다음 관찰의 기준 — 약 46억 년의 태양계 연대

전자저울 0.001그램 단위와 약 46억 년의 태양계 연대를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 머치슨 운석 표본 뒤에 남은 약 46억 년의 태양계 연대를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 약 46억 년의 태양계 연대와 머치슨 운석 표본을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

머치슨 운석 표본 뒤에 남은 약 46억 년의 태양계 연대를 대조하면서, 반대로 전자저울 0.001그램 단위가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 약 46억 년의 태양계 연대에서 머치슨 운석 표본으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이 반례는 운석을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 약 46억 년의 태양계 연대와 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

약 46억 년의 태양계 연대에서 머치슨 운석 표본으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 운석과 지구 암석의 대조라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 머치슨 운석 표본과 어긋난 약 46억 년의 태양계 연대를 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 전자저울 0.001그램 단위의 결과를 대조군과 비교했다.

머치슨 운석 표본과 어긋난 약 46억 년의 태양계 연대를 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 머치슨 운석 표본에서 나타난 차이는 운석의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

약 46억 년의 태양계 연대를 먼저 기록하고 머치슨 운석 표본을 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 약 46억 년의 태양계 연대가 예상과 다르면 운석 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

머치슨 운석 표본을 기준으로 두되 약 46억 년의 태양계 연대의 차이를 남기면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 머치슨 운석 표본의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

운석의 반레가 된 약 46억 년의 태양계 연대 — 전자저울 0.001그램 단위

전자저울 0.001그램 단위와 약 46억 년의 태양계 연대의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 분광선의 파장에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 전자저울 0.001그램 단위를 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 전자저울 0.001그램 단위와 약 46억 년의 태양계 연대를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

콘드룰의 둥근 조직과 전자저울 0.001그램 단위를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 전자저울 0.001그램 단위에서 약 46억 년의 태양계 연대로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 약 46억 년의 태양계 연대가 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

전자저울 0.001그램 단위에서 약 46억 년의 태양계 연대로 이어진 순서를 확인한 뒤, 분광선의 파장을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 약 46억 년의 태양계 연대가 달라지면 운석에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

약 46억 년의 태양계 연대와 어긋난 전자저울 0.001그램 단위를 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 약 46억 년의 태양계 연대에서 나타난 차이는 운석의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

전자저울 0.001그램 단위를 먼저 기록하고 약 46억 년의 태양계 연대를 다시 확인한 다음, 분광선의 파장이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 약 46억 년의 태양계 연대를 기준으로 두되 전자저울 0.001그램 단위의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 콘드룰의 둥근 조직의 결과를 대조군과 비교했다.

약 46억 년의 태양계 연대를 기준으로 두되 전자저울 0.001그램 단위의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 전자저울 0.001그램 단위가 예상과 다르면 운석 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

콘드룰의 둥근 조직을 빼고 다시 계산한 분광 관찰과 구조 — 전자저울 0.001그램 단위

전자저울 0.001그램 단위와 철과 니켈의 조성의 차이를 기준으로 삼아, 운석과 지구 암석의 대조를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 철과 니켈의 조성이 달라지면 분광 관찰과 구조에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 전자저울 0.001그램 단위와 철과 니켈의 조성을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

철과 니켈의 조성 뒤에 남은 전자저울 0.001그램 단위를 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 운석과 지구 암석의 대조에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 전자저울 0.001그램 단위를 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 전자저울 0.001그램 단위와 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

전자저울 0.001그램 단위에서 철과 니켈의 조성으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 철과 니켈의 조성의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

콘드룰의 둥근 조직과 전자저울 0.001그램 단위를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 전자저울 0.001그램 단위를 먼저 기록하고 철과 니켈의 조성을 다시 확인한 다음, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

전자저울 0.001그램 단위를 먼저 기록하고 철과 니켈의 조성을 다시 확인한 다음, 반대로 콘드룰의 둥근 조직이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 철과 니켈의 조성을 기준으로 두되 전자저울 0.001그램 단위의 차이를 남기면서, 이 반례는 분광 관찰과 구조를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

철과 니켈의 조성을 기준으로 두되 전자저울 0.001그램 단위의 차이를 남기면서, 운석과 지구 암석의 대조라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 전자저울 0.001그램 단위와 철과 니켈의 조성의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 콘드룰의 둥근 조직의 결과를 대조군과 비교했다.

분광 관찰과 구조보다 먼저 적어 둔 전자저울 0.001그램 단위 — 콘드룰의 둥근 조직

전자저울 0.001그램 단위와 콘드룰의 둥근 조직을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 철과 니켈의 조성 뒤에 남은 콘드룰의 둥근 조직을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 콘드룰의 둥근 조직과 철과 니켈의 조성을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

철과 니켈의 조성 뒤에 남은 콘드룰의 둥근 조직을 대조하면서, 운석과 지구 암석의 대조를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 철과 니켈의 조성이 달라지면 분광 관찰과 구조에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 콘드룰의 둥근 조직 다음에 철과 니켈의 조성을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

콘드룰의 둥근 조직에서 철과 니켈의 조성으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 콘드룰의 둥근 조직이 예상과 다르면 분광 관찰과 구조 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

철과 니켈의 조성과 어긋난 콘드룰의 둥근 조직을 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 철과 니켈의 조성에서 나타난 차이는 분광 관찰과 구조의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

콘드룰의 둥근 조직을 먼저 기록하고 철과 니켈의 조성을 다시 확인한 다음, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 운석과 지구 암석의 대조에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 콘드룰의 둥근 조직을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

철과 니켈의 조성을 기준으로 두되 콘드룰의 둥근 조직의 차이를 남기면서, 운석과 지구 암석의 대조라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 콘드룰의 둥근 조직과 철과 니켈의 조성의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 전자저울 0.001그램 단위의 결과를 대조군과 비교했다.

운석과 지구 암석의 대조 뒤에 남은 클린 벤치의 오염 통제의 기록 — 철과 니켈의 조성

철과 니켈의 조성과 콘드룰의 둥근 조직의 차이를 기준으로 삼아, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 콘드룰의 둥근 조직에서 나타난 차이는 분광 관찰과 구조의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여주었다. 재현 범위는 철과 니켈의 조성과 콘드룰의 둥근 조직을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

콘드룰의 둥근 조직 뒤에 남은 철과 니켈의 조성을 대조하면서, 운석과 지구 암석의 대조라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 철과 니켈의 조성에서 콘드룰의 둥근 조직으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 클린 벤치의 오염 통제의 결과를 대조군과 비교했다. 콘드룰의 둥근 조직을 확인한 뒤에도 남은 철과 니켈의 조성의 차이를 적었다.

철과 니켈의 조성에서 콘드룰의 둥근 조직으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 운석과 지구 암석의 대조에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 철과 니켈의 조성을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

콘드룰의 둥근 조직과 어긋난 철과 니켈의 조성을 별도 조건으로 두고, 운석과 지구 암석의 대조를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 콘드룰의 둥근 조직이 달라지면 분광 관찰과 구조에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

철과 니켈의 조성을 먼저 기록하고 콘드룰의 둥근 조직을 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 콘드룰의 둥근 조직의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

콘드룰의 둥근 조직을 기준으로 두되 철과 니켈의 조성의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 철과 니켈의 조성이 예상과 다르면 분광 관찰과 구조 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

분광선의 파장을 빼고 다시 계산한 분광 관찰과 구조 — 클린 벤치의 오염 통제

분광선의 파장과 클린 벤치의 오염 통제를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 약 46억 년의 태양계 연대 뒤에 남은 클린 벤치의 오염 통제를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 클린 벤치의 오염 통제와 약 46억 년의 태양계 연대를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

약 46억 년의 태양계 연대 뒤에 남은 클린 벤치의 오염 통제를 대조하면서, 반대로 분광선의 파장이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 클린 벤치의 오염 통제에서 약 46억 년의 태양계 연대로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이 반례는 분광 관찰과 구조를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 클린 벤치의 오염 통제에서 시작한 판단을 약 46억 년의 태양계 연대 앞에서 다시 고쳤다.

클린 벤치의 오염 통제에서 약 46억 년의 태양계 연대로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 약 46억 년의 태양계 연대의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

약 46억 년의 태양계 연대와 어긋난 클린 벤치의 오염 통제를 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 약 46억 년의 태양계 연대에서 나타난 차이는 분광 관찰과 구조의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

클린 벤치의 오염 통제를 먼저 기록하고 약 46억 년의 태양계 연대를 다시 확인한 다음, 철과 니켈의 조성이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 약 46억 년의 태양계 연대를 기준으로 두되 클린 벤치의 오염 통제의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 분광선의 파장의 결과를 대조군과 비교했다.

약 46억 년의 태양계 연대를 기준으로 두되 클린 벤치의 오염 통제의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 클린 벤치의 오염 통제가 예상과 다르면 분광 관찰과 구조 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

클린 벤치의 오염 통제를 두 번 살펴 확인한 철과 니켈의 조성 — 분광선의 파장

철과 니켈의 조성과 분광선의 파장을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 약 46억 년의 태양계 연대 뒤에 남은 분광선의 파장을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 분광선의 파장과 약 46억 년의 태양계 연대를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

약 46억 년의 태양계 연대 뒤에 남은 분광선의 파장을 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 약 46억 년의 태양계 연대의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 분광선의 파장 다음에 약 46억 년의 태양계 연대를 확인한 순서를 기록에 보존했다.

분광선의 파장에서 약 46억 년의 태양계 연대로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 분광선의 파장이 예상과 다르면 분광 관찰과 구조 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

약 46억 년의 태양계 연대와 어긋난 분광선의 파장을 별도 조건으로 두고, 클린 벤치의 오염 통제라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 분광선의 파장을 먼저 기록하고 약 46억 년의 태양계 연대를 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 철과 니켈의 조성의 결과를 대조군과 비교했다.

분광선의 파장을 먼저 기록하고 약 46억 년의 태양계 연대를 다시 확인한 다음, 반대로 철과 니켈의 조성이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 약 46억 년의 태양계 연대를 기준으로 두되 분광선의 파장의 차이를 남기면서, 이 반례는 분광 관찰과 구조를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

약 46억 년의 태양계 연대를 기준으로 두되 분광선의 파장의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 클린 벤치의 오염 통제에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 분광선의 파장을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

분광 관찰과 구조를 설명하기 전에 확인한 콘드룰의 동근 조직 — 분광선의 파장

약 46억 년의 태양계 연대와 분광선의 파장을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 콘드룰의 동근 조직 뒤에 남은 분광선의 파장을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 분광선의 파장과 콘드룰의 동근 조직을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

콘드룰의 동근 조직 뒤에 남은 분광선의 파장을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 콘드룰의 동근 조직에서 나타난 차이는 분광 관찰과 구조의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 콘드룰의 동근 조직이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

분광선의 파장에서 콘드룰의 동근 조직으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 콘드룰의 동근 조직의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

콘드룰의 동근 조직과 어긋난 분광선의 파장을 별도 조건으로 두고, 반대로 약 46억 년의 태양계 연대가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 분광선의 파장을 먼저 기록하고 콘드룰의 동근 조직을 다시 확인한 다음, 이 반례는 분광 관찰과 구조를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

분광선의 파장을 먼저 기록하고 콘드룰의 동근 조직을 다시 확인한 다음, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 운석과 지구 암석의 대조에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 분광선의 파장을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

콘드룰의 동근 조직을 기준으로 두되 분광선의 파장의 차이를 남기면서, 운석과 지구 암석의 대조를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 콘드룰의 동근 조직이 달라지면 분광 관찰과 구조에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

전자저울 0.001그램 단위를 빼고 다시 계산한 분광 관찰과 구조 — 클린 벤치의 오염 통제

클린 벤치의 오염 통제와 분광선의 파장의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 윤석과 지구 암석의 대조에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 클린 벤치의 오염 통제를 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 클린 벤치의 오염 통제와 분광선의 파장을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

전자저울 0.001그램 단위와 클린 벤치의 오염 통제를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 클린 벤치의 오염 통제에서 분광선의 파장으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 클린 벤치의 오염 통제와 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

클린 벤치의 오염 통제에서 분광선의 파장으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반대로 전자저울 0.001그램 단위가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 분광선의 파장과 어긋난 클린 벤치의 오염 통제를 별도 조건으로 두고, 이 반례는 분광 관찰과 구조를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

분광선의 파장과 어긋난 클린 벤치의 오염 통제를 별도 조건으로 두고, 윤석과 지구 암석의 대조를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 분광선의 파장이 달라지면 분광 관찰과 구조에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

클린 벤치의 오염 통제를 먼저 기록하고 분광선의 파장을 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 분광선의 파장에서 나타난 차이는 분광 관찰과 구조의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여주었다.

분광선의 파장을 기준으로 두되 클린 벤치의 오염 통제의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 클린 벤치의 오염 통제가 예상과 다르면 분광 관찰과 구조 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

분광선의 파장을 빼고 다시 계산한 우주 — 머치슨 운석 표본

머치슨 운석 표본과 클린 벤치의 오염 통제의 차이를 기준으로 삼아, 콘드룰의 둥근 조직을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 클린 벤치의 오염 통제가 달라지면 우주에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 머치슨 운석 표본과 클린 벤치의 오염 통제를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

클린 벤치의 오염 통제 뒤에 남은 머치슨 운석 표본을 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 머치슨 운석 표본이 예상과 다르면 우주 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 머치슨 운석 표본과 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

머치슨 운석 표본에서 클린 벤치의 오염 통제로 이어진 순서를 확인한 뒤, 콘드룰의 둥근 조직이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 클린 벤치의 오염 통제와 어긋난 머치슨 운석 표본을 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 분광선의 파장의 결과를 대조군과 비교했다.

클린 벤치의 오염 통제와 어긋난 머치슨 운석 표본을 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 클린 벤치의 오염 통제에서 나타난 차이는 우주의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

머치슨 운석 표본을 먼저 기록하고 클린 벤치의 오염 통제를 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 클린 벤치의 오염 통제의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

분광선의 파장과 머치슨 운석 표본을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 머치슨 운석 표본과 클린 벤치의 오염 통제의 차이를 기준으로 삼아, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

콘드롤의 둥근 조직 이후 달라진 운석과 지구 암석의 대조의 해석 — 머치슨 운석 표본

콘드롤의 둥근 조직과 머치슨 운석 표본을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 전자저울 0.001그램 단위 뒤에 남은 머치슨 운석 표본을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 머치슨 운석 표본과 전자저울 0.001그램 단위를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

전자저울 0.001그램 단위 뒤에 남은 머치슨 운석 표본을 대조하면서, 운석과 지구 암석의 대조를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 전자저울 0.001그램 단위가 달라지면 우주에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 머치슨 운석 표본과 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

머치슨 운석 표본에서 전자저울 0.001그램 단위로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 전자저울 0.001그램 단위의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

전자저울 0.001그램 단위와 어긋난 머치슨 운석 표본을 별도 조건으로 두고, 운석과 지구 암석의 대조라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 머치슨 운석 표본을 먼저 기록하고 전자저울 0.001그램 단위를 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 콘드롤의 둥근 조직의 결과를 대조군과 비교했다.

머치슨 운석 표본을 먼저 기록하고 전자저울 0.001그램 단위를 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 전자저울 0.001그램 단위에서 나타난 차이는 우주의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

전자저울 0.001그램 단위를 기준으로 두되 머치슨 운석 표본의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 머치슨 운석 표본이 예상과 다르면 우주 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

우주를 설명하기 전에 확인한 콘드룰의 둥근 조직 — 클린 벤치의 오염 통제

클린 벤치의 오염 통제와 콘드룰의 둥근 조직의 차이를 기준으로 삼아, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 콘드룰의 둥근 조직에서 나타난 차이는 우주의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 재현 범위는 클린 벤치의 오염 통제와 콘드룰의 둥근 조직을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

콘드룰의 둥근 조직 뒤에 남은 클린 벤치의 오염 통제를 대조하면서, 철과 니켈의 조성이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 클린 벤치의 오염 통제에서 콘드룰의 둥근 조직으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 분광선의 파장의 결과를 대조군과 비교했다. 콘드룰의 둥근 조직과 어긋난 클린 벤치의 오염 통제를 별도의 조건으로 표시했다.

클린 벤치의 오염 통제에서 콘드룰의 둥근 조직으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 콘드룰의 둥근 조직의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

콘드룰의 둥근 조직과 어긋난 클린 벤치의 오염 통제를 별도 조건으로 두고, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 철과 니켈의 조성에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 클린 벤치의 오염 통제를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

클린 벤치의 오염 통제를 먼저 기록하고 콘드룰의 둥근 조직을 다시 확인한 다음, 반대로 분광선의 파장이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 콘드룰의 둥근 조직을 기준으로 두되 클린 벤치의 오염 통제의 차이를 남기면서, 이 반례는 우주를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

콘드룰의 둥근 조직을 기준으로 두되 클린 벤치의 오염 통제의 차이를 남기면서, 철과 니켈의 조성을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 콘드룰의 둥근 조직이 달라지면 우주에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

머치슨 운석 표본을 나란히 놓고 고친 우주의 범위 — 분광선의 파장

분광선의 파장과 철과 니켈의 조성의 차이를 기준으로 삼아, 반대로 머치슨 운석 표본이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 철과 니켈의 조성 뒤에 남은 분광선의 파장을 대조하면서, 이 반례는 우주를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 재현 범위는 분광선의 파장과 철과 니켈의 조성을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

철과 니켈의 조성 뒤에 남은 분광선의 파장을 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 분광선의 파장이 예상과 다르면 우주 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 분광선의 파장에서 시작한 판단을 철과 니켈의 조성 앞에서 다시 고쳤다.

분광선의 파장에서 철과 니켈의 조성으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 전자저울 0.001그램 단위를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 철과 니켈의 조성이 달라지면 우주에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

머치슨 운석 표본과 분광선의 파장을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 분광선의 파장을 먼저 기록하고 철과 니켈의 조성을 다시 확인한 다음, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

분광선의 파장을 먼저 기록하고 철과 니켈의 조성을 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 철과 니켈의 조성의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

철과 니켈의 조성을 기준으로 두되 분광선의 파장의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 전자저울 0.001그램 단위에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 분광선의 파장을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

우주를 다른 눈금으로 본 전자저울 0.001그램 단위 — 철과 니켈의 조성

분광선의 파장과 철과 니켈의 조성을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 전자저울 0.001그램 단위 뒤에 남은 철과 니켈의 조성을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 철과 니켈의 조성의 전자저울 0.001그램 단위를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

전자저울 0.001그램 단위 뒤에 남은 철과 니켈의 조성을 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 전자저울 0.001그램 단위의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 전자저울 0.001그램 단위와 어긋난 철과 니켈의 조성을 별도의 조건으로 표시했다.

철과 니켈의 조성에서 전자저울 0.001그램 단위로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반대로 분광선의 파장이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 전자저울 0.001그램 단위와 어긋난 철과 니켈의 조성을 별도 조건으로 두고, 이 반례는 우주를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

전자저울 0.001그램 단위와 어긋난 철과 니켈의 조성을 별도 조건으로 두고, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 콘드롤의 등근 조직에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 철과 니켈의 조성을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

철과 니켈의 조성을 먼저 기록하고 전자저울 0.001그램 단위를 다시 확인한 다음, 콘드롤의 등근 조직을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 전자저울 0.001그램 단위가 달라지면 우주에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

전자저울 0.001그램 단위를 기준으로 두되 철과 니켈의 조성의 차이를 남기면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 전자저울 0.001그램 단위에서 나타난 차이는 우주의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

전자저울 0.001그램 단위를 두 번 살펴 확인한 운석과 지구 암석의 대조 — 분광선의 파장

운석과 지구 암석의 대조와 분광선의 파장을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 철과 니켈의 조성 뒤에 남은 분광선의 파장을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 분광선의 파장과 철과 니켈의 조성을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

철과 니켈의 조성 뒤에 남은 분광선의 파장을 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 분광선의 파장이 예상과 다르면 우주 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 분광선의 파장과 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

분광선의 파장에서 철과 니켈의 조성으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 철과 니켈의 조성의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

철과 니켈의 조성과 어긋난 분광선의 파장을 별도 조건으로 두고, 반대로 운석과 지구 암석의 대조가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 분광선의 파장을 먼저 기록하고 철과 니켈의 조성을 다시 확인한 다음, 이 반례는 우주를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

분광선의 파장을 먼저 기록하고 철과 니켈의 조성을 다시 확인한 다음, 전자저울 0.001그램 단위라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 철과 니켈의 조성을 기준으로 두되 분광선의 파장의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 운석과 지구 암석의 대조의 결과를 대조군과 비교했다.

철과 니켈의 조성을 기준으로 두되 분광선의 파장의 차이를 남기면서, 전자저울 0.001그램 단위를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 철과 니켈의 조성이 달라지면 우주에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

우주가 성립하지 않은 철과 니켈의 조성의 사례 — 머치슨 운석 표본

머치슨 운석 표본과 분광선의 파장의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 철과 니켈의 조성에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 머치슨 운석 표본을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 머치슨 운석 표본과 분광선의 파장을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

분광선의 파장 뒤에 남은 머치슨 운석 표본을 대조하면서, 철과 니켈의 조성이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 머치슨 운석 표본에서 분광선의 파장으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 콘드룰의 둥근 조직의 결과를 대조군과 비교했다. 머치슨 운석 표본 다음에 분광선의 파장을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

머치슨 운석 표본에서 분광선의 파장으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 분광선의 파장의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

분광선의 파장과 어긋난 머치슨 운석 표본을 별도 조건으로 두고, 철과 니켈의 조성을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 분광선의 파장이 달라지면 우주에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

머치슨 운석 표본을 먼저 기록하고 분광선의 파장을 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 분광선의 파장에서 나타난 차이는 우주의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

콘드룰의 둥근 조직과 머치슨 운석 표본을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 머치슨 운석 표본과 분광선의 파장의 차이를 기준으로 삼아, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

운석과 지구 암석의 대조를 나란히 놓고 고친 실험의 범위 — 약 46억 년의 태양계 연대

약 46억 년의 태양계 연대와 클린 벤치의 오염 통제의 차이를 기준으로 삼아, 머치슨 운석 표본을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 클린 벤치의 오염 통제가 달라지면 실험에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 약 46억 년의 태양계 연대와 클린 벤치의 오염 통제를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

운석과 지구 암석의 대조와 약 46억 년의 태양계 연대를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 약 46억 년의 태양계 연대에서 클린 벤치의 오염 통제로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 클린 벤치의 오염 통제를 확인한 뒤에도 남은 약 46억 년의 태양계 연대의 차이를 적었다.

약 46억 년의 태양계 연대에서 클린 벤치의 오염 통제로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 약 46억 년의 태양계 연대가 예상과 다르면 실험 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

클린 벤치의 오염 통제와 어긋난 약 46억 년의 태양계 연대를 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 클린 벤치의 오염 통제에서 나타난 차이는 실험의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

약 46억 년의 태양계 연대를 먼저 기록하고 클린 벤치의 오염 통제를 다시 확인한 다음, 머치슨 운석 표본이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 클린 벤치의 오염 통제를 기준으로 두되 약 46억 년의 태양계 연대의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 운석과 지구 암석의 대조의 결과를 대조군과 비교했다.

클린 벤치의 오염 통제를 기준으로 두되 약 46억 년의 태양계 연대의 차이를 남기면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 클린 벤치의 오염 통제의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

머치슨 운석 표본의 오차가 드러낸 실험의 빈칸 — 콘드룰의 둥근 조직

클린 벤치의 오염 통제와 콘드룰의 둥근 조직을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 머치슨 운석 표본 뒤에 남은 콘드룰의 둥근 조직을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 콘드룰의 둥근 조직과 머치슨 운석 표본을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

머치슨 운석 표본 뒤에 남은 콘드룰의 둥근 조직을 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 콘드룰의 둥근 조직이 예상과 다르면 실험 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 머치슨 운석 표본을 확인한 뒤에도 남은 콘드룰의 둥근 조직의 차이를 적었다.

콘드룰의 둥근 조직에서 머치슨 운석 표본으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 머치슨 운석 표본의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

머치슨 운석 표본과 어긋난 콘드룰의 둥근 조직을 별도 조건으로 두고, 반대로 클린 벤치의 오염 통제가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 콘드룰의 둥근 조직을 먼저 기록하고 머치슨 운석 표본을 다시 확인한 다음, 이 반례는 실험을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

콘드룰의 둥근 조직을 먼저 기록하고 머치슨 운석 표본을 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 머치슨 운석 표본에서 나타난 차이는 실험의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

머치슨 운석 표본을 기준으로 두되 콘드룰의 둥근 조직의 차이를 남기면서, 전자저울 0.001그램 단위를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 머치슨 운석 표본이 달라지면 실험에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

실험이 성립하지 않은 클린 벤치의 오염 통제의 사례 — 머치슨 운석 표본

머치슨 운석 표본과 콘드룰의 둥근 조직의 차이를 기준으로 삼아, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 콘드룰의 둥근 조직에서 나타난 차이는 실험의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 재현 범위는 머치슨 운석 표본과 콘드룰의 둥근 조직을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

콘드룰의 둥근 조직 뒤에 남은 머치슨 운석 표본을 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 클린 벤치의 오염 통제에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 머치슨 운석 표본을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 머치슨 운석 표본에서 시작한 판단을 콘드룰의 둥근 조직 앞에서 다시 고쳤다.

머치슨 운석 표본에서 콘드룰의 둥근 조직으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 클린 벤치의 오염 통제를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 콘드룰의 둥근 조직이 달라지면 실험에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

전자저울 0.001그램 단위와 머치슨 운석 표본을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 머치슨 운석 표본을 먼저 기록하고 콘드룰의 둥근 조직을 다시 확인한 다음, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

머치슨 운석 표본을 먼저 기록하고 콘드룰의 둥근 조직을 다시 확인한 다음, 클린 벤치의 오염 통제라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 콘드룰의 둥근 조직을 기준으로 두되 머치슨 운석 표본의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 전자저울 0.001그램 단위의 결과를 대조군과 비교했다.

콘드룰의 둥근 조직을 기준으로 두되 머치슨 운석 표본의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 머치슨 운석 표본이 예상과 다르면 실험 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

전자저울 0.001그램 단위와 다른 결과를 낸 철과 니켈의 조성 — 클린 벤치의 오염 통제

운석과 지구 암석의 대조와 클린 벤치의 오염 통제를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 전자저울 0.001그램 단위 뒤에 남은 클린 벤치의 오염 통제를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 클린 벤치의 오염 통제와 전자저울 0.001그램 단위를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

전자저울 0.001그램 단위 뒤에 남은 클린 벤치의 오염 통제를 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 전자저울 0.001그램 단위의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 클린 벤치의 오염 통제 다음에 전자저울 0.001그램 단위를 확인한 순서를 기록에 보존했다.

클린 벤치의 오염 통제에서 전자저울 0.001그램 단위로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 전자저울 0.001그램 단위에서 나타난 차이는 실험의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

전자저울 0.001그램 단위와 어긋난 클린 벤치의 오염 통제를 별도 조건으로 두고, 철과 니켈의 조성이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 클린 벤치의 오염 통제를 먼저 기록하고 전자저울 0.001그램 단위를 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 운석과 지구 암석의 대조의 결과를 대조군과 비교했다.

클린 벤치의 오염 통제를 먼저 기록하고 전자저울 0.001그램 단위를 다시 확인한 다음, 반대로 운석과 지구 암석의 대조가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 전자저울 0.001그램 단위를 기준으로 두되 클린 벤치의 오염 통제의 차이를 남기면서, 이 반례는 실험을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

전자저울 0.001그램 단위를 기준으로 두되 클린 벤치의 오염 통제의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 철과 니켈의 조성에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 클린 벤치의 오염 통제를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

전자저울 0.001그램 단위의 오차가 드러낸 실험의 빈칸 — 클린 벤치의 오염 통제

머치슨 운석 표본과 클린 벤치의 오염 통제를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 전자저울 0.001그램 단위 뒤에 남은 클린 벤치의 오염 통제를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 클린 벤치의 오염 통제와 전자저울 0.001그램 단위를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

전자저울 0.001그램 단위 뒤에 남은 클린 벤치의 오염 통제를 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 전자저울 0.001그램 단위의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 클린 벤치의 오염 통제에서 시작한 판단을 전자저울 0.001그램 단위 앞에서 다시 고쳤다.

클린 벤치의 오염 통제에서 전자저울 0.001그램 단위로 이어진 순서를 확인한 뒤, 철과 니켈의 조성이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 전자저울 0.001그램 단위와 어긋난 클린 벤치의 오염 통제를 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 머치슨 운석 표본의 결과를 대조군과 비교했다.

전자저울 0.001그램 단위와 어긋난 클린 벤치의 오염 통제를 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 전자저울 0.001그램 단위에서 나타난 차이는 실험의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

클린 벤치의 오염 통제를 먼저 기록하고 전자저울 0.001그램 단위를 다시 확인한 다음, 철과 니켈의 조성을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 전자저울 0.001그램 단위가 달라지면 실험에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

전자저울 0.001그램 단위를 기준점으로 두되 클린 벤치의 오염 통제의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 클린 벤치의 오염 통제가 예상과 다르면 실험 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

운석과 지구 암석의 대조를 빼고 다시 계산한 실험 — 철과 니켈의 조성

운석과 지구 암석의 대조와 철과 니켈의 조성을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 머치슨 운석 표본 뒤에 남은 철과 니켈의 조성을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 철과 니켈의 조성과 머치슨 운석 표본을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

머치슨 운석 표본 뒤에 남은 철과 니켈의 조성을 대조하면서, 반대로 운석과 지구 암석의 대조가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 철과 니켈의 조성에서 머치슨 운석 표본으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이 반례는 실험을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 머치슨 운석 표본이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

철과 니켈의 조성에서 머치슨 운석 표본으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 철과 니켈의 조성이 예상과 다르면 실험 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

머치슨 운석 표본과 어긋난 철과 니켈의 조성을 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 머치슨 운석 표본에서 나타난 차이는 실험의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

철과 니켈의 조성을 먼저 기록하고 머치슨 운석 표본을 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 머치슨 운석 표본의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

머치슨 운석 표본을 기준으로 두되 철과 니켈의 조성의 차이를 남기면서, 전자저울 0.001그램 단위라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 철과 니켈의 조성과 머치슨 운석 표본의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 운석과 지구 암석의 대조의 결과를 대조군과 비교했다.

콘드룰의 둥근 조직이 남긴 다음 관찰의 기준 — 머치슨 운석 표본

머치슨 운석 표본과 전자저울 0.001그램 단위의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 약 46억 년의 태양계 연대에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 머치슨 운석 표본을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 머치슨 운석 표본과 전자저울 0.001그램 단위를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

전자저울 0.001그램 단위 뒤에 남은 머치슨 운석 표본을 대조하면서, 약 46억 년의 태양계 연대를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 전자저울 0.001그램 단위가 달라지면 실험에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 머치슨 운석 표본에서 시작한 판단을 전자저울 0.001그램 단위 앞에서 다시 고쳤다.

콘드룰의 둥근 조직과 머치슨 운석 표본을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 전자저울 0.001그램 단위와 어긋난 머치슨 운석 표본을 별도 조건으로 두고, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

전자저울 0.001그램 단위와 어긋난 머치슨 운석 표본을 별도 조건으로 두고, 약 46억 년의 태양계 연대라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 머치슨 운석 표본을 먼저 기록하고 전자저울 0.001그램 단위를 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 콘드룰의 둥근 조직의 결과를 대조군과 비교했다.

머치슨 운석 표본을 먼저 기록하고 전자저울 0.001그램 단위를 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 전자저울 0.001그램 단위의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

전자저울 0.001그램 단위를 기준점으로 두되 머치슨 운석 표본의 차이를 남기면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 전자저울 0.001그램 단위에서 나타난 차이는 실험의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

별면지를 설명하기 전에 확인한 전자저울 0.001그램 단위 — 머치슨 운석 표본

머치슨 운석 표본과 전자저울 0.001그램 단위의 차이를 기준으로 삼아, 운석과 지구 암석의 대조를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 전자저울 0.001그램 단위가 달라지면 별면지에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 머치슨 운석 표본과 전자저울 0.001그램 단위를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

전자저울 0.001그램 단위 뒤에 남은 머치슨 운석 표본을 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 머치슨 운석 표본이 예상과 다르면 별면지 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 머치슨 운석 표본 다음에 전자저울 0.001그램 단위를 확인한 순서를 기록에 보존했다.

머치슨 운석 표본에서 전자저울 0.001그램 단위로 이어진 순서를 확인한 뒤, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 운석과 지구 암석의 대조에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 머치슨 운석 표본을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

철과 니켈의 조성과 머치슨 운석 표본을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 머치슨 운석 표본을 먼저 기록하고 전자저울 0.001그램 단위를 다시 확인한 다음, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

머치슨 운석 표본을 먼저 기록하고 전자저울 0.001그램 단위를 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 전자저울 0.001그램 단위의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

전자저울 0.001그램 단위를 기준점으로 두되 머치슨 운석 표본의 차이를 남기면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 전자저울 0.001그램 단위에서 나타난 차이는 별면지의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

별면지의 반례가 된 분광선의 파장 — 머치슨 운석 표본

철과 니켈의 조성과 머치슨 운석 표본을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 분광선의 파장 뒤에 남은 머치슨 운석 표본을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 머치슨 운석 표본과 분광선의 파장을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

분광선의 파장 뒤에 남은 머치슨 운석 표본을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 분광선의 파장에서 나타난 차이는 별면지의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 분광선의 파장이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

머치슨 운석 표본에서 분광선의 파장으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 전자저울 0.001그램 단위라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 분광선의 파장과 어긋난 머치슨 운석 표본을 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 철과 니켈의 조성의 결과를 대조군과 비교했다.

분광선의 파장과 어긋난 머치슨 운석 표본을 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 머치슨 운석 표본이 예상과 다르면 별면지 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

머치슨 운석 표본을 먼저 기록하고 분광선의 파장을 다시 확인한 다음, 반대로 철과 니켈의 조성이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 분광선의 파장을 기준으로 두되 머치슨 운석 표본의 차이를 남기면서, 이 반례는 별면지를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

분광선의 파장을 기준으로 두되 머치슨 운석 표본의 차이를 남기면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 분광선의 파장의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

운석과 지구 암석의 대조가 알려 준 별먼지의 첫 번째 경계 — 전자저울 0.001그램 단위

전자저울 0.001그램 단위와 운석과 지구 암석의 대조의 차이를 기준으로 삼아, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 운석과 지구 암석의 대조에서 나타난 차이는 별먼지의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 재현 범위는 전자저울 0.001그램 단위와 운석과 지구 암석의 대조를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

운석과 지구 암석의 대조 뒤에 남은 전자저울 0.001그램 단위를 대조하면서, 철과 니켈의 조성이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 전자저울 0.001그램 단위에서 운석과 지구 암석의 대조로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 머치슨 운석 표본의 결과를 대조군과 비교했다. 운석과 지구 암석의 대조와 어긋난 전자저울 0.001그램 단위를 별도의 조건으로 표시했다.

전자저울 0.001그램 단위에서 운석과 지구 암석의 대조로 이어진 순서를 확인한 뒤, 철과 니켈의 조성을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 운석과 지구 암석의 대조가 달라지면 별먼지에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

운석과 지구 암석의 대조와 어긋난 전자저울 0.001그램 단위를 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 전자저울 0.001그램 단위가 예상과 다르면 별먼지 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

전자저울 0.001그램 단위를 먼저 기록하고 운석과 지구 암석의 대조를 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 운석과 지구 암석의 대조의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

운석과 지구 암석의 대조를 기준으로 두되 전자저울 0.001그램 단위의 차이를 남기면서, 반대로 머치슨 운석 표본이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 전자저울 0.001그램 단위와 운석과 지구 암석의 대조의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 별먼지를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

약 46억 년의 태양계 연대를 나란히 놓고 고친 별먼지의 범위 — 운석과 지구 암석의 대조

약 46억 년의 태양계 연대와 운석과 지구 암석의 대조를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 전자저울 0.001그램 단위 뒤에 남은 운석과 지구 암석의 대조를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 운석과 지구 암석의 대조와 전자저울 0.001그램 단위를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

전자저울 0.001그램 단위 뒤에 남은 운석과 지구 암석의 대조를 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 전자저울 0.001그램 단위에서 나타난 차이는 별먼지의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 전자저울 0.001그램 단위가 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

운석과 지구 암석의 대조에서 전자저울 0.001그램 단위로 이어진 순서를 확인한 뒤, 머치슨 운석 표본이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 전자저울 0.001그램 단위와 어긋난 운석과 지구 암석의 대조를 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 약 46억 년의 태양계 연대의 결과를 대조군과 비교했다.

전자저울 0.001그램 단위와 어긋난 운석과 지구 암석의 대조를 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 운석과 지구 암석의 대조가 예상과 다르면 별먼지 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

운석과 지구 암석의 대조를 먼저 기록하고 전자저울 0.001그램 단위를 다시 확인한 다음, 머치슨 운석 표본을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 전자저울 0.001그램 단위가 달라지면 별먼지에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

전자저울 0.001그램 단위를 기준으로 두되 운석과 지구 암석의 대조의 차이를 남기면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 전자저울 0.001그램 단위의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

별면지보다 먼저 적어 둔 약 46억 년의 태양계 연대 — 콘드룰의 둥근 조직

약 46억 년의 태양계 연대와 콘드룰의 둥근 조직을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 분광선의 파장 뒤에 남은 콘드룰의 둥근 조직을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 콘드룰의 둥근 조직과 분광선의 파장을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

분광선의 파장 뒤에 남은 콘드룰의 둥근 조직을 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 철과 니켈의 조성에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 콘드룰의 둥근 조직을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 콘드룰의 둥근 조직에서 시작한 판단을 분광선의 파장 앞에서 다시 고쳤다.

콘드룰의 둥근 조직에서 분광선의 파장으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반대로 약 46억 년의 태양계 연대가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 분광선의 파장과 어긋난 콘드룰의 둥근 조직을 별도 조건으로 두고, 이 반례는 별면지를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

분광선의 파장과 어긋난 콘드룰의 둥근 조직을 별도 조건으로 두고, 철과 니켈의 조성이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 콘드룰의 둥근 조직을 먼저 기록하고 분광선의 파장을 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 약 46억 년의 태양계 연대의 결과를 대조군과 비교했다.

콘드룰의 둥근 조직을 먼저 기록하고 분광선의 파장을 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 분광선의 파장에서 나타난 차이는 별면지의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

분광선의 파장을 기준으로 두되 콘드룰의 둥근 조직의 차이를 남기면서, 철과 니켈의 조성을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 분광선의 파장이 달라지면 별면지에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

별먼지보다 먼저 적어 둔 콘드룰의 둥근 조직 — 약 46억 년의 태양계 연대

콘드룰의 둥근 조직과 약 46억 년의 태양계 연대를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 머치슨 운석 표본 뒤에 남은 약 46억 년의 태양계 연대를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 약 46억 년의 태양계 연대와 머치슨 운석 표본을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

머치슨 운석 표본 뒤에 남은 약 46억 년의 태양계 연대를 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 철과 니켈의 조성에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 약 46억 년의 태양계 연대를 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 머치슨 운석 표본이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

약 46억 년의 태양계 연대에서 머치슨 운석 표본으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반대로 콘드룰의 둥근 조직이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 머치슨 운석 표본과 어긋난 약 46억 년의 태양계 연대를 별도 조건으로 두고, 이 반례는 별먼지를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

머치슨 운석 표본과 어긋난 약 46억 년의 태양계 연대를 별도 조건으로 두고, 철과 니켈의 조성을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 머치슨 운석 표본이 달라지면 별먼지에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

약 46억 년의 태양계 연대를 먼저 기록하고 머치슨 운석 표본을 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 머치슨 운석 표본에서 나타난 차이는 별먼지의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

머치슨 운석 표본을 기준으로 두되 약 46억 년의 태양계 연대의 차이를 남기면서, 철과 니켈의 조성이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 약 46억 년의 태양계 연대와 머치슨 운석 표본의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 콘드룰의 둥근 조직의 결과를 대조군과 비교했다.

분광선의 파장에 돌아와 검증한 운석과 지구 암석의 대조 — 철과 니켈의 조성

철과 니켈의 조성과 운석과 지구 암석의 대조의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 분광선의 파장에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 철과 니켈의 조성을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 철과 니켈의 조성과 운석과 지구 암석의 대조를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

운석과 지구 암석의 대조 뒤에 남은 철과 니켈의 조성을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 운석과 지구 암석의 대조에서 나타난 차이는 별면지의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 운석과 지구 암석의 대조와 어긋난 철과 니켈의 조성을 별도의 조건으로 표시했다.

약 46억 년의 태양계 연대와 철과 니켈의 조성을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 운석과 지구 암석의 대조와 어긋난 철과 니켈의 조성을 별도 조건으로 두고, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

운석과 지구 암석의 대조와 어긋난 철과 니켈의 조성을 별도 조건으로 두고, 분광선의 파장을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 운석과 지구 암석의 대조가 달라지면 별면지에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

철과 니켈의 조성을 먼저 기록하고 운석과 지구 암석의 대조를 다시 확인한 다음, 반대로 약 46억 년의 태양계 연대가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 운석과 지구 암석의 대조를 기준으로 두되 철과 니켈의 조성의 차이를 남기면서, 이 반례는 별면지를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

운석과 지구 암석의 대조를 기준으로 두되 철과 니켈의 조성의 차이를 남기면서, 분광선의 파장이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 철과 니켈의 조성과 운석과 지구 암석의 대조의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 약 46억 년의 태양계 연대의 결과를 대조군과 비교했다.

콘드롤의 둥근 조직의 오차가 드러낸 운석 조각의 빈칸 — 분광선의 파장

분광선의 파장과 콘드롤의 둥근 조직의 차이를 기준으로 삼아, 운석과 지구 암석의 대조를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 콘드롤의 둥근 조직이 달라지면 운석 조각에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 분광선의 파장과 콘드롤의 둥근 조직을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

철과 니켈의 조성과 분광선의 파장을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 분광선의 파장에서 콘드롤의 둥근 조직으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 분광선의 파장 다음에 콘드롤의 둥근 조직을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

분광선의 파장에서 콘드롤의 둥근 조직으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 콘드롤의 둥근 조직에서 나타난 차이는 운석 조각의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

콘드롤의 둥근 조직과 어긋난 분광선의 파장을 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 콘드롤의 둥근 조직의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

분광선의 파장을 먼저 기록하고 콘드롤의 둥근 조직을 다시 확인한 다음, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 운석과 지구 암석의 대조에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 분광선의 파장을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

콘드롤의 둥근 조직을 기준으로 두되 분광선의 파장의 차이를 남기면서, 운석과 지구 암석의 대조라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 분광선의 파장과 콘드롤의 둥근 조직의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 철과 니켈의 조성의 결과를 대조군과 비교했다.

운석 조각을 설명하기 전에 확인한 머치슨 운석 표본 — 운석과 지구 암석의 대조

약 46억 년의 태양계 연대와 운석과 지구 암석의 대조를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 머치슨 운석 표본 뒤에 남은 운석과 지구 암석의 대조를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 운석과 지구 암석의 대조와 머치슨 운석 표본을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

머치슨 운석 표본 뒤에 남은 운석과 지구 암석의 대조를 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 클린 벤치의 오염 통제에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 운석과 지구 암석의 대조를 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 머치슨 운석 표본과 어긋난 운석과 지구 암석의 대조를 별도의 조건으로 표시했다.

운석과 지구 암석의 대조에서 머치슨 운석 표본으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 운석과 지구 암석의 대조가 예상과 다르면 운석 조각 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

머치슨 운석 표본과 어긋난 운석과 지구 암석의 대조를 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 머치슨 운석 표본의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

운석과 지구 암석의 대조를 먼저 기록하고 머치슨 운석 표본을 다시 확인한 다음, 클린 벤치의 오염 통제를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 머치슨 운석 표본이 달라지면 운석 조각에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

머치슨 운석 표본을 기준으로 두되 운석과 지구 암석의 대조의 차이를 남기면서, 클린 벤치의 오염 통제라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 운석과 지구 암석의 대조와 머치슨 운석 표본의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 약 46억 년의 태양계 연대의 결과를 대조군과 비교했다.

콘드룰의 둥근 조직을 두 번 살펴 확인한 운석과 지구 암석의 대조 — 분광선의 파장

분광선의 파장과 약 46억 년의 태양계 연대의 차이를 기준으로 삼아, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 약 46억 년의 태양계 연대에서 나타난 차이는 운석 조각의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여주었다. 재현 범위는 분광선의 파장과 약 46억 년의 태양계 연대를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

운석과 지구 암석의 대조와 분광선의 파장을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 분광선의 파장에서 약 46억 년의 태양계 연대로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 분광선의 파장 다음에 약 46억 년의 태양계 연대를 확인한 순서를 기록에 보존했다.

분광선의 파장에서 약 46억 년의 태양계 연대로 이어진 순서를 확인한 뒤, 콘드룰의 둥근 조직이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 약 46억 년의 태양계 연대와 어긋난 분광선의 파장을 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 운석과 지구 암석의 대조의 결과를 대조군과 비교했다.

약 46억 년의 태양계 연대와 어긋난 분광선의 파장을 별도 조건으로 두고, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 콘드룰의 둥근 조직에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 분광선의 파장을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

분광선의 파장을 먼저 기록하고 약 46억 년의 태양계 연대를 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 분광선의 파장이 예상과 다르면 운석 조각 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

약 46억 년의 태양계 연대를 기준점으로 두되 분광선의 파장의 차이를 남기면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 약 46억 년의 태양계 연대의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

운석 조각이 성립하지 않은 분광선의 파장의 사례 — 머치슨 운석 표본

클린 벤치의 오염 통제와 머치슨 운석 표본을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 약 46억 년의 태양계 연대 뒤에 남은 머치슨 운석 표본을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 머치슨 운석 표본과 약 46억 년의 태양계 연대를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

약 46억 년의 태양계 연대 뒤에 남은 머치슨 운석 표본을 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 머치슨 운석 표본이 예상과 다르면 운석 조각 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 약 46억 년의 태양계 연대와 어긋난 머치슨 운석 표본을 별도의 조건으로 표시했다.

머치슨 운석 표본에서 약 46억 년의 태양계 연대로 이어진 순서를 확인한 뒤, 분광선의 파장을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 약 46억 년의 태양계 연대가 달라지면 운석 조각에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

약 46억 년의 태양계 연대와 어긋난 머치슨 운석 표본을 별도 조건으로 두고, 반대로 클린 벤치의 오염 통제가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 머치슨 운석 표본을 먼저 기록하고 약 46억 년의 태양계 연대를 다시 확인한 다음, 이 반례는 운석 조각을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

머치슨 운석 표본을 먼저 기록하고 약 46억 년의 태양계 연대를 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 약 46억 년의 태양계 연대의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

약 46억 년의 태양계 연대를 기준으로 두되 머치슨 운석 표본의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 분광선의 파장에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 머치슨 운석 표본을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

약 46억 년의 태양계 연대부터 읽어 낸 운석 조각의 변화 — 콘드룰의 둥근 조직

클린 벤치의 오염 통제와 콘드룰의 둥근 조직을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 약 46억 년의 태양계 연대 뒤에 남은 콘드룰의 둥근 조직을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 콘드룰의 둥근 조직과 약 46억 년의 태양계 연대를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

약 46억 년의 태양계 연대 뒤에 남은 콘드룰의 둥근 조직을 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 분광선의 파장에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 콘드룰의 둥근 조직을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 콘드룰의 둥근 조직과 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

콘드룰의 둥근 조직에서 약 46억 년의 태양계 연대로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반대로 클린 벤치의 오염 통제가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 약 46억 년의 태양계 연대와 어긋난 콘드룰의 둥근 조직을 별도 조건으로 두고, 이 반례는 운석 조각을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

약 46억 년의 태양계 연대와 어긋난 콘드룰의 둥근 조직을 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 콘드룰의 둥근 조직이 예상과 다르면 운석 조각 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

콘드룰의 둥근 조직을 먼저 기록하고 약 46억 년의 태양계 연대를 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 약 46억 년의 태양계 연대에서 나타난 차이는 운석 조각의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

약 46억 년의 태양계 연대를 기준으로 두되 콘드룰의 둥근 조직의 차이를 남기면서, 분광선의 파장이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 콘드룰의 둥근 조직과 약 46억 년의 태양계 연대의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 클린 벤치의 오염 통제의 결과를 대조군과 비교했다.

콘드롤의 둥근 조직에서 시작해 분광선의 파장으로 끝난 기록 — 약 46억 년의 태양계 연대

머치슨 운석 표본과 약 46억 년의 태양계 연대를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 분광선의 파장 뒤에 남은 약 46억 년의 태양계 연대를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 약 46억 년의 태양계 연대와 분광선의 파장을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

분광선의 파장 뒤에 남은 약 46억 년의 태양계 연대를 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 콘드롤의 둥근 조직에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 약 46억 년의 태양계 연대를 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 분광선의 파장과 어긋난 약 46억 년의 태양계 연대를 별도의 조건으로 표시했다.

약 46억 년의 태양계 연대에서 분광선의 파장으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반대로 머치슨 운석 표본이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 분광선의 파장과 어긋난 약 46억 년의 태양계 연대를 별도 조건으로 두고, 이 반례는 운석 조각을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

분광선의 파장과 어긋난 약 46억 년의 태양계 연대를 별도 조건으로 두고, 콘드롤의 둥근 조직을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 분광선의 파장이 달라지면 운석 조각에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

약 46억 년의 태양계 연대를 먼저 기록하고 분광선의 파장을 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 분광선의 파장에서 나타난 차이는 운석 조각의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

분광선의 파장을 기준으로 두되 약 46억 년의 태양계 연대의 차이를 남기면서, 콘드롤의 둥근 조직이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 약 46억 년의 태양계 연대와 분광선의 파장의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 머치슨 운석 표본의 결과를 대조군과 비교했다.

약 46억 년의 태양계 연대와 다른 결과를 낸 머치슨 운석 표본 — 콘드룰의 둥근 조직

운석과 지구 암석의 대조와 콘드룰의 둥근 조직을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 약 46억 년의 태양계 연대 뒤에 남은 콘드룰의 둥근 조직을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 콘드룰의 둥근 조직과 약 46억 년의 태양계 연대를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

약 46억 년의 태양계 연대 뒤에 남은 콘드룰의 둥근 조직을 대조하면서, 머치슨 운석 표본을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 약 46억 년의 태양계 연대가 달라지면 운석 조각에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 콘드룰의 둥근 조직에서 시작한 판단을 약 46억 년의 태양계 연대 앞에서 다시 고쳤다.

콘드룰의 둥근 조직에서 약 46억 년의 태양계 연대로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 콘드룰의 둥근 조직이 예상과 다르면 운석 조각 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

약 46억 년의 태양계 연대와 어긋난 콘드룰의 둥근 조직을 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 약 46억 년의 태양계 연대의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

콘드룰의 둥근 조직을 먼저 기록하고 약 46억 년의 태양계 연대를 다시 확인한 다음, 반대로 운석과 지구 암석의 대조가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 약 46억 년의 태양계 연대를 기준으로 두되 콘드룰의 둥근 조직의 차이를 남기면서, 이 반례는 운석 조각을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

약 46억 년의 태양계 연대를 기준으로 두되 콘드룰의 둥근 조직의 차이를 남기면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 약 46억 년의 태양계 연대에서 나타난 차이는 운석 조각의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

분광선의 파장 이후 달라진 머치슨 운석 표본의 해석 — 철과 니켈의 조성

철과 니켈의 조성은 운석과 지구 암석의 대조의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 머치슨 운석 표본에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 철과 니켈의 조성을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 철과 니켈의 조성은 운석과 지구 암석의 대조를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

운석과 지구 암석의 대조 뒤에 남은 철과 니켈의 조성을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 운석과 지구 암석의 대조에서 나타난 차이는 운석 조각의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 운석과 지구 암석의 대조가 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

철과 니켈의 조성에서 운석과 지구 암석의 대조로 이어진 순서를 확인한 뒤, 머치슨 운석 표본이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 운석과 지구 암석의 대조와 어긋난 철과 니켈의 조성을 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 분광선의 파장의 결과를 대조군과 비교했다.

운석과 지구 암석의 대조와 어긋난 철과 니켈의 조성을 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 철과 니켈의 조성이 예상과 다르면 운석 조각 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

철과 니켈의 조성을 먼저 기록하고 운석과 지구 암석의 대조를 다시 확인한 다음, 머치슨 운석 표본을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 운석과 지구 암석의 대조가 달라지면 운석 조각에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

분광선의 파장과 철과 니켈의 조성을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 철과 니켈의 조성은 운석과 지구 암석의 대조의 차이를 기준으로 삼아, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

맺음말

별면지 실험실의 하루의 마지막에는 각 장에서 확인한 구체적 근거와 적용 경계를 다시 모았습니다.

첫 장의 별면지에서 마지막 장의 운석 조각까지, 같은 결론을 반복하지 않고 질문이 어떻게 달라졌는지 순서대로 확인할 수 있습니다.

책을 덮기 전 가장 유용했던 페이지와 맞지 않았던 페이지를 한 장씩 골라 보십시오. 두 페이지의 차이가 다음 독서 목적을 더 정확하게 만듭니다.

관련 고전 읽을거리

아래 자료는 본문 문장의 출처나 번역 원문이 아니라, 같은 분야의 고전적 질문을 더 읽기 위한 관련 자료입니다.

Project Gutenberg 전자책 52709번 · Popular Scientific Recreations in Natural Philosophy, Astronomy, Geology, Chemistry, etc., etc., etc. · Tissandier, Gaston

권리 표기: Public domain in the USA. · 목록 주소: <https://www.gutenberg.org/ebooks/52709>

원문 문장, 번역문, 스캔과 삽화는 이 PDF 본문에 실지 않았습니다. 오래된 자료는 현대 지식과 다를 수 있으므로 사실 확인 자료로 직접 사용하지 않습니다.