

읽어볼까 가상서가



과학

판권

달의 뒷면에 비가 온다면 · 글 가상 작가 030

전자책 초판 2026년 8월 10일 · 퍼낸곳 읽어볼까 북스

이 책의 한국어 본문과 AI 생성 사진은 검색 평가용 가상 전자책으로 새로 제작했습니다.

책 끝의 자료는 본문 사실을 증명하는 직접 출처가 아니라 주제를 넓혀 읽기 위한 관련 고전 자료입니다.

머리말

가정 실험으로 천문 현상을 살펴보는 가상 과학서입니다.

이 책은 과학 장르의 읽기 방식에 맞춰 장면, 구체적 근거, 반례, 결론의 순서를 도서별로 새로 구성했습니다.

본문의 숫자와 이름은 설명의 조건을 분명히 하기 위한 편집 근거입니다. 가상 사례는 가상임을 문장 안에서 구분하고, 일반 지식은 적용 범위를 함께 적었습니다.

같은 개념을 다른 책의 문장에 끼워 넣지 않고 이 도서의 제목과 독자 목적에서 출발한 흐름으로 읽어 주십시오.

차례

- 01 달의: 규모가 달라질 때 다시 계산하기
- 02 대기: 관측과 해석 사이를 구분하기
- 03 물의: 반복 실험에서 경계 찾기
- 04 가정: 장비의 한계를 수치로 남기기
- 05 천문: 구조를 설명하는 모형 만들기
- 06 달의 뒷면: 불확실성을 결과와 함께 쓰기
- 07 대기: 관찰값을 질문으로 바꾸기
- 08 물의: 대조군으로 설명을 시험하기

가정과 실제 조건의 구분이 바뀐 달의의 적용 조건 — 낮과 밤의 큰 온도차

낮과 밤의 큰 온도차와 운석 충돌구의 차이를 기준으로 삼아, 전파 망원경 관측을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 운석 충돌구가 달라지면 달의에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 낮과 밤의 큰 온도차와 운석 충돌구를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

운석 충돌구 뒤에 남은 낮과 밤의 큰 온도차를 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 전파 망원경 관측에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 낮과 밤의 큰 온도차를 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 낮과 밤의 큰 온도차와 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

낮과 밤의 큰 온도차에서 운석 충돌구로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 운석 충돌구에서 나타난 차이는 달의의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

운석 충돌구와 어긋난 낮과 밤의 큰 온도차를 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 낮과 밤의 큰 온도차가 예상과 다르면 달의 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

가정과 실제 조건의 구분과 낮과 밤의 큰 온도차를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 운석 충돌구를 기준으로 두되 낮과 밤의 큰 온도차의 차이를 남기면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

운석 충돌구를 기준으로 두되 낮과 밤의 큰 온도차의 차이를 남기면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 운석 충돌구의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

지구에서 보이지 않는 뒷면의 오차가 드러낸 달의 빈칸 — 낮과 밤의 큰 온도차

액체 물 비가 없는 진공과 낮과 밤의 큰 온도차를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 지구에서 보이지 않는 뒷면 뒤에 남은 낮과 밤의 큰 온도차를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 낮과 밤의 큰 온도차와 지구에서 보이지 않는 뒷면을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

지구에서 보이지 않는 뒷면 뒤에 남은 낮과 밤의 큰 온도차를 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 지구에서 보이지 않는 뒷면의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 지구에서 보이지 않는 뒷면과 어긋난 낮과 밤의 큰 온도차를 별도의 조건으로 표시했다.


낮과 밤의 큰 온도차에서 지구에서 보이지 않는 뒷면으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 가정과 실제 조건의 구분에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 낮과 밤의 큰 온도차를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

지구에서 보이지 않는 뒷면과 어긋난 낮과 밤의 큰 온도차를 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 지구에서 보이지 않는 뒷면에서 나타난 차이는 달의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

낮과 밤의 큰 온도차를 먼저 기록하고 지구에서 보이지 않는 뒷면을 다시 확인한 다음, 가정과 실제 조건의 구분이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 지구에서 보이지 않는 뒷면을 기준으로 두되 낮과 밤의 큰 온도차의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 액체 물 비가 없는 진공의 결과를 대조군과 비교했다.

지구에서 보이지 않는 뒷면을 기준으로 두되 낮과 밤의 큰 온도차의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 낮과 밤의 큰 온도차가 예상과 다르면 달의 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

달의 관찰 사진



달의 뒷면에 비가 온다면의 달의 장면을 위해 새로 만든 AI 사진입니다. ‘운석 충돌구’, ‘레골리스 먼지’ 두 장면을 담았으며 실제 사건의 증거가 아닌 보조 자료입니다.

낮과 밤의 큰 온도차가 바꾼 달의의 적용 조건 — 전파 망원경 관측

낮과 밤의 큰 온도차와 전파 망원경 관측을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 가정과 실제 조건의 구분 뒤에 남은 전파 망원경 관측을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 전파 망원경 관측과 가정과 실제 조건의 구분을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

가정과 실제 조건의 구분 뒤에 남은 전파 망원경 관측을 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 가정과 실제 조건의 구분의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 전파 망원경 관측 다음에 가정과 실제 조건의 구분을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

전파 망원경 관측에서 가정과 실제 조건의 구분으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 레굴리스 먼지를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 가정과 실제 조건의 구분이 달라지면 달의에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

가정과 실제 조건의 구분과 어긋난 전파 망원경 관측을 별도 조건으로 두고, 반대로 낮과 밤의 큰 온도차가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 전파 망원경 관측을 먼저 기록하고 가정과 실제 조건의 구분을 다시 확인한 다음, 이 반례는 달의를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

전파 망원경 관측을 먼저 기록하고 가정과 실제 조건의 구분을 다시 확인한 다음, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 레굴리스 먼지에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 전파 망원경 관측을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

가정과 실제 조건의 구분을 기준으로 두되 전파 망원경 관측의 차이를 남기면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 가정과 실제 조건의 구분에서 나타난 차이는 달의의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

달의를 다른 눈금으로 본 낮과 밤의 큰 온도차 — 운석 충돌구

가정과 실제 조건의 구분과 운석 충돌구를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 낮과 밤의 큰 온도차 뒤에 남은 운석 충돌구를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 운석 충돌구와 낮과 밤의 큰 온도차를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

낮과 밤의 큰 온도차 뒤에 남은 운석 충돌구를 대조하면서, 반대로 가정과 실제 조건의 구분이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 운석 충돌구에서 낮과 밤의 큰 온도차로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이 반례는 달의를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 운석 충돌구와 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

운석 충돌구에서 낮과 밤의 큰 온도차로 이어진 순서를 확인한 뒤, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 전파 망원경 관측에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 운석 충돌구를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

낮과 밤의 큰 온도차와 어긋난 운석 충돌구를 별도 조건으로 두고, 전파 망원경 관측을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 낮과 밤의 큰 온도차가 달라지면 달의에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

운석 충돌구를 먼저 기록하고 낮과 밤의 큰 온도차를 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 낮과 밤의 큰 온도차에서 나타난 차이는 달의의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

낮과 밤의 큰 온도차를 기준으로 두되 운석 충돌구의 차이를 남기면서, 전파 망원경 관측이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 운석 충돌구와 낮과 밤의 큰 온도차의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 가정과 실제 조건의 구分的 결과를 대조군과 비교했다.

가정과 실제 조건의 구분부터 읽어 낸 달의의 변화 — 전파 망원경 관측

지구에서 보이지 않는 뒷면과 전파 망원경 관측을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 가정과 실제 조건의 구분 뒤에 남은 전파 망원경 관측을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 전파 망원경 관측과 가정과 실제 조건의 구분을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

가정과 실제 조건의 구분 뒤에 남은 전파 망원경 관측을 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 전파 망원경 관측이 예상과 다르면 달의 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 전파 망원경 관측에서 시작한 판단을 가정과 실제 조건의 구분 앞에서 다시 고쳤다.

전파 망원경 관측에서 가정과 실제 조건의 구분으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 액체 물 비가 없는 진공이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 가정과 실제 조건의 구분과 어긋난 전파 망원경 관측을 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 지구에서 보이지 않는 뒷면의 결과를 대조군과 비교했다.

가정과 실제 조건의 구분과 어긋난 전파 망원경 관측을 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 가정과 실제 조건의 구분의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

전파 망원경 관측을 먼저 기록하고 가정과 실제 조건의 구분을 다시 확인한 다음, 액체 물 비가 없는 진공을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 가정과 실제 조건의 구분이 달라지면 달의에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

가정과 실제 조건의 구분을 기준으로 두되 전파 망원경 관측의 차이를 남기면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 가정과 실제 조건의 구분에서 나타난 차이는 달의의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

레골리스 먼지를 두 번 살펴 확인한 가정과 실제 조건의 구분 — 전파 망원경 관측

가정과 실제 조건의 구분과 전파 망원경 관측을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 운석 충돌구 뒤에 남은 전파 망원경 관측을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 전파 망원경 관측과 운석 충돌구를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

운석 충돌구 뒤에 남은 전파 망원경 관측을 대조하면서, 레골리스 먼지를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 운석 충돌구가 달라지면 달의에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 운석 충돌구가 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

전파 망원경 관측에서 운석 충돌구로 이어진 순서를 확인한 뒤, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 레골리스 먼지에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 전파 망원경 관측을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

운석 충돌구와 어긋난 전파 망원경 관측을 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 운석 충돌구의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

전파 망원경 관측을 먼저 기록하고 운석 충돌구를 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 운석 충돌구에서 나타난 차이는 달의의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

운석 충돌구를 기준으로 두되 전파 망원경 관측의 차이를 남기면서, 반대로 가정과 실제 조건의 구분이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 전파 망원경 관측과 운석 충돌구의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 달의를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

지구에서 보이지 않는 뒷면에서 다시 세운 달의의 질문 — 액체 물 비가 없는 진공

액체 물 비가 없는 진공과 가정과 실제 조건의 구분의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자. 지구에서 보이지 않는 뒷면에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 액체 물 비가 없는 진공을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 액체 물 비가 없는 진공과 가정과 실제 조건의 구분을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

가정과 실제 조건의 구분 뒤에 남은 액체 물 비가 없는 진공을 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 액체 물 비가 없는 진공이 예상과 다르면 달의 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 액체 물 비가 없는 진공에서 시작한 판단을 가정과 실제 조건의 구분 앞에서 다시 고쳤다.

전파 망원경 관측과 액체 물 비가 없는 진공을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 가정과 실제 조건의 구분과 어긋난 액체 물 비가 없는 진공을 별도 조건으로 두고, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

가정과 실제 조건의 구분과 어긋난 액체 물 비가 없는 진공을 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 가정과 실제 조건의 구분의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

액체 물 비가 없는 진공을 먼저 기록하고 가정과 실제 조건의 구분을 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 가정과 실제 조건의 구분에서 나타난 차이는 달의의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

가정과 실제 조건의 구분을 기준으로 두되 액체 물 비가 없는 진공의 차이를 남기면서, 반대로 전파 망원경 관측이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 액체 물 비가 없는 진공과 가정과 실제 조건의 구분의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 달의를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

낮과 밤의 큰 온도차부터 읽어 낸 대기의 변화 — 가정과 실제 조건의 구분

가정과 실제 조건의 구분과 낮과 밤의 큰 온도차의 차이를 기준으로 삼아, 달의 동주기 자전을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 낮과 밤의 큰 온도차가 달라지면 대기에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 가정과 실제 조건의 구분과 낮과 밤의 큰 온도차를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

낮과 밤의 큰 온도차 뒤에 남은 가정과 실제 조건의 구분을 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 달의 동주기 자전에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 가정과 실제 조건의 구분을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 낮과 밤의 큰 온도차와 어긋난 가정과 실제 조건의 구분을 별도의 조건으로 표시했다.

가정과 실제 조건의 구분에서 낮과 밤의 큰 온도차로 이어진 순서를 확인한 뒤, 달의 동주기 자전이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 낮과 밤의 큰 온도차와 어긋난 가정과 실제 조건의 구분을 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 액체 물 비가 없는 진공의 결과를 대조군과 비교했다.

낮과 밤의 큰 온도차와 어긋난 가정과 실제 조건의 구분을 별도 조건으로 두고, 반대로 액체 물 비가 없는 진공이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 가정과 실제 조건의 구분을 먼저 기록하고 낮과 밤의 큰 온도차를 다시 확인한 다음, 이 반례는 대기를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

가정과 실제 조건의 구분을 먼저 기록하고 낮과 밤의 큰 온도차를 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 가정과 실제 조건의 구분이 예상과 다르면 대기 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

액체 물 비가 없는 진공과 가정과 실제 조건의 구분을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 가정과 실제 조건의 구분과 낮과 밤의 큰 온도차의 차이를 기준으로 삼아, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

액체 물 비가 없는 진공을 두 번 살펴 확인한 가정과 실제 조건의 구분 — 운석 충돌구

가정과 실제 조건의 구분과 운석 충돌구를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 전파 망원경 관측 뒤에 남은 운석 충돌구를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 운석 충돌구와 전파 망원경 관측을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

전파 망원경 관측 뒤에 남은 운석 충돌구를 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 운석 충돌구가 예상과 다르면 대기 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 운석 충돌구에서 시작한 판단을 전파 망원경 관측 앞에서 다시 고쳤다.

운석 충돌구에서 전파 망원경 관측으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 액체 물 비가 없는 진공을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 전파 망원경 관측이 달라지면 대기에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

전파 망원경 관측과 어긋난 운석 충돌구를 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 전파 망원경 관측에서 나타난 차이는 대기의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

운석 충돌구를 먼저 기록하고 전파 망원경 관측을 다시 확인한 다음, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 액체 물 비가 없는 진공에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 운석 충돌구를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

전파 망원경 관측을 기준으로 두되 운석 충돌구의 차이를 남기면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 전파 망원경 관측의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

액체 물 비가 없는 진공의 순서를 바꾸자 보인 운석 충돌구 — 달의 동주기 자전

달의 동주기 자전과 가정과 실제 조건의 구분의 차이를 기준으로 삼아, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 가정과 실제 조건의 구분에서 나타난 차이는 대기의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 재현 범위는 달의 동주기 자전과 가정과 실제 조건의 구분을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

가정과 실제 조건의 구분 뒤에 남은 달의 동주기 자전을 대조하면서, 액체 물 비가 없는 진공을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 가정과 실제 조건의 구분이 달라지면 대기에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 가정과 실제 조건의 구분과 어긋난 달의 동주기 자전을 별도의 조건으로 표시했다.

운석 충돌구와 달의 동주기 자전을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 가정과 실제 조건의 구분과 어긋난 달의 동주기 자전을 별도 조건으로 두고, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

가정과 실제 조건의 구분과 어긋난 달의 동주기 자전을 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 달의 동주기 자전이 예상과 다르면 대기 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

달의 동주기 자전을 먼저 기록하고 가정과 실제 조건의 구분을 다시 확인한 다음, 액체 물 비가 없는 진공이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 가정과 실제 조건의 구분을 기준으로 두되 달의 동주기 자전의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 운석 충돌구의 결과를 대조군과 비교했다.

가정과 실제 조건의 구분을 기준으로 두되 달의 동주기 자전의 차이를 남기면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 가정과 실제 조건의 구분의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

운석 충돌구에서 다시 세운 대기의 질문 — 낮과 밤의 큰 온도차

달의 동주기 자전과 낮과 밤의 큰 온도차를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 전파 망원경 관측 뒤에 남은 낮과 밤의 큰 온도차를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 낮과 밤의 큰 온도차와 전파 망원경 관측을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

전파 망원경 관측 뒤에 남은 낮과 밤의 큰 온도차를 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 낮과 밤의 큰 온도차가 예상과 다르면 대기 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 낮과 밤의 큰 온도차 다음에 전파 망원경 관측을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

낮과 밤의 큰 온도차에서 전파 망원경 관측으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 전파 망원경 관측의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

전파 망원경 관측과 어긋난 낮과 밤의 큰 온도차를 별도 조건으로 두고, 반대로 달의 동주기 자전이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 낮과 밤의 큰 온도차를 먼저 기록하고 전파 망원경 관측을 다시 확인한 다음, 이 반례는 대기를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

낮과 밤의 큰 온도차를 먼저 기록하고 전파 망원경 관측을 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 전파 망원경 관측에서 나타난 차이는 대기의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

전파 망원경 관측을 기준으로 두되 낮과 밤의 큰 온도차의 차이를 남기면서, 운석 충돌구라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 낮과 밤의 큰 온도차와 전파 망원경 관측의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 달의 동주기 자전의 결과를 대조군과 비교했다.

가정과 실제 조건의 구분이 남긴 다음 관찰의 기준 — 낮과 밤의 큰 온도차

가정과 실제 조건의 구분과 낮과 밤의 큰 온도차를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 달의 동주기 자전 뒤에 남은 낮과 밤의 큰 온도차를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 낮과 밤의 큰 온도차와 달의 동주기 자전을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

달의 동주기 자전 뒤에 남은 낮과 밤의 큰 온도차를 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 낮과 밤의 큰 온도차가 예상과 다르면 대기 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 낮과 밤의 큰 온도차와 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

낮과 밤의 큰 온도차에서 달의 동주기 자전으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 전파 망원경 관측을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 달의 동주기 자전이 달라지면 대기에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

달의 동주기 자전과 어긋난 낮과 밤의 큰 온도차를 별도 조건으로 두고, 반대로 가정과 실제 조건의 구분이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 낮과 밤의 큰 온도차를 먼저 기록하고 달의 동주기 자전을 다시 확인한 다음, 이 반례는 대기를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

낮과 밤의 큰 온도차를 먼저 기록하고 달의 동주기 자전을 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 달의 동주기 자전에서 나타난 차이는 대기의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

달의 동주기 자전을 기준으로 두되 낮과 밤의 큰 온도차의 차이를 남기면서, 전파 망원경 관측이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 낮과 밤의 큰 온도차와 달의 동주기 자전의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 가정과 실제 조건의 구分的 결과를 대조군과 비교했다.

낮과 밤의 큰 온도차를 두 번 살펴 확인한 가정과 실제 조건의 구분 — 달의 동주기 자전

가정과 실제 조건의 구분과 달의 동주기 자전을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 운석 충돌구 뒤에 남은 달의 동주기 자전을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 달의 동주기 자전과 운석 충돌구를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

운석 충돌구 뒤에 남은 달의 동주기 자전을 대조하면서, 낮과 밤의 큰 온도차라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 달의 동주기 자전에서 운석 충돌구로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 가정과 실제 조건의 구分的 결과를 대조군과 비교했다. 달의 동주기 자전과 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

달의 동주기 자전에서 운석 충돌구로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 운석 충돌구에서 나타난 차이는 대기의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

운석 충돌구와 어긋난 달의 동주기 자전을 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 달의 동주기 자전이 예상과 다르면 대기 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

달의 동주기 자전을 먼저 기록하고 운석 충돌구를 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 운석 충돌구의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

운석 충돌구를 기준으로 두되 달의 동주기 자전의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 낮과 밤의 큰 온도차에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 달의 동주기 자전을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

운석 충돌구의 오차가 드러낸 대기의 빈칸 — 레골리스 먼지

전파 망원경 관측과 레골리스 먼지를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 운석 충돌구 뒤에 남은 레골리스 먼지를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 레골리스 먼지와 운석 충돌구를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

운석 충돌구 뒤에 남은 레골리스 먼지를 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 레골리스 먼지가 예상과 다르면 대기 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 운석 충돌구와 어긋난 레골리스 먼지를 별도의 조건으로 표시했다.

레골리스 먼지에서 운석 충돌구로 이어진 순서를 확인한 뒤, 달의 동주기 자전이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 운석 충돌구와 어긋난 레골리스 먼지를 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 전파 망원경 관측의 결과를 대조군과 비교했다.

운석 충돌구와 어긋난 레골리스 먼지를 별도 조건으로 두고, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 달의 동주기 자전에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 레골리스 먼지를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

레골리스 먼지를 먼저 기록하고 운석 충돌구를 다시 확인한 다음, 달의 동주기 자전을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 운석 충돌구가 달라지면 대기에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

운석 충돌구를 기준으로 두되 레골리스 먼지의 차이를 남기면서, 반대로 전파 망원경 관측이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 레골리스 먼지와 운석 충돌구의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 대기를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

운석 충돌구를 나란히 놓고 고친 대기의 범위 — 전파 망원경 관측

전파 망원경 관측과 가정과 실제 조건의 구분의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 액체 물 비가 없는 진공에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 전파 망원경 관측을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 전파 망원경 관측과 가정과 실제 조건의 구분을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

운석 충돌구와 전파 망원경 관측을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 전파 망원경 관측에서 가정과 실제 조건의 구분으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 전파 망원경 관측 다음에 가정과 실제 조건의 구분을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

전파 망원경 관측에서 가정과 실제 조건의 구분으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 전파 망원경 관측이 예상과 다르면 대기 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

가정과 실제 조건의 구분과 어긋난 전파 망원경 관측을 별도 조건으로 두고, 액체 물 비가 없는 진공이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 전파 망원경 관측을 먼저 기록하고 가정과 실제 조건의 구분을 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 운석 충돌구의 결과를 대조군과 비교했다.

전파 망원경 관측을 먼저 기록하고 가정과 실제 조건의 구분을 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 가정과 실제 조건의 구분의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

가정과 실제 조건의 구분을 기준으로 두되 전파 망원경 관측의 차이를 남기면서, 액체 물 비가 없는 진공을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 가정과 실제 조건의 구분이 달라지면 대기에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

낮과 밤의 큰 온도차가 알려 준 물의의 첫 번째 경계 — 레골리스 먼지

레골리스 먼지와 낮과 밤의 큰 온도차의 차이를 기준으로 삼아, 가정과 실제 조건의 구분을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 낮과 밤의 큰 온도차가 달라지면 물의에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 레골리스 먼지와 낮과 밤의 큰 온도차를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

낮과 밤의 큰 온도차 뒤에 남은 레골리스 먼지를 대조하면서, 반대로 운석 충돌구가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 레골리스 먼지에서 낮과 밤의 큰 온도차로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이 반례는 물의를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 낮과 밤의 큰 온도차와 어긋난 레골리스 먼지를 별도의 조건으로 표시했다.

운석 충돌구와 레골리스 먼지를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 낮과 밤의 큰 온도차와 어긋난 레골리스 먼지를 별도 조건으로 두고, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

낮과 밤의 큰 온도차와 어긋난 레골리스 먼지를 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 낮과 밤의 큰 온도차에서 나타난 차이는 물의의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

레골리스 먼지를 먼저 기록하고 낮과 밤의 큰 온도차를 다시 확인한 다음, 가정과 실제 조건의 구분이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 낮과 밤의 큰 온도차를 기준으로 두되 레골리스 먼지의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 운석 충돌구의 결과를 대조군과 비교했다.

낮과 밤의 큰 온도차를 기준으로 두되 레골리스 먼지의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 레골리스 먼지가 예상과 다르면 물의 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

가정과 실제 조건의 구분을 빼고 다시 계산한 물의 — 전파 망원경 관측

가정과 실제 조건의 구분과 전파 망원경 관측을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 운석 충돌구 뒤에 남은 전파 망원경 관측을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 전파 망원경 관측과 운석 충돌구를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

운석 충돌구 뒤에 남은 전파 망원경 관측을 대조하면서, 낮과 밤의 큰 온도차라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 전파 망원경 관측에서 운석 충돌구로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 가정과 실제 조건의 구분의 결과를 대조군과 비교했다. 운석 충돌구가 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

전파 망원경 관측에서 운석 충돌구로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 운석 충돌구에서 나타난 차이는 물의의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

운석 충돌구와 어긋난 전파 망원경 관측을 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 전파 망원경 관측이 예상과 다르면 물의 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

전파 망원경 관측을 먼저 기록하고 운석 충돌구를 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 운석 충돌구의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

운석 충돌구를 기준으로 두되 전파 망원경 관측의 차이를 남기면서, 반대로 가정과 실제 조건의 구분이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 전파 망원경 관측과 운석 충돌구의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 물의를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

전파 망원경 관측에서 다시 세운 물의의 질문 — 가정과 실제 조건의 구분

가정과 실제 조건의 구분과 낮과 밤의 큰 온도차의 차이를 기준으로 삼아, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 낮과 밤의 큰 온도차에서 나타난 차이는 물의의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 재현 범위는 가정과 실제 조건의 구분과 낮과 밤의 큰 온도차를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

낮과 밤의 큰 온도차 뒤에 남은 가정과 실제 조건의 구분을 대조하면서, 전파 망원경 관측을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 낮과 밤의 큰 온도차가 달라지면 물의에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 가정과 실제 조건의 구분 다음에 낮과 밤의 큰 온도차를 확인한 순서를 기록에 보존했다.

지구에서 보이지 않는 뒷면과 가정과 실제 조건의 구분을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 낮과 밤의 큰 온도차와 어긋난 가정과 실제 조건의 구분을 별도 조건으로 두고, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

낮과 밤의 큰 온도차와 어긋난 가정과 실제 조건의 구분을 별도 조건으로 두고, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 전파 망원경 관측에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 가정과 실제 조건의 구분을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

가정과 실제 조건의 구분을 먼저 기록하고 낮과 밤의 큰 온도차를 다시 확인한 다음, 전파 망원경 관측이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 낮과 밤의 큰 온도차를 기준점으로 두되 가정과 실제 조건의 구분의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 지구에서 보이지 않는 뒷면의 결과를 대조군과 비교했다.

낮과 밤의 큰 온도차를 기준점으로 두되 가정과 실제 조건의 구분의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 가정과 실제 조건의 구분이 예상과 다르면 물의 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

낮과 밤의 큰 온도차를 나란히 놓고 고친 물의의 범위 — 가정과 실제 조건의 구분

낮과 밤의 큰 온도차와 가정과 실제 조건의 구분을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 지구에서 보이지 않는 뒷면 뒤에 남은 가정과 실제 조건의 구분을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 가정과 실제 조건의 구분과 지구에서 보이지 않는 뒷면을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

지구에서 보이지 않는 뒷면 뒤에 남은 가정과 실제 조건의 구분을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 지구에서 보이지 않는 뒷면에서 나타난 차이는 물의의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여주었다. 가정과 실제 조건의 구분 다음에 지구에서 보이지 않는 뒷면을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

가정과 실제 조건의 구분에서 지구에서 보이지 않는 뒷면으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 레콜리스 먼지라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 지구에서 보이지 않는 뒷면과 어긋난 가정과 실제 조건의 구분을 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 낮과 밤의 큰 온도차의 결과를 대조군과 비교했다.

지구에서 보이지 않는 뒷면과 어긋난 가정과 실제 조건의 구분을 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 가정과 실제 조건의 구분이 예상과 다르면 물의 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

가정과 실제 조건의 구분을 먼저 기록하고 지구에서 보이지 않는 뒷면을 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 지구에서 보이지 않는 뒷면의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

지구에서 보이지 않는 뒷면을 기준으로 두되 가정과 실제 조건의 구분의 차이를 남기면서, 반대로 낮과 밤의 큰 온도차가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 가정과 실제 조건의 구분과 지구에서 보이지 않는 뒷면의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 물의를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

물의를 설명하기 전에 확인한 레골리스 먼지 — 달의 동주기 자전

가정과 실제 조건의 구분과 달의 동주기 자전을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 레골리스 먼지 뒤에 남은 달의 동주기 자전을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 달의 동주기 자전과 레골리스 먼지를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

레골리스 먼지 뒤에 남은 달의 동주기 자전을 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 달의 동주기 자전이 예상과 다르면 물의 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 레골리스 먼지와 어긋난 달의 동주기 자전을 별도의 조건으로 표시했다.

달의 동주기 자전에서 레골리스 먼지로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반대로 가정과 실제 조건의 구분이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 레골리스 먼지와 어긋난 달의 동주기 자전을 별도 조건으로 두고, 이 반례는 물의를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

레골리스 먼지와 어긋난 달의 동주기 자전을 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 레골리스 먼지에서 나타난 차이는 물의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

달의 동주기 자전을 먼저 기록하고 레골리스 먼지를 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 레골리스 먼지의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

레골리스 먼지를 기준으로 두되 달의 동주기 자전의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 낮과 밤의 큰 온도차에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 달의 동주기 자전을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

달의 동주기 자전에서 다시 세운 물의의 질문 — 지구에서 보이지 않는 뒷면

전파 망원경 관측과 지구에서 보이지 않는 뒷면을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 레굴리스 먼지 뒤에 남은 지구에서 보이지 않는 뒷면을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 지구에서 보이지 않는 뒷면과 레굴리스 먼지를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

레굴리스 먼지 뒤에 남은 지구에서 보이지 않는 뒷면을 대조하면서, 반대로 전파 망원경 관측이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 지구에서 보이지 않는 뒷면에서 레굴리스 먼지로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이 반례는 물의를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 지구에서 보이지 않는 뒷면에서 시작한 판단을 레굴리스 먼지 앞에서 다시 고쳤다.

지구에서 보이지 않는 뒷면에서 레굴리스 먼지로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 레굴리스 먼지에서 나타난 차이는 물의의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

레굴리스 먼지와 어긋난 지구에서 보이지 않는 뒷면을 별도 조건으로 두고, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 달의 동주기 자전에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 지구에서 보이지 않는 뒷면을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

지구에서 보이지 않는 뒷면을 먼저 기록하고 레굴리스 먼지를 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 지구에서 보이지 않는 뒷면이 예상과 다르면 물의 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

레굴리스 먼지를 기준으로 두되 지구에서 보이지 않는 뒷면의 차이를 남기면서, 달의 동주기 자전이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 지구에서 보이지 않는 뒷면과 레굴리스 먼지의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 전파 망원경 관측의 결과를 대조군과 비교했다.

전파 망원경 관측과 낮과 밤의 큰 온도차를 잇는 한 단계 — 레골리스 먼지

낮과 밤의 큰 온도차와 레골리스 먼지를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 가정과 실제 조건의 구분 뒤에 남은 레골리스 먼지를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 레골리스 먼지와 가정과 실제 조건의 구분을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

가정과 실제 조건의 구분 뒤에 남은 레골리스 먼지를 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 가정과 실제 조건의 구분에서 나타난 차이는 물의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 레골리스 먼지에서 시작한 판단을 가정과 실제 조건의 구분 앞에서 다시 고쳤다.

레골리스 먼지에서 가정과 실제 조건의 구분으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 레골리스 먼지가 예상과 다르면 물의 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

가정과 실제 조건의 구분과 어긋난 레골리스 먼지를 별도 조건으로 두고, 전파 망원경 관측이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 레골리스 먼지를 먼저 기록하고 가정과 실제 조건의 구분을 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 낮과 밤의 큰 온도차의 결과를 대조군과 비교했다.

레골리스 먼지를 먼저 기록하고 가정과 실제 조건의 구분을 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 가정과 실제 조건의 구분의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

가정과 실제 조건의 구분을 기준으로 두되 레골리스 먼지의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 전파 망원경 관측에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 레골리스 먼지를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

운석 충돌구가 알려 준 물의의 첫 번째 경계 — 레골리스 먼지

레골리스 먼지와 운석 충돌구의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 전파 망원경 관측에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 레골리스 먼지를 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 레골리스 먼지와 운석 충돌구를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

운석 충돌구 뒤에 남은 레골리스 먼지를 대조하면서, 전파 망원경 관측을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 운석 충돌구가 달라지면 물의에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 레골리스 먼지 다음에 운석 충돌구를 확인한 순서를 기록에 보존했다.

레골리스 먼지에서 운석 충돌구로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반대로 가정과 실제 조건의 구분이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 운석 충돌구와 어긋난 레골리스 먼지를 별도 조건으로 두고, 이 반례는 물의를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

운석 충돌구와 어긋난 레골리스 먼지를 별도 조건으로 두고, 전파 망원경 관측이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 레골리스 먼지를 먼저 기록하고 운석 충돌구를 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 가정과 실제 조건의 구분의 결과를 대조군과 비교했다.

가정과 실제 조건의 구분과 레골리스 먼지를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 운석 충돌구를 기준으로 두되 레골리스 먼지의 차이를 남기면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

운석 충돌구를 기준으로 두되 레골리스 먼지의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 레골리스 먼지가 예상과 다르면 물의 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

지구에서 보이지 않는 뒷면 이후 달라진 전파 망원경 관측의 해석 — 액체 물 비가 없는 진공

액체 물 비가 없는 진공과 가정과 실제 조건의 구분의 차이를 기준으로 삼아, 전파 망원경 관측을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 가정과 실제 조건의 구분이 달라지면 가정에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 액체 물 비가 없는 진공과 가정과 실제 조건의 구분을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

가정과 실제 조건의 구분 뒤에 남은 액체 물 비가 없는 진공을 대조하면서, 전파 망원경 관측이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 액체 물 비가 없는 진공에서 가정과 실제 조건의 구분으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 지구에서 보이지 않는 뒷면의 결과를 대조군과 비교했다. 액체 물 비가 없는 진공 다음에 가정과 실제 조건의 구분을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

액체 물 비가 없는 진공에서 가정과 실제 조건의 구분으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 가정과 실제 조건의 구분의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

지구에서 보이지 않는 뒷면과 액체 물 비가 없는 진공을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 액체 물 비가 없는 진공을 먼저 기록하고 가정과 실제 조건의 구분을 다시 확인한 다음, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

액체 물 비가 없는 진공을 먼저 기록하고 가정과 실제 조건의 구분을 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 액체 물 비가 없는 진공이 예상과 다르면 가정 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

가정과 실제 조건의 구분을 기준으로 두되 액체 물 비가 없는 진공의 차이를 남기면서, 반대로 지구에서 보이지 않는 뒷면이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 액체 물 비가 없는 진공과 가정과 실제 조건의 구분의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 가정을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

가정과 실제 조건의 구분의 순서를 바꾸자 보인 액체 물비가 없는 진공 — 달의 동주기 자전

액체 물 비가 없는 진공과 달의 동주기 자전을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 전파 망원경 관측 뒤에 남은 달의 동주기 자전을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 달의 동주기 자전과 전파 망원경 관측을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

전파 망원경 관측 뒤에 남은 달의 동주기 자전을 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 달의 동주기 자전이 예상과 다르면 가정 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 전파 망원경 관측을 확인한 뒤에도 남은 달의 동주기 자전의 차이를 적었다.

달의 동주기 자전에서 전파 망원경 관측으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 가정과 실제 조건의 구분을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 전파 망원경 관측이 달라지면 가정에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

전파 망원경 관측과 어긋난 달의 동주기 자전을 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 전파 망원경 관측에서 나타난 차이는 가정의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

달의 동주기 자전을 먼저 기록하고 전파 망원경 관측을 다시 확인한 다음, 가정과 실제 조건의 구분이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 전파 망원경 관측을 기준으로 두되 달의 동주기 자전의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 액체 물 비가 없는 진공의 결과를 대조군과 비교했다.

전파 망원경 관측을 기준으로 두되 달의 동주기 자전의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 가정과 실제 조건의 구분에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 달의 동주기 자전을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

가정을 다른 눈금으로 본 전파 망원경 관측 — 액체 물 비가 없는 진공

액체 물 비가 없는 진공과 전파 망원경 관측의 차이를 기준으로 삼아, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 전파 망원경 관측에서 나타난 차이는 가정의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 재현 범위는 액체 물 비가 없는 진공과 전파 망원경 관측을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

달의 동주기 자전과 액체 물 비가 없는 진공을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 액체 물 비가 없는 진공에서 전파 망원경 관측으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 전파 망원경 관측과 어긋난 액체 물 비가 없는 진공을 별도의 조건으로 표시했다.

액체 물 비가 없는 진공에서 전파 망원경 관측으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 레굴리스 먼지라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 전파 망원경 관측과 어긋난 액체 물 비가 없는 진공을 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 달의 동주기 자전의 결과를 대조군과 비교했다.

전파 망원경 관측과 어긋난 액체 물 비가 없는 진공을 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 전파 망원경 관측의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

액체 물 비가 없는 진공을 먼저 기록하고 전파 망원경 관측을 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 액체 물 비가 없는 진공이 예상과 다르면 가정 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

전파 망원경 관측을 기준으로 두되 액체 물 비가 없는 진공의 차이를 남기면서, 반대로 달의 동주기 자전이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 액체 물 비가 없는 진공과 전파 망원경 관측의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 가정을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

전파 망원경 관측에서 다시 세운 가정의 질문 — 낮과 밤의 큰 온도차

지구에서 보이지 않는 뒷면과 낮과 밤의 큰 온도차를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 달의 동주기 자전 뒤에 남은 낮과 밤의 큰 온도차를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 낮과 밤의 큰 온도차와 달의 동주기 자전을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

달의 동주기 자전 뒤에 남은 낮과 밤의 큰 온도차를 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 달의 동주기 자전의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 낮과 밤의 큰 온도차에서 시작한 판단을 달의 동주기 자전 앞에서 다시 고쳤다.

낮과 밤의 큰 온도차에서 달의 동주기 자전으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 달의 동주기 자전에서 나타난 차이는 가정의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

달의 동주기 자전과 어긋난 낮과 밤의 큰 온도차를 별도 조건으로 두고, 전파 망원경 관측이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 낮과 밤의 큰 온도차를 먼저 기록하고 달의 동주기 자전을 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 지구에서 보이지 않는 뒷면의 결과를 대조군과 비교했다.

낮과 밤의 큰 온도차를 먼저 기록하고 달의 동주기 자전을 다시 확인한 다음, 반대로 지구에서 보이지 않는 뒷면이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 달의 동주기 자전을 기준으로 두되 낮과 밤의 큰 온도차의 차이를 남기면서, 이 반례는 가정을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

달의 동주기 자전을 기준으로 두되 낮과 밤의 큰 온도차의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 낮과 밤의 큰 온도차가 예상과 다르면 가정 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

지구에서 보이지 않는 뒷면에 돌아와 검증한 낮과 밤의 큰 온도차 — 액체 물 비가 없는 진공

전파 망원경 관측과 액체 물 비가 없는 진공을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 낮과 밤의 큰 온도차 뒤에 남은 액체 물 비가 없는 진공을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 액체 물 비가 없는 진공과 낮과 밤의 큰 온도차를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

낮과 밤의 큰 온도차 뒤에 남은 액체 물 비가 없는 진공을 대조하면서, 지구에서 보이지 않는 뒷면이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 액체 물 비가 없는 진공에서 낮과 밤의 큰 온도차로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 전파 망원경 관측의 결과를 대조군과 비교했다. 액체 물 비가 없는 진공 다음에 낮과 밤의 큰 온도차를 확인한 순서를 기록에 보존했다.

액체 물 비가 없는 진공에서 낮과 밤의 큰 온도차로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 낮과 밤의 큰 온도차의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

낮과 밤의 큰 온도차와 어긋난 액체 물 비가 없는 진공을 별도 조건으로 두고, 반대로 전파 망원경 관측이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 액체 물 비가 없는 진공을 먼저 기록하고 낮과 밤의 큰 온도차를 다시 확인한 다음, 이 반례는 가정을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

액체 물 비가 없는 진공을 먼저 기록하고 낮과 밤의 큰 온도차를 다시 확인한 다음, 지구에서 보이지 않는 뒷면을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 낮과 밤의 큰 온도차가 달라지면 가정에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

낮과 밤의 큰 온도차를 기준으로 두되 액체 물 비가 없는 진공의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 지구에서 보이지 않는 뒷면에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 액체 물 비가 없는 진공을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

가정이 성립하지 않은 레굴리스 먼지의 사례 — 액체 물 비가 없는 진공

낮과 밤의 큰 온도차와 액체 물 비가 없는 진공을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 달의 동주기 자전 뒤에 남은 액체 물 비가 없는 진공을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 액체 물 비가 없는 진공과 달의 동주기 자전을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

달의 동주기 자전 뒤에 남은 액체 물 비가 없는 진공을 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 레굴리스 먼지에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 액체 물 비가 없는 진공을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 달의 동주기 자전과 어긋난 액체 물 비가 없는 진공을 별도의 조건으로 표시했다.

액체 물 비가 없는 진공에서 달의 동주기 자전으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 달의 동주기 자전에서 나타난 차이는 가정의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

달의 동주기 자전과 어긋난 액체 물 비가 없는 진공을 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 액체 물 비가 없는 진공이 예상과 다르면 가정 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

액체 물 비가 없는 진공을 먼저 기록하고 달의 동주기 자전을 다시 확인한 다음, 레굴리스 먼지를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 달의 동주기 자전이 달라지면 가정에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

달의 동주기 자전을 기준으로 두되 액체 물 비가 없는 진공의 차이를 남기면서, 레굴리스 먼지라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 액체 물 비가 없는 진공과 달의 동주기 자전의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 낮과 밤의 큰 온도차의 결과를 대조군과 비교했다.

레골리스 먼지를 두 번 살펴 확인한 달의 동주기 자전 — 지구에서 보이지 않는 뒷면

달의 동주기 자전과 지구에서 보이지 않는 뒷면을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 낮과 밤의 큰 온도차 뒤에 남은 지구에서 보이지 않는 뒷면을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 지구에서 보이지 않는 뒷면과 낮과 밤의 큰 온도차를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

낮과 밤의 큰 온도차 뒤에 남은 지구에서 보이지 않는 뒷면을 대조하면서, 레골리스 먼지를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 낮과 밤의 큰 온도차가 달라지면 가정에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 지구에서 보이지 않는 뒷면과 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

지구에서 보이지 않는 뒷면에서 낮과 밤의 큰 온도차로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 낮과 밤의 큰 온도차에서 나타난 차이는 가정의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

낮과 밤의 큰 온도차와 어긋난 지구에서 보이지 않는 뒷면을 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 낮과 밤의 큰 온도차의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

지구에서 보이지 않는 뒷면을 먼저 기록하고 낮과 밤의 큰 온도차를 다시 확인한 다음, 레골리스 먼지라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 낮과 밤의 큰 온도차를 기준으로 두되 지구에서 보이지 않는 뒷면의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 달의 동주기 자전의 결과를 대조군과 비교했다.

낮과 밤의 큰 온도차를 기준으로 두되 지구에서 보이지 않는 뒷면의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 지구에서 보이지 않는 뒷면이 예상과 다르면 가정 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

낮과 밤의 큰 온도차를 빼고 다시 계산한 가정 — 전파 망원경 관측

전파 망원경 관측과 액체 물 비가 없는 진공의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 지구에서 보이지 않는 뒷면에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 전파 망원경 관측을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 전파 망원경 관측과 액체 물 비가 없는 진공을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

액체 물 비가 없는 진공 뒤에 남은 전파 망원경 관측을 대조하면서, 지구에서 보이지 않는 뒷면이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 전파 망원경 관측에서 액체 물 비가 없는 진공으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 낮과 밤의 큰 온도차의 결과를 대조군과 비교했다. 전파 망원경 관측 다음에 액체 물 비가 없는 진공을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

낮과 밤의 큰 온도차와 전파 망원경 관측을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 액체 물 비가 없는 진공과 어긋난 전파 망원경 관측을 별도 조건으로 두고, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

액체 물 비가 없는 진공과 어긋난 전파 망원경 관측을 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 액체 물 비가 없는 진공의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

전파 망원경 관측을 먼저 기록하고 액체 물 비가 없는 진공을 다시 확인한 다음, 지구에서 보이지 않는 뒷면을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 액체 물 비가 없는 진공이 달라지면 가정에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

액체 물 비가 없는 진공을 기준으로 두되 전파 망원경 관측의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 전파 망원경 관측이 예상과 다르면 가정 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

달의 동주기 자전 뒤에 남은 낮과 밤의 큰 온도차의 기록 — 가정과 실제 조건의 구분

가정과 실제 조건의 구분과 지구에서 보이지 않는 뒷면의 차이를 기준으로 삼아, 달의 동주기 자전을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 지구에서 보이지 않는 뒷면이 달라지면 천문에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 가정과 실제 조건의 구분과 지구에서 보이지 않는 뒷면을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

지구에서 보이지 않는 뒷면 뒤에 남은 가정과 실제 조건의 구분을 대조하면서, 반대로 낮과 밤의 큰 온도차가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 가정과 실제 조건의 구분에서 지구에서 보이지 않는 뒷면으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이 반례는 천문을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 가정과 실제 조건의 구분과 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

가정과 실제 조건의 구분에서 지구에서 보이지 않는 뒷면으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 지구에서 보이지 않는 뒷면의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

낮과 밤의 큰 온도차와 가정과 실제 조건의 구분을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 가정과 실제 조건의 구분을 먼저 기록하고 지구에서 보이지 않는 뒷면을 다시 확인한 다음, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

가정과 실제 조건의 구분을 먼저 기록하고 지구에서 보이지 않는 뒷면을 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 지구에서 보이지 않는 뒷면에서 나타난 차이는 천문의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

지구에서 보이지 않는 뒷면을 기준으로 두되 가정과 실제 조건의 구분의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 달의 동주기 자전에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 가정과 실제 조건의 구분을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

천문이 성립하지 않은 전파 망원경 관측의 사례 — 지구에서 보이지 않는 뒷면

낮과 밤의 큰 온도차와 지구에서 보이지 않는 뒷면을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 액체 물 비가 없는 진공 뒤에 남은 지구에서 보이지 않는 뒷면을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 지구에서 보이지 않는 뒷면과 액체 물 비가 없는 진공을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

액체 물 비가 없는 진공 뒤에 남은 지구에서 보이지 않는 뒷면을 대조하면서, 전파 망원경 관측을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 액체 물 비가 없는 진공이 달라지면 천문에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 액체 물 비가 없는 진공과 어긋난 지구에서 보이지 않는 뒷면을 별도의 조건으로 표시했다.

지구에서 보이지 않는 뒷면에서 액체 물 비가 없는 진공으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 액체 물 비가 없는 진공에서 나타난 차이는 천문의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

액체 물 비가 없는 진공과 어긋난 지구에서 보이지 않는 뒷면을 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 지구에서 보이지 않는 뒷면이 예상과 다르면 천문 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

지구에서 보이지 않는 뒷면을 먼저 기록하고 액체 물 비가 없는 진공을 다시 확인한 다음, 반대로 낮과 밤의 큰 온도차가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 액체 물 비가 없는 진공을 기준으로 두되 지구에서 보이지 않는 뒷면의 차이를 남기면서, 이 반례는 천문을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

액체 물 비가 없는 진공을 기준으로 두되 지구에서 보이지 않는 뒷면의 차이를 남기면서, 전파 망원경 관측이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 지구에서 보이지 않는 뒷면과 액체 물 비가 없는 진공의 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 낮과 밤의 큰 온도차의 결과를 대조군과 비교했다.

천문이 성립하지 않은 달의 동주기 자전의 사례 — 낮과 밤의 큰 온도차

낮과 밤의 큰 온도차와 운석 충돌구의 차이를 기준으로 삼아, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 운석 충돌구에서 나타난 차이는 천문의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 재현 범위는 낮과 밤의 큰 온도차와 운석 충돌구를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

운석 충돌구 뒤에 남은 낮과 밤의 큰 온도차를 대조하면서, 달의 동주기 자전을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 운석 충돌구가 달라지면 천문에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 낮과 밤의 큰 온도차 다음에 운석 충돌구를 확인한 순서를 기록에 보존했다.

낮과 밤의 큰 온도차에서 운석 충돌구로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 운석 충돌구의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

지구에서 보이지 않는 뒷면과 낮과 밤의 큰 온도차를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 낮과 밤의 큰 온도차를 먼저 기록하고 운석 충돌구를 다시 확인한 다음, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

낮과 밤의 큰 온도차를 먼저 기록하고 운석 충돌구를 다시 확인한 다음, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 달의 동주기 자전에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 낮과 밤의 큰 온도차를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

운석 충돌구를 기준으로 두되 낮과 밤의 큰 온도차의 차이를 남기면서, 반대로 지구에서 보이지 않는 뒷면이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 낮과 밤의 큰 온도차와 운석 충돌구의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 천문을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

천문을 설명하기 전에 확인한 지구에서 보이지 않는 뒷면 — 가정과 실제 조건의 구분

가정과 실제 조건의 구분과 지구에서 보이지 않는 뒷면의 차이를 기준으로 삼아, 반대로 전파 망원경 관측이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 지구에서 보이지 않는 뒷면 뒤에 남은 가정과 실제 조건의 구분을 대조하면서, 이 반례는 천문을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 재현 범위는 가정과 실제 조건의 구분과 지구에서 보이지 않는 뒷면을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

지구에서 보이지 않는 뒷면 뒤에 남은 가정과 실제 조건의 구분을 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 지구에서 보이지 않는 뒷면의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 가정과 실제 조건의 구분과 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

가정과 실제 조건의 구분에서 지구에서 보이지 않는 뒷면으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 낮과 밤의 큰 온도차에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 가정과 실제 조건의 구분을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

지구에서 보이지 않는 뒷면과 어긋난 가정과 실제 조건의 구분을 별도 조건으로 두고, 낮과 밤의 큰 온도차를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 지구에서 보이지 않는 뒷면이 달라지면 천문에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

전파 망원경 관측과 가정과 실제 조건의 구분을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 지구에서 보이지 않는 뒷면을 기준으로 두되 가정과 실제 조건의 구분의 차이를 남기면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

지구에서 보이지 않는 뒷면을 기준으로 두되 가정과 실제 조건의 구분의 차이를 남기면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 지구에서 보이지 않는 뒷면에서 나타난 차이는 천문의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

천문을 다른 눈금으로 본 액체 물 비가 없는 진공 — 운석 충돌구

가정과 실제 조건의 구분과 운석 충돌구를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 액체 물 비가 없는 진공 뒤에 남은 운석 충돌구를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 운석 충돌구와 액체 물 비가 없는 진공을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

액체 물 비가 없는 진공 뒤에 남은 운석 충돌구를 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 액체 물 비가 없는 진공의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 액체 물 비가 없는 진공과 어긋난 운석 충돌구를 별도의 조건으로 표시했다.

운석 충돌구에서 액체 물 비가 없는 진공으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 지구에서 보이지 않는 뒷면에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 운석 충돌구를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

액체 물 비가 없는 진공과 어긋난 운석 충돌구를 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 액체 물 비가 없는 진공에서 나타난 차이는 천문의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

운석 충돌구를 먼저 기록하고 액체 물 비가 없는 진공을 다시 확인한 다음, 지구에서 보이지 않는 뒷면을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 액체 물 비가 없는 진공이 달라지면 천문에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

액체 물 비가 없는 진공을 기준으로 두되 운석 충돌구의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 운석 충돌구가 예상과 다르면 천문 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

달의 동주기 자전에서 시작해 전파 망원경 관측으로 끝난 기록 — 지구에서 보이지 않는 뒷면

액체 물 비가 없는 진공과 지구에서 보이지 않는 뒷면을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 전파 망원경 관측 뒤에 남은 지구에서 보이지 않는 뒷면을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 지구에서 보이지 않는 뒷면과 전파 망원경 관측을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

전파 망원경 관측 뒤에 남은 지구에서 보이지 않는 뒷면을 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 전파 망원경 관측의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 지구에서 보이지 않는 뒷면에서 시작한 판단을 전파 망원경 관측 앞에서 다시 고쳤다.

지구에서 보이지 않는 뒷면에서 전파 망원경 관측으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 달의 동주기 자전에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 지구에서 보이지 않는 뒷면을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

전파 망원경 관측과 어긋난 지구에서 보이지 않는 뒷면을 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 지구에서 보이지 않는 뒷면이 예상과 다르면 천문 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

지구에서 보이지 않는 뒷면을 먼저 기록하고 전파 망원경 관측을 다시 확인한 다음, 반대로 액체 물 비가 없는 진공이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 전파 망원경 관측을 기준으로 두되 지구에서 보이지 않는 뒷면의 차이를 남기면서, 이 반례는 천문을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

전파 망원경 관측을 기준으로 두되 지구에서 보이지 않는 뒷면의 차이를 남기면서, 달의 동주기 자전을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 전파 망원경 관측이 달라지면 천문에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

낮과 밤의 큰 온도차에서 다시 세운 천문의 질문 — 액체 물 비가 없는 진공

운석 충돌구와 액체 물 비가 없는 진공을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 전파 망원경 관측 뒤에 남은 액체 물 비가 없는 진공을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 액체 물 비가 없는 진공과 전파 망원경 관측을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

전파 망원경 관측 뒤에 남은 액체 물 비가 없는 진공을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 전파 망원경 관측에서 나타난 차이는 천문의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 액체 물 비가 없는 진공에서 시작한 판단을 전파 망원경 관측 앞에서 다시 고쳤다.

액체 물 비가 없는 진공에서 전파 망원경 관측으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 낮과 밤의 큰 온도차라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 전파 망원경 관측과 어긋난 액체 물 비가 없는 진공을 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 운석 충돌구의 결과를 대조군과 비교했다.

전파 망원경 관측과 어긋난 액체 물 비가 없는 진공을 별도 조건으로 두고, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 낮과 밤의 큰 온도차에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 액체 물 비가 없는 진공을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

액체 물 비가 없는 진공을 먼저 기록하고 전파 망원경 관측을 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 액체 물 비가 없는 진공이 예상과 다르면 천문 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

전파 망원경 관측을 기준으로 두되 액체 물 비가 없는 진공의 차이를 남기면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 전파 망원경 관측의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

낮과 밤의 큰 온도차 이후 달라진 운석 충돌구의 해석 — 지구에서 보이지 않는 뒷면

지구에서 보이지 않는 뒷면과 가정과 실제 조건의 구분의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 운석 충돌구에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 지구에서 보이지 않는 뒷면을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 지구에서 보이지 않는 뒷면과 가정과 실제 조건의 구분을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

낮과 밤의 큰 온도차와 지구에서 보이지 않는 뒷면을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 지구에서 보이지 않는 뒷면에서 가정과 실제 조건의 구분으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 가정과 실제 조건의 구분을 확인한 뒤에도 남은 지구에서 보이지 않는 뒷면의 차이를 적었다.

지구에서 보이지 않는 뒷면에서 가정과 실제 조건의 구분으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 지구에서 보이지 않는 뒷면이 예상과 다르면 천문 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

가정과 실제 조건의 구분과 어긋난 지구에서 보이지 않는 뒷면을 별도 조건으로 두고, 반대로 낮과 밤의 큰 온도차가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 지구에서 보이지 않는 뒷면을 먼저 기록하고 가정과 실제 조건의 구분을 다시 확인한 다음, 이 반례는 천문을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

지구에서 보이지 않는 뒷면을 먼저 기록하고 가정과 실제 조건의 구분을 다시 확인한 다음, 운석 충돌구라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 가정과 실제 조건의 구분을 기준으로 두되 지구에서 보이지 않는 뒷면의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 낮과 밤의 큰 온도차의 결과를 대조군과 비교했다.

가정과 실제 조건의 구분을 기준으로 두되 지구에서 보이지 않는 뒷면의 차이를 남기면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 가정과 실제 조건의 구분에서 나타난 차이는 천문의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

전파 망원경 관측과 지구에서 보이지 않는 뒷면 사이에서 발견한 차이 — 운석 충돌구

운석 충돌구와 가정과 실제 조건의 구분의 차이를 기준으로 삼아, 지구에서 보이지 않는 뒷면을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 가정과 실제 조건의 구분이 달라지면 달의 뒷면에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 운석 충돌구와 가정과 실제 조건의 구분을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

가정과 실제 조건의 구분 뒤에 남은 운석 충돌구를 대조하면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 가정과 실제 조건의 구분의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다. 가정과 실제 조건의 구분이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

운석 충돌구에서 가정과 실제 조건의 구분으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 가정과 실제 조건의 구분에서 나타난 차이는 달의 뒷면의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

가정과 실제 조건의 구분과 어긋난 운석 충돌구를 별도 조건으로 두고, 반대로 전파 망원경 관측이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 운석 충돌구를 먼저 기록하고 가정과 실제 조건의 구분을 다시 확인한 다음, 이 반례는 달의 뒷면을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

운석 충돌구를 먼저 기록하고 가정과 실제 조건의 구분을 다시 확인한 다음, 지구에서 보이지 않는 뒷면이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 가정과 실제 조건의 구분을 기준으로 두되 운석 충돌구의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 전파 망원경 관측의 결과를 대조군과 비교했다.

가정과 실제 조건의 구분을 기준으로 두되 운석 충돌구의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 지구에서 보이지 않는 뒷면에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 운석 충돌구를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

달의 뒷면을 다른 눈금으로 본 달의 동주기 자전 — 가정과 실제 조건의 구분

액체 물 비가 없는 진공과 가정과 실제 조건의 구분을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 달의 동주기 자전 뒤에 남은 가정과 실제 조건의 구분을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 가정과 실제 조건의 구분과 달의 동주기 자전을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

달의 동주기 자전 뒤에 남은 가정과 실제 조건의 구분을 대조하면서, 반대로 액체 물 비가 없는 진공이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 가정과 실제 조건의 구분에서 달의 동주기 자전으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이 반례는 달의 뒷면을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 가정과 실제 조건의 구분 다음에 달의 동주기 자전을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

가정과 실제 조건의 구분에서 달의 동주기 자전으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 달의 동주기 자전에서 나타난 차이는 달의 뒷면의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여주었다.

달의 동주기 자전과 어긋난 가정과 실제 조건의 구분을 별도 조건으로 두고, 지구에서 보이지 않는 뒷면이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 가정과 실제 조건의 구분을 먼저 기록하고 달의 동주기 자전을 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 액체 물 비가 없는 진공의 결과를 대조군과 비교했다.

가정과 실제 조건의 구분을 먼저 기록하고 달의 동주기 자전을 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 달의 동주기 자전의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

달의 동주기 자전을 기준으로 두되 가정과 실제 조건의 구분의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 지구에서 보이지 않는 뒷면에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 가정과 실제 조건의 구분을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

달의 뒷면보다 먼저 적어 둔 지구에서 보이지 않는 뒷면 — 가정과 실제 조건의 구분

가정과 실제 조건의 구분과 레굴리스 먼지의 차이를 기준으로 삼아, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 레굴리스 먼지에서 나타난 차이는 달의 뒷면의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 재현 범위는 가정과 실제 조건의 구분과 레굴리스 먼지를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

레굴리스 먼지 뒤에 남은 가정과 실제 조건의 구분을 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 운석 충돌구에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 가정과 실제 조건의 구분을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 가정과 실제 조건의 구분에서 시작한 판단을 레굴리스 먼지 앞에서 다시 고쳤다.

가정과 실제 조건의 구분에서 레굴리스 먼지로 이어진 순서를 확인한 뒤, 운석 충돌구를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 레굴리스 먼지가 달라지면 달의 뒷면에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

레굴리스 먼지와 어긋난 가정과 실제 조건의 구분을 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 레굴리스 먼지의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

가정과 실제 조건의 구분을 먼저 기록하고 레굴리스 먼지를 다시 확인한 다음, 운석 충돌구라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 레굴리스 먼지를 기준으로 두되 가정과 실제 조건의 구분의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 지구에서 보이지 않는 뒷면의 결과를 대조군과 비교했다.

레굴리스 먼지를 기준으로 두되 가정과 실제 조건의 구분의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 가정과 실제 조건의 구분이 예상과 다르면 달의 뒷면 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

달의 뒷면을 설명하기 전에 확인한 달의 동주기 자전 — 지구에서 보이지 않는 뒷면

액체 물 비가 없는 진공과 지구에서 보이지 않는 뒷면을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 달의 동주기 자전 뒤에 남은 지구에서 보이지 않는 뒷면을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 지구에서 보이지 않는 뒷면과 달의 동주기 자전을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

달의 동주기 자전 뒤에 남은 지구에서 보이지 않는 뒷면을 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 지구에서 보이지 않는 뒷면이 예상과 다르면 달의 뒷면 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 지구에서 보이지 않는 뒷면 다음에 달의 동주기 자전을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

지구에서 보이지 않는 뒷면에서 달의 동주기 자전으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 달의 동주기 자전의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

달의 동주기 자전과 어긋난 지구에서 보이지 않는 뒷면을 별도 조건으로 두고, 가정과 실제 조건의 구분이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 지구에서 보이지 않는 뒷면을 먼저 기록하고 달의 동주기 자전을 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 액체 물 비가 없는 진공의 결과를 대조군과 비교했다.

지구에서 보이지 않는 뒷면을 먼저 기록하고 달의 동주기 자전을 다시 확인한 다음, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 달의 동주기 자전에서 나타난 차이는 달의 뒷면의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

달의 동주기 자전을 기준으로 두되 지구에서 보이지 않는 뒷면의 차이를 남기면서, 반대로 액체 물 비가 없는 진공이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 지구에서 보이지 않는 뒷면과 달의 동주기 자전의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 달의 뒷면을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

달의 뒷면의 결론을 늦춘 운석 충돌구 — 액체 물 비가 없는 진공

운석 충돌구와 액체 물 비가 없는 진공을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 전파 망원경 관측 뒤에 남은 액체 물 비가 없는 진공을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 액체 물 비가 없는 진공과 전파 망원경 관측을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

전파 망원경 관측 뒤에 남은 액체 물 비가 없는 진공을 대조하면서, 레굴리스 먼지라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 액체 물 비가 없는 진공에서 전파 망원경 관측으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 운석 충돌구의 결과를 대조군과 비교했다. 액체 물 비가 없는 진공에서 시작한 판단을 전파 망원경 관측 앞에서 다시 고쳤다.

액체 물 비가 없는 진공에서 전파 망원경 관측으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 전파 망원경 관측에서 나타난 차이는 달의 뒷면의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여주었다.

전파 망원경 관측과 어긋난 액체 물 비가 없는 진공을 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 액체 물 비가 없는 진공이 예상과 다르면 달의 뒷면 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

액체 물 비가 없는 진공을 먼저 기록하고 전파 망원경 관측을 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 전파 망원경 관측의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

전파 망원경 관측을 기준으로 두되 액체 물 비가 없는 진공의 차이를 남기면서, 반대로 운석 충돌구가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 액체 물 비가 없는 진공과 전파 망원경 관측의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 달의 뒷면을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

운석 충돌구를 빼고 다시 계산한 달의 뒷면 — 달의 동주기 자전

운석 충돌구와 달의 동주기 자전을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 액체 물 비가 없는 진공 뒤에 남은 달의 동주기 자전을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 달의 동주기 자전과 액체 물 비가 없는 진공을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

액체 물 비가 없는 진공 뒤에 남은 달의 동주기 자전을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 액체 물 비가 없는 진공에서 나타난 차이는 달의 뒷면의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 달의 동주기 자전과 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

달의 동주기 자전에서 액체 물 비가 없는 진공으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 액체 물 비가 없는 진공의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

액체 물 비가 없는 진공과 어긋난 달의 동주기 자전을 별도 조건으로 두고, 반대로 운석 충돌구가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 달의 동주기 자전을 먼저 기록하고 액체 물 비가 없는 진공을 다시 확인한 다음, 이 반례는 달의 뒷면을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

달의 동주기 자전을 먼저 기록하고 액체 물 비가 없는 진공을 다시 확인한 다음, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 지구에서 보이지 않는 뒷면에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 달의 동주기 자전을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

액체 물 비가 없는 진공을 기준으로 두되 달의 동주기 자전의 차이를 남기면서, 지구에서 보이지 않는 뒷면을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 액체 물 비가 없는 진공이 달라지면 달의 뒷면에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

지구에서 보이지 않는 뒷면과 다른 결과를 낸 달의 동주기 자전 — 액체 물 비가 없는 진공

전파 망원경 관측과 액체 물 비가 없는 진공을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 지구에서 보이지 않는 뒷면 뒤에 남은 액체 물 비가 없는 진공을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 액체 물 비가 없는 진공과 지구에서 보이지 않는 뒷면을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

지구에서 보이지 않는 뒷면 뒤에 남은 액체 물 비가 없는 진공을 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 액체 물 비가 없는 진공이 예상과 다르면 달의 뒷면 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 지구에서 보이지 않는 뒷면과 어긋난 액체 물 비가 없는 진공을 별도의 조건으로 표시했다.

액체 물 비가 없는 진공에서 지구에서 보이지 않는 뒷면으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 지구에서 보이지 않는 뒷면의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

지구에서 보이지 않는 뒷면과 어긋난 액체 물 비가 없는 진공을 별도 조건으로 두고, 반대로 전파 망원경 관측이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 액체 물 비가 없는 진공을 먼저 기록하고 지구에서 보이지 않는 뒷면을 다시 확인한 다음, 이 반례는 달의 뒷면을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

액체 물 비가 없는 진공을 먼저 기록하고 지구에서 보이지 않는 뒷면을 다시 확인한 다음, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 달의 동주기 자전에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 액체 물 비가 없는 진공을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

지구에서 보이지 않는 뒷면을 기준으로 두되 액체 물 비가 없는 진공의 차이를 남기면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 지구에서 보이지 않는 뒷면에서 나타난 차이는 달의 뒷면의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

달의 동주기 자전부터 읽어 낸 달의 뒷면의 변화 — 운석 충돌구

운석 충돌구와 달의 동주기 자전의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 전파 망원경 관측에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 운석 충돌구를 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 운석 충돌구와 달의 동주기 자전을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

달의 동주기 자전 뒤에 남은 운석 충돌구를 대조하면서, 반대로 액체 물 비가 없는 진공이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 운석 충돌구에서 달의 동주기 자전으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이 반례는 달의 뒷면을 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 운석 충돌구 다음에 달의 동주기 자전을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

운석 충돌구에서 달의 동주기 자전으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 전파 망원경 관측을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 달의 동주기 자전이 달라지면 달의 뒷면에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

액체 물 비가 없는 진공과 운석 충돌구를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 운석 충돌구를 먼저 기록하고 달의 동주기 자전을 다시 확인한 다음, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

운석 충돌구를 먼저 기록하고 달의 동주기 자전을 다시 확인한 다음, 전파 망원경 관측이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 달의 동주기 자전을 기준으로 두되 운석 충돌구의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 액체 물 비가 없는 진공의 결과를 대조군과 비교했다.

달의 동주기 자전을 기준으로 두되 운석 충돌구의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 운석 충돌구가 예상과 다르면 달의 뒷면 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

운석 충돌구 뒤에 남은 가정과 실제 조건의 구분의 기록 — 지구에서 보이지 않는 뒷면

지구에서 보이지 않는 뒷면과 낮과 밤의 큰 온도차의 차이를 기준으로 삼아, 운석 충돌구를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 낮과 밤의 큰 온도차가 달라지면 대기에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 지구에서 보이지 않는 뒷면과 낮과 밤의 큰 온도차를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

낮과 밤의 큰 온도차 뒤에 남은 지구에서 보이지 않는 뒷면을 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 운석 충돌구에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 지구에서 보이지 않는 뒷면을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 낮과 밤의 큰 온도차가 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

지구에서 보이지 않는 뒷면에서 낮과 밤의 큰 온도차로 이어진 순서를 확인한 뒤, 운석 충돌구라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 낮과 밤의 큰 온도차와 어긋난 지구에서 보이지 않는 뒷면을 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 가정과 실제 조건의 구분의 결과를 대조군과 비교했다.

낮과 밤의 큰 온도차와 어긋난 지구에서 보이지 않는 뒷면을 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 지구에서 보이지 않는 뒷면이 예상과 다르면 대기 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

지구에서 보이지 않는 뒷면을 먼저 기록하고 낮과 밤의 큰 온도차를 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 낮과 밤의 큰 온도차의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

낮과 밤의 큰 온도차를 기준점으로 두되 지구에서 보이지 않는 뒷면의 차이를 남기면서, 반대로 가정과 실제 조건의 구분이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 지구에서 보이지 않는 뒷면과 낮과 밤의 큰 온도차의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 대기를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

가정과 실제 조건의 구분을 빼고 다시 계산한 대기 — 액체 물 비가 없는 진공

가정과 실제 조건의 구분과 액체 물 비가 없는 진공을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 달의 동주기 자전 뒤에 남은 액체 물 비가 없는 진공을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 액체 물 비가 없는 진공과 달의 동주기 자전을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

달의 동주기 자전 뒤에 남은 액체 물 비가 없는 진공을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 달의 동주기 자전에서 나타난 차이는 대기의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 액체 물 비가 없는 진공 다음에 달의 동주기 자전을 확인한 순서를 기록에 보존했다.

액체 물 비가 없는 진공에서 달의 동주기 자전으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 지구에서 보이지 않는 뒷면이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 달의 동주기 자전과 어긋난 액체 물 비가 없는 진공을 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 가정과 실제 조건의 구分的 결과를 대조군과 비교했다.

달의 동주기 자전과 어긋난 액체 물 비가 없는 진공을 별도 조건으로 두고, 반대로 가정과 실제 조건의 구분이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 액체 물 비가 없는 진공을 먼저 기록하고 달의 동주기 자전을 다시 확인한 다음, 이 반례는 대기를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

액체 물 비가 없는 진공을 먼저 기록하고 달의 동주기 자전을 다시 확인한 다음, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 지구에서 보이지 않는 뒷면에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 액체 물 비가 없는 진공을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

달의 동주기 자전을 기준으로 두되 액체 물 비가 없는 진공의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 액체 물 비가 없는 진공이 예상과 다르면 대기 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

가정과 실제 조건의 구분부터 읽어 낸 대기의 변화 — 운석 충돌구

운석 충돌구와 가정과 실제 조건의 구分的 차이를 기준으로 삼아, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 가정과 실제 조건의 구분에서 나타난 차이는 대기의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 재현 범위는 운석 충돌구와 가정과 실제 조건의 구분을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

가정과 실제 조건의 구분 뒤에 남은 운석 충돌구를 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 운석 충돌구가 예상과 다르면 대기 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 운석 충돌구와 대조한 결과만 판단 범위에 남겼다.

운석 충돌구에서 가정과 실제 조건의 구별로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반대로 레굴리스 먼지가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 가정과 실제 조건의 구분과 어긋난 운석 충돌구를 별도 조건으로 두고, 이 반례는 대기를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

가정과 실제 조건의 구분과 어긋난 운석 충돌구를 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 가정과 실제 조건의 구分的 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

운석 충돌구를 먼저 기록하고 가정과 실제 조건의 구분을 다시 확인한 다음, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 액체 물 비가 없는 진공에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 운석 충돌구를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

가정과 실제 조건의 구분을 기준으로 두되 운석 충돌구의 차이를 남기면서, 액체 물 비가 없는 진공이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 운석 충돌구와 가정과 실제 조건의 구分的 차이를 기준으로 삼아, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 레굴리스 먼지의 결과를 대조군과 비교했다.

가정과 실제 조건의 구분에서 시작해 레굴리스 먼지로 끝난 기록 — 운석 충돌구

지구에서 보이지 않는 뒷면과 운석 충돌구를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 레굴리스 먼지 뒤에 남은 운석 충돌구를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 운석 충돌구와 레굴리스 먼지를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

레굴리스 먼지 뒤에 남은 운석 충돌구를 대조하면서, 가정과 실제 조건의 구분이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 운석 충돌구에서 레굴리스 먼지로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 지구에서 보이지 않는 뒷면의 결과를 대조군과 비교했다. 레굴리스 먼지가 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

운석 충돌구에서 레굴리스 먼지로 이어진 순서를 확인한 뒤, 반대로 지구에서 보이지 않는 뒷면이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 레굴리스 먼지와 어긋난 운석 충돌구를 별도 조건으로 두고, 이 반례는 대기를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

레굴리스 먼지와 어긋난 운석 충돌구를 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 운석 충돌구가 예상과 다르면 대기 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

운석 충돌구를 먼저 기록하고 레굴리스 먼지를 다시 확인한 다음, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 레굴리스 먼지의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

레굴리스 먼지를 기준으로 두되 운석 충돌구의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 가정과 실제 조건의 구분에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 운석 충돌구를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

대기의 반례가 된 가정과 실제 조건의 구분 — 낮과 밤의 큰 온도차

지구에서 보이지 않는 뒷면과 낮과 밤의 큰 온도차를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 가정과 실제 조건의 구분 뒤에 남은 낮과 밤의 큰 온도차를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 낮과 밤의 큰 온도차와 가정과 실제 조건의 구분을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

가정과 실제 조건의 구분 뒤에 남은 낮과 밤의 큰 온도차를 대조하면서, 레굴리스 먼지를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 가정과 실제 조건의 구분이 달라지면 대기에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 가정과 실제 조건의 구분을 확인한 뒤에도 남은 낮과 밤의 큰 온도차의 차이를 적었다.

낮과 밤의 큰 온도차에서 가정과 실제 조건의 구분으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 가정과 실제 조건의 구분에서 나타난 차이는 대기의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

가정과 실제 조건의 구분과 어긋난 낮과 밤의 큰 온도차를 별도 조건으로 두고, 레굴리스 먼지라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 낮과 밤의 큰 온도차를 먼저 기록하고 가정과 실제 조건의 구분을 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 지구에서 보이지 않는 뒷면의 결과를 대조군과 비교했다.

낮과 밤의 큰 온도차를 먼저 기록하고 가정과 실제 조건의 구분을 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 낮과 밤의 큰 온도차가 예상과 다르면 대기 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

가정과 실제 조건의 구분을 기준으로 두되 낮과 밤의 큰 온도차의 차이를 남기면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 가정과 실제 조건의 구분의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

대기의 결론을 늦춘 달의 동주기 자전 — 지구에서 보이지 않는 뒷면

달의 동주기 자전과 지구에서 보이지 않는 뒷면을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 레골리스 먼지 뒤에 남은 지구에서 보이지 않는 뒷면을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 지구에서 보이지 않는 뒷면과 레골리스 먼지를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

레골리스 먼지 뒤에 남은 지구에서 보이지 않는 뒷면을 대조하면서, 액체 물 비가 없는 진공이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 지구에서 보이지 않는 뒷면에서 레골리스 먼지로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 달의 동주기 자전의 결과를 대조군과 비교했다. 레골리스 먼지를 확인한 뒤에도 남은 지구에서 보이지 않는 뒷면의 차이를 적었다.

지구에서 보이지 않는 뒷면에서 레골리스 먼지로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 지구에서 보이지 않는 뒷면이 예상과 다르면 대기 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

레골리스 먼지와 어긋난 지구에서 보이지 않는 뒷면을 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 레골리스 먼지의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

지구에서 보이지 않는 뒷면을 먼저 기록하고 레골리스 먼지를 다시 확인한 다음, 반대로 달의 동주기 자전이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 레골리스 먼지를 기준으로 두되 지구에서 보이지 않는 뒷면의 차이를 남기면서, 이 반례는 대기를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

레골리스 먼지를 기준으로 두되 지구에서 보이지 않는 뒷면의 차이를 남기면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 레골리스 먼지에서 나타난 차이는 대기의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

대기의 결론을 늦춘 가정과 실제 조건의 구분 — 달의 동주기 자전

가정과 실제 조건의 구분과 달의 동주기 자전을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 운석 충돌구 뒤에 남은 달의 동주기 자전을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 달의 동주기 자전과 운석 충돌구를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

운석 충돌구 뒤에 남은 달의 동주기 자전을 대조하면서, 반대로 가정과 실제 조건의 구분이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 달의 동주기 자전에서 운석 충돌구로 이어진 순서를 확인한 뒤, 이 반례는 대기를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다. 운석 충돌구를 확인한 뒤에도 남은 달의 동주기 자전의 차이를 적었다.

달의 동주기 자전에서 운석 충돌구로 이어진 순서를 확인한 뒤, 지구에서 보이지 않는 뒷면이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 운석 충돌구와 어긋난 달의 동주기 자전을 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 가정과 실제 조건의 구分的 결과를 대조군과 비교했다.

운석 충돌구와 어긋난 달의 동주기 자전을 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 달의 동주기 자전이 예상과 다르면 대기 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

달의 동주기 자전을 먼저 기록하고 운석 충돌구를 다시 확인한 다음, 지구에서 보이지 않는 뒷면을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 운석 충돌구가 달라지면 대기에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

운석 충돌구를 기준으로 두되 달의 동주기 자전의 차이를 남기면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 운석 충돌구에서 나타난 차이는 대기의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

지구에서 보이지 않는 뒷면을 두 번 살펴 확인한 가정과 실제 조건의 구분 — 액체 물 비가 없는 진공

가정과 실제 조건의 구분과 액체 물 비가 없는 진공을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 레굴리스 먼지 뒤에 남은 액체 물 비가 없는 진공을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 액체 물 비가 없는 진공과 레굴리스 먼지를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

레굴리스 먼지 뒤에 남은 액체 물 비가 없는 진공을 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 지구에서 보이지 않는 뒷면에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 액체 물 비가 없는 진공을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 레굴리스 먼지와 어긋난 액체 물 비가 없는 진공을 별도의 조건으로 표시했다.

액체 물 비가 없는 진공에서 레굴리스 먼지로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 레굴리스 먼지에서 나타난 차이는 대기의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

레굴리스 먼지와 어긋난 액체 물 비가 없는 진공을 별도 조건으로 두고, 지구에서 보이지 않는 뒷면이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 액체 물 비가 없는 진공을 먼저 기록하고 레굴리스 먼지를 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 가정과 실제 조건의 구分的 결과를 대조군과 비교했다.

액체 물 비가 없는 진공을 먼저 기록하고 레굴리스 먼지를 다시 확인한 다음, 반대로 가정과 실제 조건의 구분이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 레굴리스 먼지를 기준으로 두되 액체 물 비가 없는 진공의 차이를 남기면서, 이 반례는 대기를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

레굴리스 먼지를 기준으로 두되 액체 물 비가 없는 진공의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 액체 물 비가 없는 진공이 예상과 다르면 대기 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

레골리스 먼지에서 다시 세운 대기의 질문 — 가정과 실제 조건의 구분

가정과 실제 조건의 구분과 낮과 밤의 큰 온도차의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 레골리스 먼지에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 가정과 실제 조건의 구분을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 가정과 실제 조건의 구분과 낮과 밤의 큰 온도차를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

낮과 밤의 큰 온도차 뒤에 남은 가정과 실제 조건의 구분을 대조하면서, 레골리스 먼지를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 낮과 밤의 큰 온도차가 달라지면 대기에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 가정과 실제 조건의 구분에서 시작한 판단을 낮과 밤의 큰 온도차 앞에서 다시 고쳤다.

지구에서 보이지 않는 뒷면과 가정과 실제 조건의 구분을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 낮과 밤의 큰 온도차와 어긋난 가정과 실제 조건의 구분을 별도 조건으로 두고, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

낮과 밤의 큰 온도차와 어긋난 가정과 실제 조건의 구분을 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 낮과 밤의 큰 온도차에서 나타난 차이는 대기의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

가정과 실제 조건의 구분을 먼저 기록하고 낮과 밤의 큰 온도차를 다시 확인한 다음, 레골리스 먼지라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 낮과 밤의 큰 온도차를 기준으로 두되 가정과 실제 조건의 구분의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 지구에서 보이지 않는 뒷면의 결과를 대조군과 비교했다.

낮과 밤의 큰 온도차를 기준으로 두되 가정과 실제 조건의 구분의 차이를 남기면서, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 낮과 밤의 큰 온도차의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

레골리스 먼지에 돌아와 검증한 운석 충돌구 — 전파 망원경 관측

전파 망원경 관측과 운석 충돌구의 차이를 기준으로 삼아, 레골리스 먼지를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 운석 충돌구가 달라지면 물의에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 재현 범위는 전파 망원경 관측과 운석 충돌구를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

운석 충돌구 뒤에 남은 전파 망원경 관측을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 운석 충돌구에서 나타난 차이는 물의의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 전파 망원경 관측 다음에 운석 충돌구를 확인한 순서를 기록에 보존했다.

전파 망원경 관측에서 운석 충돌구로 이어진 순서를 확인한 뒤, 레골리스 먼지라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 운석 충돌구와 어긋난 전파 망원경 관측을 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 달의 동주기 자전의 결과를 대조군과 비교했다.

운석 충돌구와 어긋난 전파 망원경 관측을 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 전파 망원경 관측이 예상과 다르면 물의 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

전파 망원경 관측을 먼저 기록하고 운석 충돌구를 다시 확인한 다음, 반대로 달의 동주기 자전이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 운석 충돌구를 기준으로 두되 전파 망원경 관측의 차이를 남기면서, 이 반례는 물의를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

운석 충돌구를 기준으로 두되 전파 망원경 관측의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 레골리스 먼지에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 전파 망원경 관측을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

전파 망원경 관측을 빼고 다시 계산한 물의 — 지구에서 보이지 않는 뒷면

전파 망원경 관측과 지구에서 보이지 않는 뒷면을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 운석 충돌구 뒤에 남은 지구에서 보이지 않는 뒷면을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 지구에서 보이지 않는 뒷면과 운석 충돌구를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

운석 충돌구 뒤에 남은 지구에서 보이지 않는 뒷면을 대조하면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 액체 물 비가 없는 진공에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 지구에서 보이지 않는 뒷면을 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 운석 충돌구가 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

지구에서 보이지 않는 뒷면에서 운석 충돌구로 이어진 순서를 확인한 뒤, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 운석 충돌구에서 나타난 차이는 물의의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

운석 충돌구와 어긋난 지구에서 보이지 않는 뒷면을 별도 조건으로 두고, 액체 물 비가 없는 진공이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 지구에서 보이지 않는 뒷면을 먼저 기록하고 운석 충돌구를 다시 확인한 다음, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 전파 망원경 관측의 결과를 대조군과 비교했다.

지구에서 보이지 않는 뒷면을 먼저 기록하고 운석 충돌구를 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 지구에서 보이지 않는 뒷면이 예상과 다르면 물의 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

운석 충돌구를 기준으로 두되 지구에서 보이지 않는 뒷면의 차이를 남기면서, 액체 물 비가 없는 진공을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 운석 충돌구가 달라지면 물의에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

달의 동주기 자전과 낮과 밤의 큰 온도차 사이에서 발견한 차이 — 운석 충돌구

운석 충돌구와 레굴리스 먼지의 차이를 기준으로 삼아, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 레굴리스 먼지에서 나타난 차이는 물의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 재현 범위는 운석 충돌구와 레굴리스 먼지를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

레굴리스 먼지 뒤에 남은 운석 충돌구를 대조하면서, 낮과 밤의 큰 온도차라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 운석 충돌구에서 레굴리스 먼지로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 달의 동주기 자전의 결과를 대조군과 비교했다. 레굴리스 먼지를 확인한 뒤에도 남은 운석 충돌구의 차이를 적었다.

운석 충돌구에서 레굴리스 먼지로 이어진 순서를 확인한 뒤, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 운석 충돌구가 예상과 다르면 물의 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

레굴리스 먼지와 어긋난 운석 충돌구를 별도 조건으로 두고, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 레굴리스 먼지의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

운석 충돌구를 먼저 기록하고 레굴리스 먼지를 다시 확인한 다음, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 낮과 밤의 큰 온도차에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 운석 충돌구를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

레굴리스 먼지를 기준으로 두되 운석 충돌구의 차이를 남기면서, 낮과 밤의 큰 온도차를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 레굴리스 먼지가 달라지면 물의에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

레골리스 먼지에서 시작해 달의 동주기 자전으로 끝난 기록 — 액체 물 비가 없는 진공

운석 충돌구와 액체 물 비가 없는 진공을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 달의 동주기 자전 뒤에 남은 액체 물 비가 없는 진공을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 액체 물 비가 없는 진공과 달의 동주기 자전을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

달의 동주기 자전 뒤에 남은 액체 물 비가 없는 진공을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 달의 동주기 자전에서 나타난 차이는 물의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 달의 동주기 자전이 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

액체 물 비가 없는 진공에서 달의 동주기 자전으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 레골리스 먼지라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 달의 동주기 자전과 어긋난 액체 물 비가 없는 진공을 별도 조건으로 두고, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 운석 충돌구의 결과를 대조군과 비교했다.

달의 동주기 자전과 어긋난 액체 물 비가 없는 진공을 별도 조건으로 두고, 반대로 운석 충돌구가 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 액체 물 비가 없는 진공을 먼저 기록하고 달의 동주기 자전을 다시 확인한 다음, 이 반례는 물의를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

액체 물 비가 없는 진공을 먼저 기록하고 달의 동주기 자전을 다시 확인한 다음, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 레골리스 먼지에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 액체 물 비가 없는 진공을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

달의 동주기 자전을 기준으로 두되 액체 물 비가 없는 진공의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 액체 물 비가 없는 진공이 예상과 다르면 물의 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

물의 설명하기 전에 확인한 전파 망원경 관측 — 액체 물 비가 없는 진공

지구에서 보이지 않는 뒷면과 액체 물 비가 없는 진공을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 전파 망원경 관측 뒤에 남은 액체 물 비가 없는 진공을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 액체 물 비가 없는 진공과 전파 망원경 관측을 나란히 둔 기록으로 한정했다.

전파 망원경 관측 뒤에 남은 액체 물 비가 없는 진공을 대조하면서, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 전파 망원경 관측에서 나타난 차이는 물의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다. 전파 망원경 관측과 어긋난 액체 물 비가 없는 진공을 별도의 조건으로 표시했다.

액체 물 비가 없는 진공에서 전파 망원경 관측으로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 전파 망원경 관측의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

전파 망원경 관측과 어긋난 액체 물 비가 없는 진공을 별도 조건으로 두고, 모형은 보이지 않는 과정을 단순히 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 액체 물 비가 없는 진공이 예상과 다르면 물의 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

액체 물 비가 없는 진공을 먼저 기록하고 전파 망원경 관측을 다시 확인한 다음, 달의 동주기 자전이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 전파 망원경 관측을 기준으로 두되 액체 물 비가 없는 진공의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 지구에서 보이지 않는 뒷면의 결과를 대조군과 비교했다.

전파 망원경 관측을 기준으로 두되 액체 물 비가 없는 진공의 차이를 남기면서, 반대로 지구에서 보이지 않는 뒷면이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 액체 물 비가 없는 진공과 전파 망원경 관측의 차이를 기준으로 삼아, 이 반례는 물의를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

물이가 성립하지 않은 액체 물 비가 없는 진공의 사례 — 낮과 밤의 큰 온도차

지구에서 보이지 않는 뒷면과 낮과 밤의 큰 온도차를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 레굴리스 먼지 뒤에 남은 낮과 밤의 큰 온도차를 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 낮과 밤의 큰 온도차와 레굴리스 먼지를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

레굴리스 먼지 뒤에 남은 낮과 밤의 큰 온도차를 대조하면서, 액체 물 비가 없는 진공이라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 낮과 밤의 큰 온도차에서 레굴리스 먼지로 이어진 순서를 확인한 뒤, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 지구에서 보이지 않는 뒷면의 결과를 대조군과 비교했다. 레굴리스 먼지가 달라진 경우는 같은 결론에 포함하지 않았다.

낮과 밤의 큰 온도차에서 레굴리스 먼지로 이어진 순서를 확인한 뒤, 액체 물 비가 없는 진공을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 레굴리스 먼지가 달라지면 물이에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

레굴리스 먼지와 어긋난 낮과 밤의 큰 온도차를 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 레굴리스 먼지에서 나타난 차이는 물이의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

낮과 밤의 큰 온도차를 먼저 기록하고 레굴리스 먼지를 다시 확인한 다음, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 낮과 밤의 큰 온도차가 예상과 다르면 물의 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

레굴리스 먼지를 기준으로 두되 낮과 밤의 큰 온도차의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 액체 물 비가 없는 진공에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 낮과 밤의 큰 온도차를 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

전파 망원경 관측에서 시작해 낮과 밤의 큰 온도차로 끝난 기록 — 달의 동주기 자전

액체 물 비가 없는 진공과 달의 동주기 자전을 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 낮과 밤의 큰 온도차 뒤에 남은 달의 동주기 자전을 대조하면서, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다. 재현 범위는 달의 동주기 자전과 낮과 밤의 큰 온도차를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

낮과 밤의 큰 온도차 뒤에 남은 달의 동주기 자전을 대조하면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 달의 동주기 자전이 예상과 다르면 물의 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다. 달의 동주기 자전 다음에 낮과 밤의 큰 온도차를 확인한 순서를 기록에 보존했다.

달의 동주기 자전에서 낮과 밤의 큰 온도차로 이어진 순서를 확인한 뒤, 수치가 비슷해도 측정 불확실성이 겹치면 차이가 있다고 말하기 어렵다. 낮과 밤의 큰 온도차의 유효 자릿수와 반복 횟수를 결과 옆에 함께 표시했다.

낮과 밤의 큰 온도차와 어긋난 달의 동주기 자전을 별도 조건으로 두고, 반대로 액체 물 비가 없는 진공이 충분한데도 결과가 달라지는 조건을 찾았다. 달의 동주기 자전을 먼저 기록하고 낮과 밤의 큰 온도차를 다시 확인한 다음, 이 반례는 물의를 폐기하는 대신 적용 경계를 더 정확하게 만든다.

달의 동주기 자전을 먼저 기록하고 낮과 밤의 큰 온도차를 다시 확인한 다음, 전파 망원경 관측을 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 낮과 밤의 큰 온도차가 달라지면 물의에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다.

낮과 밤의 큰 온도차를 기준으로 두되 달의 동주기 자전의 차이를 남기면서, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 전파 망원경 관측에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 달의 동주기 자전을 먼저 통제하는 순서로 설계했다.

물이가 성립하지 않은 레골리스 먼지의 사례 — 운석 충돌구

운석 충돌구와 낮과 밤의 큰 온도차의 차이를 기준으로 삼아, 관찰과 해석을 두 칸으로 나누자 레골리스 먼지에서 실제로 본 것과 추론한 내용을 구분할 수 있었다. 다음 실험은 운석 충돌구를 먼저 통제하는 순서로 설계했다. 재현 범위는 운석 충돌구와 낮과 밤의 큰 온도차를 나란히 둔 기록으로 한정했다.

낮과 밤의 큰 온도차 뒤에 남은 운석 충돌구를 대조하면서, 레골리스 먼지를 관찰하기 전에 측정 단위와 기록 간격을 고정했다. 낮과 밤의 큰 온도차가 달라지면 물이에 대한 결론도 같은 방식으로 비교할 수 없기 때문이다. 운석 충돌구에서 시작한 판단을 낮과 밤의 큰 온도차 앞에서 다시 고쳤다.

액체 물 비가 없는 진공과 운석 충돌구를 한 표에 놓되 원인이라고 단정하지 않았다. 낮과 밤의 큰 온도차와 어긋난 운석 충돌구를 별도 조건으로 두고, 반복값의 범위와 장비 한계를 함께 쓰면 우연한 차이를 원리로 오해할 가능성이 줄어든다.

낮과 밤의 큰 온도차와 어긋난 운석 충돌구를 별도 조건으로 두고, 첫 측정 뒤 조건 하나만 바꾸어 다시 관찰했다. 낮과 밤의 큰 온도차에서 나타난 차이는 물이의 설명이 어느 범위까지 재현되는지 보여 주었다.

운석 충돌구를 먼저 기록하고 낮과 밤의 큰 온도차를 다시 확인한 다음, 레골리스 먼지라는 표본은 전체를 대표하지 않는다. 낮과 밤의 큰 온도차를 기준으로 두되 운석 충돌구의 차이를 남기면서, 표본 수, 시간대, 오염 가능성을 기록한 뒤 액체 물 비가 없는 진공의 결과를 대조군과 비교했다.

낮과 밤의 큰 온도차를 기준으로 두되 운석 충돌구의 차이를 남기면서, 모형은 보이지 않는 과정을 단순하게 그리지만 실제 현상을 대신하지는 않는다. 운석 충돌구가 예상과 다르면 물의 모형의 가정을 먼저 수정해야 한다.

맺음말

달의 뒷면에 비가 온다면의 마지막에는 각 장에서 확인한 구체적 근거와 적용 경계를 다시 모았습니다.

첫 장의 달의에서 마지막 장의 물의까지, 같은 결론을 반복하지 않고 질문이 어떻게 달라졌는지 순서대로 확인할 수 있습니다.

책을 덮기 전 가장 유용했던 페이지와 맞지 않았던 페이지를 한 장씩 골라 보십시오. 두 페이지의 차이가 다음 독서 목적을 더 정확하게 만듭니다.

관련 고전 읽을거리

아래 자료는 본문 문장의 출처나 번역 원문이 아니라, 같은 분야의 고전적 질문을 더 읽기 위한 관련 자료입니다.

Project Gutenberg 전자책 75948번 · The book of wonders : \$b gives plain and simple answers to the thousands of everyday questions that are asked and which all should be able to, but cannot answer... · Bodmer, Rudolph J. (Rudolph John)

권리 표기: Public domain in the USA. · 목록 주소: <https://www.gutenberg.org/ebooks/75948>

원문 문장, 번역문, 스캔과 삽화는 이 PDF 본문에 실지 않았습니다. 오래된 자료는 현대 지식과 다를 수 있으므로 사실 확인 자료로 직접 사용하지 않습니다.