

1 Изоморфизм

Определение 1.1. Изоморфизм - Пусть Σ - сигнатура, $\mathcal{A} = (A, I)$, $\mathcal{B} = (B, J)$ -

универсальные алгебры сигнатуры Σ , тогда изоморфизм между \mathcal{A} и \mathcal{B} - это $h : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ - биективная функция, которая удовлетворяет следующему условию:

$$h(I(f_i)(a_1, \dots, a_n)) = J(f_i)(h(a_1), \dots, h(a_n))$$

для любых a_1, \dots, a_n и $f_i \in \Sigma$

Пример 1.1. Пример изоморфизма: пусть $\Sigma = (f^{(2)})$, $\mathcal{A} = (\mathbb{R}, +)$, $\mathcal{B} = (\mathbb{R}, \cdot)$

Нужно доказать:

$$h(a_1 + a_2) = h(a_1) \cdot h(a_2)$$

$a_1, a_2 \in \mathbb{R}$

Пусть $h(x) = e^x$, тогда

$$h(a_1 + a_2) = e^{a_1 + a_2} = e^{a_1} \cdot e^{a_2} = h(a_1) \cdot h(a_2) \blacksquare$$

Теорема 1.1. h - изоморфизм между A и B , то h^{-1} - изоморфизм между B и A

Доказательство. пусть $b_1, \dots, b_{n_i} \in B$, тогда надо доказать

$$h^{-1}(J(f_i)(b_1, \dots, b_{n_i})) = I(f_i)(h^{-1}(b_1), \dots, h^{-1}(b_{n_i}))$$

Так как $b_1 = h(a_1), \dots, b_{n_i} = h(a_{n_i})$,

$$I(f_i)(h^{-1}(b_1), \dots, h^{-1}(b_{n_i})) = I(f_i)(h^{-1}(h(a_1)), \dots, h^{-1}(h(a_{n_i}))) = I(f_i)(a_1, \dots, a_{n_i})$$

По определению изоморфизма

$$h^{-1}(J(f_i)(b_1, \dots, b_{n_i})) = h^{-1}(h(I(f_i)(a_1, \dots, a_{n_i}))) = I(f_i)(a_1, \dots, a_{n_i})$$

Из этих двух равенств следует то, что надо доказать □

Определение 1.2. Системы, между которыми существует изоморфизм называют **изоморфными**

$$\mathcal{A} \simeq \mathcal{B}$$

операции в изоморфных системах обладают одними и теми же свойствами

Определение 1.3. $t(x_1, \dots, x_n)$ - терм t не содержит других переменных кроме x_1, \dots, x_n

Определение 1.4. Пусть \mathcal{A} - алгебра, a_1, \dots, a_n - элементы алгебры \mathcal{A} , тогда

$$t(a_1, \dots, a_n) = \sigma(t), \sigma(x_1) = a_1, \dots, \sigma(x_n) = a_n$$

Теорема 1.2. h - изоморфизм между $\mathcal{A} = (A, I)$ и $\mathcal{B} = (B, J)$, то для любого терма $t(x_1, \dots, x_n)$ и любых a_1, \dots, a_n выполняется

$$h(t^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_n)) = t^{\mathcal{B}}(h(a_1), \dots, h(a_n))$$

Доказательство. Индукция по построению терма t

1. $t = x$

$$t^{\mathcal{A}}(a) = a \Leftrightarrow h(t^{\mathcal{A}}(a)) = h(a) \Leftrightarrow t^{\mathcal{B}}(h(a)) = h(a)$$

2. $t = c$

$$\sigma(c) = I(c) = J(c) \Rightarrow t^{\mathcal{A}} = I(c), t^{\mathcal{B}} = J(c) \Rightarrow h(I(c)) = J(c)$$

по определению гомоморфизма

3. $t = f(t_1, \dots, t_k)$

$$\begin{aligned} h(t^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_n)) &= \\ h(I(f)(t_1^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_n), \dots, t_k^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_n))) &= \\ J(f)(h(t_1^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_n)), \dots, h(t_k^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_n))) &= \\ J(f)(t_1^{\mathcal{B}}(h(a_1), \dots, h(a_n)), \dots, t_k^{\mathcal{B}}(h(a_1), \dots, h(a_n))) &= \\ t^{\mathcal{B}}(h(a_1), \dots, h(a_n)) \end{aligned}$$

□

Пример 1.2. Доказать что $\mathcal{A} = (\mathbb{R}; \cdot) \not\cong \mathcal{B} = (\mathbb{R}^+; \cdot)$

Доказательство. Предположим что существует изоморфизм $h : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$, тогда

$$h(0) = x, x \in \mathbb{R}^+$$

$$x = h(0) = h(0 \cdot 0) = h(0) \cdot h(0) = x^2$$

$$x = x^2 \Rightarrow x = 1$$

$$h(1) = y, y \in \mathbb{R}^+$$

$$y = h(1) = h(1 \cdot 1) = h(1) \cdot h(1) = y^2$$

$$y = y^2 \Rightarrow y = 1$$

$h(0) = 1 = h(1)$ - противоречие (h не биективна). Утверждение не верно. \square

Пример 1.3. Доказать что $\mathcal{A} = (\mathbb{R}; +) \not\cong \mathcal{B} = (\mathbb{R}; \cdot)$

Доказательство. Предположим что существует изоморфизм $h : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$, тогда

$$h(0) = x, h(1) = y; x, y \in \mathbb{R}$$

$$x = h(0) = h(0 \cdot 0) = h(0) + h(0) = 2x \Rightarrow x = 2x = 0$$

$$y = h(1) = h(1 \cdot 1) = h(1) + h(1) = 2y \Rightarrow y = 2y = 0$$

Противоречие (h должно быть биекцией) \square

Пример 1.4. Доказать что $\mathcal{A} = (\mathbb{R}; \cdot) \cong \mathcal{B} = (\mathbb{C}; \cdot)$

Доказательство. Предположим что существует изоморфизм $h : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$, тогда

$$h(x) = -1; x \in \mathbb{C}, -1 \in \mathbb{R}$$

\square

Пример 1.5. Доказать что $\mathcal{A} = (\mathbb{Z}; \min^{(2)}) \not\cong \mathcal{B} = (\mathbb{Z}; \max^{(2)})$

Доказательство. \square

Пример 1.6. Доказать что $\mathcal{A} = (\omega; +) \not\cong \mathcal{B} = (\omega^+; \cdot)$

Доказательство. \square

Пример 1.7. Доказать что $\mathcal{A} = (\mathbb{Q}; +) \not\cong \mathcal{B} = (\mathbb{Q}^+; \cdot)$

Доказательство. \square

Пример 1.8. Доказать что $\mathcal{A} = (\mathbb{Z}; \cdot) \not\cong \mathcal{B} = (\mathbb{G}; \cdot)$

Доказательство. \square