

## 7. Übungsblatt zur Vorlesung Analysis I

Abgabe bis Freitag, 16.12.2022, 12 Uhr

### T Aufgabe 19

Überprüfen Sie, welche der rekursiv definierten Folgen konvergieren und bestimmen Sie gegebenenfalls ihren Grenzwert.

- a)  $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \frac{1 + a_n^2}{4} \quad (n \in \mathbb{N})$
- b)  $a_1 = 5, \quad a_{n+1} = \frac{1 + a_n^2}{4} \quad (n \in \mathbb{N}).$
- c)  $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \frac{a_n}{\sqrt{2 + a_n} + 2} \quad (n \in \mathbb{N}).$

### T Aufgabe 20

- a) Seien  $(a_n)$ ,  $(b_n)$  und  $(c_n)$  Folgen. Zeigen Sie:
- (i)  $(a_n)$  ist eine Teilfolge von  $(a_n)$ .
  - (ii) Ist  $(b_n)$  eine Teilfolge von  $(a_n)$  und  $(c_n)$  eine Teilfolge von  $(b_n)$ , so ist  $(c_n)$  eine Teilfolge von  $(a_n)$ .
  - (iii) Es existieren Folgen  $(a_n)$  und  $(b_n)$ , so dass  $(b_n)$  Teilfolge von  $(a_n)$  ist, aber  $(a_n)$  keine Teilfolge von  $(b_n)$  ist.
- b) Finden Sie zwei Folgen  $(a_n)$  und  $(b_n)$ , welche nicht identisch sind und für die gilt, dass  $(a_n)$  eine Teilfolge von  $(b_n)$  und  $(b_n)$  eine Teilfolge von  $(a_n)$  ist.

### T Aufgabe 21

Seien  $a \in (0, \infty)$  und  $b, c > 1$ . Zeigen Sie  $\log_c a = \frac{\log_b a}{\log_b c}$ .

### T Aufgabe 22

Babylonisches Wurzelziehen: Für ein  $x > 0$  sei die Folge  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  definiert durch

$$a_1 > 0, \quad a_{n+1} = \frac{1}{2} \left( a_n + \frac{x}{a_n} \right) \quad (n \in \mathbb{N}).$$

Zeigen Sie, dass die Folge  $(a_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}$  monoton ist sowie  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sqrt{x}$ .

### K Aufgabe 13 (6 Punkte)

- a) Zeigen Sie, dass die folgende rekursiv definierte Folge konvergiert und bestimmen Sie deren Grenzwert.

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}.$$

- b) Zu einer Folge  $(a_n)$  definiert man die Folge der *Cesàro-Mittel* durch

$$c_n := \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \quad \text{für } n \in \mathbb{N}.$$

- (i) Zeigen Sie: Konvergiert  $(a_n)$  gegen ein  $a \in \mathbb{R}$ , dann konvergiert auch  $(c_n)$  gegen  $a$ .  
(ii) Geben Sie eine divergente Folge  $(a_n)$  an deren Folge von Cesàro-Mitteln konvergiert. Beweisen Sie die Konvergenz.

### K Aufgabe 14 (6 Punkte)

- a) Sei  $(a_n)$  eine unbeschränkte Folge reeller Zahlen. Zeigen Sie, dass eine Teilfolge  $(b_n)$  von  $(a_n)$  existiert, so dass  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} = 0$  gilt.  
b) Sei  $(a_n)$  eine Folge mit der Eigenschaft, dass jede der Teilfolgen  $(a_{2k})$ ,  $(a_{2k+1})$  und  $(a_{3k})$  konvergiert. Zeigen Sie, dass dann auch  $(a_n)$  konvergiert. Zeigen Sie ferner, dass die Behauptung falsch ist, wenn nur die Teilfolgen  $(a_{2k})$ ,  $(a_{2k+1})$ , aber nicht  $(a_{3k})$  als konvergent angenommen werden.