

# Numerical Methods Equations

Illya Starikov

June 30, 2025

## 1 Taylor Series

$$f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \frac{f^{(3)}(a)}{3!}(x - a)^3 + \dots \quad (1)$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k. \quad (2)$$

## 2 Taylor Series of $e^x$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots \quad (3)$$

$$\frac{1}{e^{-x}} = \frac{1}{1 - x + \frac{x^2}{2} + \dots} \quad (4)$$

## 3 False Position

$$r = b - \frac{(b - a) \cdot f(b)}{f(b) - f(a)} \quad (5)$$

## 4 Newton's Method

$$x_{n+1} = x_n + \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad (6)$$

## 5 Secant Lines

$$x_3 = x_1 - \frac{(x_2 - x_1) \cdot f(x_1)}{f(x_2) - f(x_1)} \quad (7)$$

## 6 Modified Secant Method

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)\Delta}{f(x_1 + \Delta) - f(x_1)} \quad (8)$$