

INFORME ANUAL

Calidad del Aire

— Jalisco 2023 —

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial – SEMADET

Publicación: Octubre 2025

Paola Bauche Petersen
Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Karen de la Cabada Ruíz
Directora General de Calidad del Aire

Elizabeth Duran Chávez
Directora de Gestión de la Calidad del Aire

Nayeli Areli Pérez Padilla
Jefe de Centro Oficial de Medición

Beatríz Rodríguez Pérez
Coordinador Especializado

Ilse Regina Flores Reyes
Técnico de Escuadrón Verde

Contenido

Introducción 4

Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco 4

Evaluación de la calidad del aire 6

Panorama general de la calidad del aire en el AMG durante 2023 8

Horas del año según categoría de calidad del aire 9

Días con calidad del aire Buena o Aceptable por estación 10

Monóxido de carbono (CO) 12

Dióxido de azufre (SO_2) 17

Ozono (O_3) 21

Partículas suspendidas 26

PM_{10} 26

$PM_{2.5}$ 31

Hallazgos 2023 35

Bibliografía 36

Introducción

El Informe Anual de Calidad del Aire – Jalisco 2023 presenta un panorama de la calidad del aire registrada durante 2023 en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), con base en los datos generados por el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ) y validados por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).


En este informe se analizan los contaminantes criterio monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NO_2), ozono (O_3), partículas PM_{10} y partículas $PM_{2.5}$. Además, se presenta una evaluación de la calidad del aire basada en el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas y en el Índice Aire y Salud, así como un análisis del comportamiento de los principales contaminantes registrados en 2023.

El propósito de este informe es presentar de manera clara y accesible la información sobre la calidad del aire, identificar los principales contaminantes que afectaron al AMG durante el año y proporcionar elementos que apoyen la toma de decisiones para proteger la salud de la población.

Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ) es la red estatal encargada de medir de manera continua la calidad del aire. Su operación se concentra en el AMG, donde se concentra aproximadamente el 63% de la población del estado, por lo que constituye el principal ámbito de cobertura del SIMAJ. La Figura 1 muestra la ubicación de las estaciones de monitoreo que conforman la red.

Figura 1. Ubicación de las estaciones de monitoreo que conforman el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ) en el Área Metropolitana de Guadalajara.



Las estaciones del SIMAJ registran de manera continua los contaminantes criterio (CO, NO_2, SO_2, O_3, PM_{10} y $PM_{2.5}$), además de variables meteorológicas que ayudan a interpretar el comportamiento de la contaminación atmosférica. La información se actualiza cada hora y está disponible para consulta pública en el portal oficial www.aire.jalisco.gob.mx y en el Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA).

Durante 2023, la red operó con diez estaciones de monitoreo. La Tabla 1 muestra los contaminantes monitoreados en cada una de ellas.

Tabla 1. Contaminantes monitoreados en cada estación del SIMAJ.

Estación Abreviatura	Municipio	Inicio de operación	Contaminantes medidos
Águilas AGU	Zapopan	1993	**PM_{10}** **$PM_{2.5}$** **O_3** SO_2 NO_2 CO
Atemajac ATM	Zapopan	1993	PM_{10} $PM_{2.5}$ O_3 SO_2 NO_2 CO
Centro CEN	Guadalajara	1993	**PM_{10}** **$PM_{2.5}$** **O_3** **SO_2** NO_2 **CO**
Loma Dorada LDO	Tonalá	1993	**PM_{10}** **$PM_{2.5}$** **O_3** SO_2 NO_2 **CO**
Miravalle MIR	Guadalajara	1993	**PM_{10}** **$PM_{2.5}$** **O_3** **SO_2** NO_2 **CO**
Oblatos OBL	Guadalajara	1993	PM_{10} $PM_{2.5}$ O_3 SO_2 NO_2 CO
Pintas PIN	El Salto	2011	**PM_{10}** **$PM_{2.5}$** **O_3** **SO_2** NO_2 **CO**
Santa Fe SFE	Tlajomulco de Zúñiga	2013	**PM_{10}** **$PM_{2.5}$** **O_3** **SO_2** NO_2 CO
Tlaquepaque TLA	San Pedro Tlaquepaque	1993	**PM_{10}** **$PM_{2.5}$** **O_3** **SO_2** NO_2 CO
Vallarta VAL	Zapopan	1993	**PM_{10}** **$PM_{2.5}$** **O_3** **SO_2** NO_2 CO

Los recuadros en color indican los contaminantes que mide cada estación; en gris se señalan los contaminantes que la estación no mide.

Para garantizar información confiable y comparable a nivel nacional, el SIMAJ utiliza equipos, procedimientos y criterios de calidad conforme a las Normas Oficiales Mexicanas para cada contaminante: O_3 (NOM-036-SEMARNAT-1993), NO_2 (NOM-037-SEMARNAT-1993), CO (NOM-034-SEMARNAT-1993) y SO_2 (NOM-038-SEMARNAT-1993). La instalación, operación y validez de las redes también cumplen con la NOM-156-SEMARNAT-2012 y las especificaciones de los Manuales SINAICA.

Evaluación de la calidad del aire

La calidad del aire se evalúa mediante dos herramientas complementarias. La primera es el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), que permite determinar si las concentraciones de los contaminantes se mantienen dentro de los límites establecidos para proteger la salud. La segunda es el Índice Aire y Salud (IAS), establecido en la NOM-172-SEMARNAT-2023, que traduce esas concentraciones en categorías de riesgo fáciles de comprender para la población.

El cumplimiento normativo consiste en comparar las concentraciones registradas de cada contaminante con los valores establecidos en las NOM. Cuando estos límites son superados, se considera "fuera de norma", por lo que aumenta el riesgo de efectos adversos en la salud, especialmente para niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares. La Tabla 2 presenta los contaminantes evaluados y la NOM aplicable a cada uno.

Tabla 2. Relación de Contaminante Criterio con la Norma Oficial Mexicana aplicable.

Contaminante Criterio	Símbolo	Norma Oficial Mexicana
Ozono	O_3	NOM-020-SSA1-2021
Dióxido de Nitrógeno	NO_2	NOM-023-SSA1-2021
Monóxido de Carbono	CO	NOM-021-SSA1-2021
Dióxido de azufre	SO_2	NOM-022-SSA1-2019
Partículas (diámetro ≤ 10 µm)	PM_{10}	NOM-025-SSA1-2021
Partículas (diámetro ≤ 2.5 µm)	$PM_{2.5}$	NOM-025-SSA1-2021

Por otra parte, el IAS clasifica la calidad del aire en cinco categorías: Buena, Aceptable, Mala, Muy mala y Extremadamente mala. Cada categoría está representada por un color y se acompaña de recomendaciones para reducir la exposición cuando los niveles de contaminación representan un riesgo para la salud. La Tabla 3 muestra las categorías del Índice Aire y Salud y los niveles de riesgo asociados.

Tabla 3. Categorías, riesgo asociado para la salud y recomendaciones del Índice Aire y Salud.


Calidad del aire	Color	Riesgo asociado	Recomendaciones	
			Población general	Grupos sensibles
Buena	🟢	Bajo	Disfruta de las actividades al aire libre.	
Aceptable	🟡	Moderado	Disfruta de las actividades al aire libre.	Reduce las actividades físicas vigorosas al aire libre.
Mala	🟠	Alto	Reduce las actividades físicas vigorosas al aire libre.	Evita las actividades físicas al aire libre.
Muy Mala	🔴	Muy alto	Evita las actividades físicas al aire libre.	Limita estar al aire libre.
Extremadamente mala	🟣	Extremadamente alto	Permanece en interiores y evita cualquier esfuerzo físico al aire libre.	

Panorama general de la calidad del aire en el AMG durante 2023

Para presentar un panorama general de la calidad del aire en el AMG, se contabilizan los días en los que todos los contaminantes criterio medidos en la estación se mantuvieron dentro de las categorías Buena o Aceptable del Índice Aire y Salud.

Durante 2023 se registraron 56 días con calidad del aire Buena o Aceptable en el AMG, lo que representa 32 días menos que en 2022, equivalentes a una disminución aproximado de 36%. La Figura 2 muestra la evolución anual de este indicador entre 2018 y 2023. En este periodo, el mayor número de días con calidad del aire Buena o Aceptable se registró en 2021, con 120 días, mientras que 2019 presentó el valor más bajo, con 46 días.

Figura 2. Días con calidad del aire Buena o Aceptable en el AMG.




Horas del año según categoría de calidad del aire

Clasificación horaria por estación, según el Índice Aire y Salud dominante entre los seis contaminantes criterio (el contaminante que en cada hora presenta la categoría más desfavorable). Cada barra representa el porcentaje de horas del año que la estación registró en cada categoría; en gris se señalan las horas sin dato suficiente (D.I.), ya sea por falla de algún equipo. Más adelante el informe desglosa el comportamiento de cada contaminante por separado.

La Figura 3 muestra, para cada una de las 10 estaciones de la red, el porcentaje de horas del año clasificadas en cada categoría del Índice Aire y Salud. Entre las estaciones con datos suficientes durante 2023, AGU registró la mayor proporción de horas en categoría Buena o Aceptable (87% del año), mientras que PIN presentó la mayor proporción de horas en categoría Mala o peor (49% del año). Las estaciones ATM y OBL concentran una proporción alta de horas D.I., varias de ellas por haberse incorporado a la red a mediados de 2023. La última barra corresponde al AMG en conjunto, que en cada hora toma la categoría más desfavorable entre todas las estaciones: durante 2023, 33% de las horas fue Buena o Aceptable y 67% fue Mala o peor.

Figura 3. Porcentaje de horas del año según categoría del índice Aire y Salud, por estación.




Días con calidad del aire Buena o Aceptable por estación

Los mapas de la Figura 4 muestran, año por año, cuántos días tuvo cada estación de monitoreo con calidad del aire Buena o Aceptable según el Índice Aire y Salud (IAS). Cada burbuja está ubicada donde se encuentra la estación y su tamaño es proporcional a ese número de días: mientras más grande, más días con aire de buena o aceptable calidad. Un día se clasifica con la categoría del contaminante que resultó más desfavorable ese día. Así, los mapas permiten comparar tanto las zonas del AMG entre sí como la evolución de cada una de ellas entre 2018 y 2023, con la misma escala de tamaño en todos los años.

Las burbujas con borde punteado corresponden a estaciones que no alcanzaron el 75% de días con dato en el año (por ejemplo, las que iniciaron operaciones o estuvieron fuera de servicio), por lo que su total no cubre el año completo y no es comparable con el de las demás. Los puntos grises indican estaciones sin datos en ese año.

Figura 4. Días con calidad del aire Buena o Aceptable por estación, 2018–2023.




Mapa base: © colaboradores de OpenStreetMap

En 2023, entre las estaciones con datos suficientes, las que acumularon más días con calidad Buena o Aceptable fueron Águilas (AGU; 234 días), Centro (CEN; 199 días) y Miravalle (MIR; 162 días), mientras que Pintas (PIN) registró el menor número (100 días). Por su parte, Santa Fe (SFE) presenta datos parciales, pues no alcanzaron el 75% de días con dato del año, por lo que sus cifras no son comparables con las de las demás.

Monóxido de carbono (CO)

El CO es un gas incoloro, inodoro e insípido, altamente tóxico. Se produce principalmente por la combustión incompleta de combustibles fósiles, siendo las fuentes más importantes los vehículos automotores, los calefactores, las estufas y las quemas no controladas.Cuando se inhala, el CO interfiere con el transporte de oxígeno en la sangre, ya que se une a la hemoglobina con una afinidad mucho mayor que la del oxígeno. Esto puede provocar dolor de cabeza, mareos, fatiga, confusión y, en altas concentraciones, puede llegar a causar la muerte.Los grupos más vulnerables son las personas con enfermedades cardiovasculares, las mujeres embarazadas, los niños pequeños y los adultos mayores.


En el ambiente, el CO contribuye a la formación de ozono troposférico al reaccionar con otros contaminantes en presencia de la radiación solar, aunque por sí mismo no se acumula de manera significativa a largo plazo.



Comportamiento horario mensual de CO en el AMG

En el AMG, el CO no excede los límites de la NOM, con el número de días de buena, regular o mala calidad del aire. Asimismo, se observa la distribución horaria del CO por año para el AMG, donde se observa una mayor concentración en las primeras horas del día y a finales del día, coincidente con la actividad de movilidad que suele llevarse en la ciudad. En la Figura 5 se muestra una mayor concentración durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, coincidente con las festividades.


Figura 5. Concentración promedio horaria de CO en el AMG, encadenada por mes, 2023.



Distribución horaria mensual de CO en el AMG

La Figura 6 muestra, para cada mes de 2023, la distribución de las concentraciones horarias de CO en el AMG (promedio móvil de 8 horas; en cada hora se toma el valor más alto entre las estaciones). El contorno del violín indica qué tan frecuentes son los distintos valores; la caja abarca del primer al tercer cuartil, la línea blanca es la mediana y el punto blanco, la media. Solo se grafican los meses con al menos 75% de sus horas con dato. Sobre cada violín se indica la clave de la estación que registró el valor más alto de ese mes.

Figura 6. Distribución horaria mensual de CO (promedio móvil de 8 horas) en el AMG, 2023.




IQR: rango entre el percentil 25 y el percentil 75 de las concentraciones horarias del mes.

Días con calidad del aire Buena o Aceptable por estación de CO

Los mapas de la Figura 7 muestran, año por año, cuántos días tuvo cada estación de monitoreo con calidad del aire Buena o Aceptable según el Índice Aire y Salud (IAS), considerando únicamente el CO (máximo diario del promedio móvil de 8 horas). Cada burbuja está ubicada donde se encuentra la estación y su tamaño es proporcional a ese número de días: mientras más grande, más días con aire de buena o aceptable calidad. Así, los mapas permiten comparar tanto las zonas del AMG entre sí como la evolución de cada una de ellas entre 2018 y 2023, con la misma escala de tamaño en todos los años.

Las burbujas con borde punteado corresponden a estaciones que no alcanzaron el 75% de días con dato en el año (por ejemplo, las que iniciaron operaciones o estuvieron fuera de servicio), por lo que su total no cubre el año completo y no es comparable con el de las demás. Los puntos grises claros marcados con ¤ indican estaciones que no cuentan con el equipo para medir CO. Los puntos grises oscuros indican estaciones con el equipo, pero sin datos en ese año.

Figura 7. Días con calidad del aire Buena o Aceptable por estación de CO, 2018–2023.



Mapa base: © colaboradores de OpenStreetMap


En 2023, entre las estaciones con datos suficientes, las que acumularon más días con calidad Buena o Aceptable fueron Centro (CEN; 365 días), Loma Dorada (LDO; 362 días) y Miravalle (MIR; 315 días). Al comparar con 2022, de las una estaciones con datos suficientes en ambos años, una aumentó sus días con calidad Buena o Aceptable y ninguna los disminuyó. El mayor incremento se registró en Centro (CEN), con 53 días más. En el periodo 2018–2023, el valor más alto lo registró Centro (CEN) en 2023, con 365 días. Considerando únicamente las estaciones con datos suficientes en cada año, el promedio fue mayor en 2023 (347 días por estación) y menor en 2018 (308 días), aunque las estaciones con datos suficientes no fueron las mismas cada año.

Cabe señalar que, en todos los días con dato, el CO se mantuvo en categoría Buena o Aceptable: en ninguna estación se registraron días con categoría Mala o peor por este contaminante. Por lo tanto, las diferencias observadas entre estaciones reflejan

principalmente la disponibilidad de mediciones a lo largo del año, y no diferencias reales en la calidad del aire.

Dióxido de azufre (SO_2)


El dióxido de azufre es un gas incoloro con olor muy perceptible e irritante, originado por fuentes como quema de combustibles con azufre, tales como gasolina, combustóleo, diésel, carbón y otros agentes comburentes. Así como fuentes naturales que aportan SO_2, tales como erupciones volcánicas, decaimiento biológico e incendios forestales. Su fuente de emisión se forma durante la quema de combustibles que contienen azufre. Entre los efectos a la salud humana que este contaminante puede generar irritación en los ojos, nariz y garganta, y agravar los síntomas del asma y la bronquitis. La exposición prolongada al bióxido de azufre reduce el funcionamiento pulmonar y causa enfermedades respiratorias.



Comportamiento horario mensual de SO_2 en el AMG

Para cada hora del año se toma la concentración máxima de SO_2 entre las estaciones de la red, que representa al AMG, y se promedia por hora del día dentro de cada mes de 2023 (se exigen al menos 6 días con dato por hora, y se aplica una media móvil de 3 horas solo para suavizar la visualización). La Figura 8 encadena esos doce ciclos de 24 horas, uno por mes, en una sola línea continua.


Figura 8. Concentración promedio horaria de SO_2 en el AMG, encadenada por mes, 2023.



Distribución horaria mensual de SO_2 en el AMG

La Figura 9 muestra, para cada mes de 2023, la distribución de las concentraciones horarias de SO_2 en el AMG (valor horario; en cada hora se toma el valor más alto entre las estaciones). El contorno del violín indica qué tan frecuentes son los distintos valores; la caja abarca del primer al tercer cuartil, la línea blanca es la mediana y el punto blanco, la media. Solo se grafican los meses con al menos 75% de sus horas con dato. Sobre cada violín se indica la clave de la estación que registró el valor más alto de ese mes.

Figura 9. Distribución horaria mensual de SO_2 (valor horario) en el AMG, 2023.



IQR: rango entre el percentil 25 y el percentil 75 de las concentraciones horarias del mes.


La mediana horaria de SO_2 en el AMG alcanza su valor más alto en diciembre (0.011 ppm) y el más bajo en octubre (0.009 ppm). Enero, por su parte, presenta la mayor variabilidad entre horas, con la caja más ancha del año (0.005 ppm).

Días con calidad del aire Buena o Aceptable por estación de SO_2

Los mapas de la Figura 10 muestran, año por año, cuántos días tuvo cada estación de monitoreo con calidad del aire Buena o Aceptable según el Índice Aire y Salud (IAS), considerando únicamente el SO_2 (máximo horario del día). Cada burbuja está ubicada donde se encuentra la estación y su tamaño es proporcional a ese número de días: mientras más grande, más días con aire de buena o aceptable calidad. Así, los mapas permiten comparar tanto las zonas del AMG entre sí como la evolución de cada una de ellas entre 2018 y 2023, con la misma escala de tamaño en todos los años.

Las burbujas con borde punteado corresponden a estaciones que no alcanzaron el 75% de días con dato en el año (por ejemplo, las que iniciaron operaciones o estuvieron fuera de servicio), por lo que su total no cubre el año completo y no es comparable con el de las demás. Los puntos grises claros marcados con ¤ indican estaciones que no cuentan con el equipo para medir SO_2. Los puntos grises oscuros indican estaciones con el equipo, pero sin datos en ese año.

Figura 10. Días con calidad del aire Buena o Aceptable por estación de SO_2, 2018–2023.



Mapa base: © colaboradores de OpenStreetMap

En 2023, entre las estaciones con datos suficientes, las que acumularon más días con calidad Buena o Aceptable fueron Tlaquepaque (TLA; 358 días), Centro (CEN; 353 días) y Miravalle (MIR; 333 días). Por su parte, Pintas (PIN), Santa Fe (SFE) y Vallarta (VAL) presentan datos parciales, pues no alcanzaron el 75% de días con dato del año, por lo que sus cifras no son comparables con las de las demás (57 a 230 días).

Al comparar con 2022, de las una estaciones con datos suficientes en ambos años, una aumentó sus días con calidad Buena o Aceptable y ninguna los disminuyó. El mayor incremento se registró en Centro (CEN), con 48 días más.

En el periodo 2018–2023, el valor más alto lo registró Oblatos (OBL) en 2019, con 360 días. Considerando únicamente las estaciones con datos suficientes en cada año, el promedio fue mayor en 2023 (348 días por estación) y menor en 2021 (308 días), aunque las estaciones con datos suficientes no fueron las mismas cada año.


Ozono (O_3)

El ozono (O_3) en la capa más baja de la atmósfera, es un contaminante secundario que se forma por una complicada serie de reacciones químicas y fotoquímicas entre emisiones primarias antropogénicas y naturales de sus precursores los óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COV) o hidrocarburos (HC) en presencia de la radiación solar, aunado a las condiciones geográficas, climatológicas y meteorológicas favorables para la ocurrencia de estas reacciones. Y que presenta un desequilibrio en la composición del aire.

Las fuentes de emisión que genera el ozono ocurre naturalmente en la capa de ozono estratosférica (15 a 20 km snm). En la tropósfera, el ozono se forma cuando los COV y NOx, que vienen principalmente de emisiones vehiculares, reaccionan en presencia de la luz solar.

Este contaminante puede tener efectos a la salud humana como las reducciones en la función pulmonar, síntomas respiratorios como tos, flemas y sibilancias, y el agravamiento del asma. Esto debido a sus características oxidantes a corto plazo, podemos sufrir de irritación de los tejidos sensibles de ojos y vías respiratorias, mientras que, a largo plazo, podemos padecer de daños en los tejidos pulmonares, reducción en la capacidad funcional pulmonar y enfermedades como asma e inclusive cáncer. Y cuya exposición crónica a este contaminante está directamente relacionada con el aumento de la morbilidad y mortalidad (SEMADET, 2019).


Y lo que respecta al medio ambiente, este puede tener efectos en las plantas que son sensibles a sus altas concentraciones que generalmente producen clorosis (manchas amarillas en las partes verdes de una planta debido a la falta de actividad de sus cloroplastos) y necrosis (muerte de sus células de un tejido) en sus hojas. Su presencia también reduce la habilidad de las plantas de absorber dióxido de carbono (CO_2) alterando su crecimiento y variedad. Además de esto, el O_3 troposférico actúa como gas de efecto invernadero (GEI) atrapando el calor del sol y calentando la superficie de la tierra, lo que afecta directamente el clima de nuestro planeta (SEMADET, 2019). Además de efectos diversos a los materiales de los edificios.



Comportamiento horario mensual de O_3 en el AMG

Para cada hora del año se toma la concentración máxima de O_3 entre las estaciones de la red, que representa al AMG, y se promedia por hora del día dentro de cada mes (se exigen al menos 6 días con dato por hora y que el AMG tenga dato en al menos 75% de las horas del mes). En los meses con dato, la concentración promedio es mayor hacia las 14 h y menor hacia las 7 h, un patrón consistente con su formación fotoquímica, que requiere radiación solar y por eso se intensifica en las horas de mayor insolación. El mes con la concentración promedio más alta fue junio (0.055 ppm). El promedio horario más alto del AMG, 0.095 ppm en junio a las 13 h, ya rebasa el límite horario de la NOM (0.090 ppm).


Figura 11. Concentración promedio horaria de O_3 en el AMG, encadenada por mes, 2023.



Distribución horaria mensual de O_3 en el AMG

La Figura 12 muestra, para cada mes de 2023, la distribución de las concentraciones horarias de O_3 en el AMG (valor horario; en cada hora se toma el valor más alto entre las estaciones). El contorno del violín indica qué tan frecuentes son los distintos valores; la caja abarca del primer al tercer cuartil, la línea blanca es la mediana y el punto blanco, la media. Solo se grafican los meses con al menos 75% de sus horas con dato. Sobre cada violín se indica la clave de la estación que registró el valor más alto de ese mes.

Figura 12. Distribución horaria mensual de O_3 (valor horario) en el AMG, 2023.



IQR: rango entre el percentil 25 y el percentil 75 de las concentraciones horarias del mes.


La mediana horaria de O_3 en el AMG alcanza su valor más alto en junio (0.049 ppm) y el más bajo en diciembre (0.022 ppm). Junio, por su parte, presenta la mayor variabilidad entre horas, con la caja más ancha del año (0.033 ppm).

Días con calidad del aire Buena o Aceptable por estación de O_3

Los mapas de la Figura 13 muestran, año por año, cuántos días tuvo cada estación de monitoreo con calidad del aire Buena o Aceptable según el Índice Aire y Salud (IAS), considerando únicamente el O_3 (máximo horario del día). Cada burbuja está ubicada donde se encuentra la estación y su tamaño es proporcional a ese número de días: mientras más grande, más días con aire de buena o aceptable calidad. Así, los mapas permiten comparar tanto las zonas del AMG entre sí como la evolución de cada una de ellas entre 2018 y 2023, con la misma escala de tamaño en todos los años.

Las burbujas con borde punteado corresponden a estaciones que no alcanzaron el 75% de días con dato en el año (por ejemplo, las que iniciaron operaciones o estuvieron fuera de servicio), por lo que su total no cubre el año completo y no es comparable con el de las demás. Los puntos grises claros marcados con ¤ indican estaciones que no cuentan con el equipo para medir O_3. Los puntos grises oscuros indican estaciones con el equipo, pero sin datos en ese año.

Figura 13. Días con calidad del aire Buena o Aceptable por estación de O_3, 2018–2023.



Mapa base: © colaboradores de OpenStreetMap

En 2023, entre las estaciones con datos suficientes, las que acumularon más días con calidad Buena o Aceptable fueron Centro (CEN; 299 días), Pintas (PIN; 294 días) y Águilas (AGU; 277 días), mientras que Loma Dorada (LDO) registró el menor número (256 días). Por su parte, Miravalle (MIR), Santa Fe (SFE), Tlaquepaque (TLA) y Vallarta (VAL) presentan datos parciales, pues no alcanzaron el 75% de días con dato del año, por lo que sus cifras no son comparables con las de las demás (111 a 192 días).

Al comparar con 2022, de las dos estaciones con datos suficientes en ambos años, una aumentó sus días con calidad Buena o Aceptable y una los disminuyó. El mayor incremento se registró en Pintas (PIN), con 28 días más, y la mayor disminución en Centro (CEN), con 13 días menos.

En el periodo 2018–2023, el valor más alto lo registró Oblatos (OBL) en 2019, con 341 días. Considerando únicamente las estaciones con datos suficientes en cada año, el promedio fue

mayor en 2020 (299 días por estación) y menor en 2018 (280 días), aunque las estaciones con datos suficientes no fueron las mismas cada año. Pintas (PIN) fue la estación con menos días en tres de los seis años.

Partículas suspendidas

Las partículas suspendidas son partículas sólidas o líquidas microscópicas que se encuentran en el aire, estas flotan en diversas áreas, estas provienen de fuentes naturales como el polvo o el polen y por fuentes antropogénicas como los vehículos y las actividades de las industrias. Estas se originan debido a la desintegración de fragmentos de materia. Este tipo de partículas se clasifican por su tamaño: las gruesas (PM_{10}), las finas ($PM_{2.5}$) y las ultrafinas ($PM_{0.1}$), pero en el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ) solo se monitorean las PM_{10} y las $PM_{2.5}$.

Su composición puede ser de origen mineral u orgánico incluyendo metales, sulfatos, nitratos, carbón y compuestos orgánicos volátiles. El tiempo de permanencia de las partículas en suspensión se obtiene de diversos factores, la mayor parte de las partículas de diámetro superior a 10 µm se mantienen en el aire por medio de fuertes corrientes convectivas ascendentes o vientos de cierta velocidad mientras que las partículas más pequeñas tienen interacciones en procesos de coagulación por colisión con otro tipo de partículas y la relación de los factores meteorológicos como la temperatura o la humedad relativa pueden cambiar su comportamiento y su tamaño.

PM_{10}

El material particulado es una mezcla de sustancias en estado líquido o sólido, que permanece suspendida en la atmósfera por periodos variables de tiempo, que tiene muchas clasificaciones, las más comunes son por su origen y tamaño, estas pueden contener polvo, polen, hollín y sales.

Un cabello humano promedio tiene un diámetro de 50 a 70 µm, lo que hace a las partículas PM_{10} significativamente más pequeñas.


El tamaño de las partículas, tiene la capacidad de penetración y retención en las vías respiratorias, afectando a los pulmones siendo un factor importante para daños específicos a la salud, principalmente a la región de los alveolos, causando enfermedades de asma e infecciones de vías respiratorias (NOM-025-SSA1-2014 - Secretaría de Salud, 2014).

Los efectos hacia el medio ambiente de las partículas PM_{10} provocan un impacto negativo al medio ambiente, causando corrosión de materiales, degradación de bosques, disminución visual (INECC & SEMARNAT, 2011).

Comportamiento horario mensual de PM_{10} en el AMG

Para cada hora del año se toma la concentración máxima de PM_{10} entre las estaciones de la red, que representa al AMG, y se promedia por hora del día dentro de cada mes (se exigen al menos 6 días con dato por hora y que el AMG tenga dato en al menos 75% de las horas del mes). En los meses con dato, la concentración promedio es mayor hacia las 8 h y menor hacia las 15 h, un patrón que suele asociarse con la actividad vehicular y con la menor dispersión atmosférica de las primeras horas de la mañana y de la noche. El mes con la concentración promedio más alta fue enero (160 µg/m³). En ese mismo mes se registra el pico horario más alto del año (257 µg/m³ a las 8 h).


Figura 14. Concentración promedio horaria de PM_{10} en el AMG, encadenada por mes, 2023.



Distribución horaria mensual de PM_{10} en el AMG

La Figura 15 muestra, para cada mes de 2023, la distribución de las concentraciones horarias de PM_{10} en el AMG (promedio móvil de 24 horas; en cada hora se toma el valor más alto entre las estaciones). El contorno del violín indica qué tan frecuentes son los distintos valores; la caja abarca del primer al tercer cuartil, la línea blanca es la mediana y el punto blanco, la media. Solo se grafican los meses con al menos 75% de sus horas con dato. Sobre cada violín se indica la clave de la estación que registró el valor más alto de ese mes.

Figura 15. Distribución horaria mensual de PM_{10} (promedio móvil de 24 horas) en el AMG, 2023.



IQR: rango entre el percentil 25 y el percentil 75 de las concentraciones horarias del mes.


Las concentraciones de PM_{10} en el AMG alcanzan su punto más alto en enero, con una mediana de 159 µg/m³, y su punto más bajo en agosto, con 47 µg/m³. Enero también es el mes más variable: durante ese periodo, las concentraciones horarias fluctúan más que en cualquier otro mes del año (rango de 72 µg/m³).

Días con calidad del aire Buena o Aceptable por estación de PM_{10}

Los mapas de la Figura 16 muestran, año por año, cuántos días tuvo cada estación de monitoreo con calidad del aire Buena o Aceptable según el Índice Aire y Salud (IAS), considerando únicamente el PM_{10} (promedio diario de 24 horas). Cada burbuja está ubicada donde se encuentra la estación y su tamaño es proporcional a ese número de días: mientras más grande, más días con aire de buena o aceptable calidad. Así, los mapas permiten comparar tanto las zonas del AMG entre sí como la evolución de cada una de ellas entre 2018 y 2023, con la misma escala de tamaño en todos los años.

Las burbujas con borde punteado corresponden a estaciones que no alcanzaron el 75% de días con dato en el año (por ejemplo, las que iniciaron operaciones o estuvieron fuera de servicio), por lo que su total no cubre el año completo y no es comparable con el de las demás. Los puntos grises claros marcados con ¤ indican estaciones que no cuentan con el equipo para medir PM_{10}. Los puntos grises oscuros indican estaciones con el equipo, pero sin datos en ese año.

Figura 16. Días con calidad del aire Buena o Aceptable por estación de PM_{10}, 2018–2023.



Mapa base: © colaboradores de OpenStreetMap

En 2023, entre las estaciones con datos suficientes, Águilas (AGU; 259 días), Tlaquepaque (TLA; 165 días) y Miravalle (MIR; 142 días) fueron las que acumularon más días con calidad Buena o Aceptable, mientras que Pintas (PIN) registró el menor número (127 días). Por su parte, Centro (CEN), Santa Fe (SFE) y Vallarta (VAL) presentan datos parciales, pues no alcanzaron el 75% de días con dato del año, por lo que sus cifras no son comparables con las de las demás (12 a 171 días).

Respecto a 2022, de las tres estaciones con datos suficientes en ambos años, tres aumentaron sus días con calidad Buena o Aceptable y ninguna los disminuyó. El mayor incremento se dio en Miravalle (MIR, +24 días). En el periodo 2018–2023, el valor más alto lo registró Atemajac (ATM) en 2019, con 319 días. Considerando solo las estaciones con datos suficientes en cada año, el promedio fue mayor en 2019 (233 días) y menor en 2022 (158 días); cabe notar que Pintas (PIN) fue la estación con menos días en tres de los cuatro años.


$PM_{2.5}$

El material particulado con un diámetro de 2.5 micrómetros son partículas extremadamente finas que provienen de fuentes naturales y/o fuentes antropogénicas, estas partículas suelen ser conocidas también como partículas “respirables” debido a que pueden ser inhaladas profundamente en los pulmones, entrar al torrente sanguíneo e incluso al cerebro lo cual se puede asociar con enfermedades cardiovasculares, respiratorias, y muerte prematura. Sus fuentes antropogénicas son los automóviles, calentadores domésticos, termoeléctricas, etc., y sus fuentes naturales incluyen los incendios y la resuspensión del polvo. Las partículas pueden ser emitidas directamente de la fuente, o formarse en la atmósfera. Las partículas finas ($PM_{2.5}$) son la causa principal de visibilidad reducida (bruma), así como a través del viento se pueden transportar las partículas a través de largas distancias y luego, estas pueden instalarse en el suelo o el agua.

Comportamiento horario mensual de $PM_{2.5}$ en el AMG

Para cada hora del año se toma la concentración máxima de $PM_{2.5}$ entre las estaciones de la red, que representa al AMG, y se promedia por hora del día dentro de cada mes (se exigen al menos 6 días con dato por hora y que el AMG tenga dato en al menos 75% de las horas del mes). En los meses con dato, la concentración promedio es mayor hacia las 8 h y menor hacia las 13 h, un patrón que suele asociarse con la actividad vehicular y con la menor dispersión atmosférica de las primeras horas de la mañana y de la noche. El mes con la concentración promedio más alta fue febrero (81 µg/m³). En ese mismo mes se registra el pico horario más alto del año (139 µg/m³ a las 8 h).


Figura 17. Concentración promedio horaria de $PM_{2.5}$ en el AMG, encadenada por mes, 2023.



Distribución horaria mensual de $PM_{2.5}$ en el AMG

La Figura 18 muestra, para cada mes de 2023, la distribución de las concentraciones horarias de $PM_{2.5}$ en el AMG (promedio móvil de 24 horas; en cada hora se toma el valor más alto entre las estaciones). El contorno del violín indica qué tan frecuentes son los distintos valores; la caja abarca del primer al tercer cuartil, la línea blanca es la mediana y el punto blanco, la media. Solo se grafican los meses con al menos 75% de sus horas con dato. Sobre cada violín se indica la clave de la estación que registró el valor más alto de ese mes.

Figura 18. Distribución horaria mensual de $PM_{2.5}$ (promedio móvil de 24 horas) en el AMG, 2023.



IQR: rango entre el percentil 25 y el percentil 75 de las concentraciones horarias del mes.

La mediana horaria de $PM_{2.5}$ en el AMG alcanza su valor más alto en febrero (76 µg/m³) y el más bajo en julio (27 µg/m³). Noviembre, por su parte, presenta la mayor variabilidad entre horas, con la caja más ancha del año (29 µg/m³).


Días con calidad del aire Buena o Aceptable por estación de $PM_{2.5}$

Los mapas de la Figura 19 muestran, año por año, cuántos días tuvo cada estación de monitoreo con calidad del aire Buena o Aceptable según el Índice Aire y Salud (IAS), considerando únicamente el $PM_{2.5}$ (promedio diario de 24 horas). Cada burbuja está ubicada donde se encuentra la estación y su tamaño es proporcional a ese número de días: mientras más grande, más días con aire de buena o aceptable calidad. Así, los mapas permiten comparar tanto las zonas del AMG entre sí como la evolución de cada una de ellas entre 2018 y 2023, con la misma escala de tamaño en todos los años.

Las burbujas con borde punteado corresponden a estaciones que no alcanzaron el 75% de días con dato en el año (por ejemplo, las que iniciaron operaciones o estuvieron fuera de

servicio), por lo que su total no cubre el año completo y no es comparable con el de las demás. Los puntos grises claros marcados con ¤ indican estaciones que no cuentan con el equipo para medir $PM_{2.5}$. Los puntos grises oscuros indican estaciones con el equipo, pero sin datos en ese año.

Figura 19. Días con calidad del aire Buena o Aceptable por estación de $PM_{2.5}$, 2018–2023.



Mapa base: © colaboradores de OpenStreetMap

En 2023, entre las estaciones con datos suficientes, las que acumularon más días con calidad Buena o Aceptable fueron Águilas (AGU; 283 días), Miravalle (MIR; 177 días) y Centro (CEN; 152 días), mientras que Tlaquepaque (TLA) registró el menor número (102 días). Por su parte, Loma Dorada (LDO), Pintas (PIN), Santa Fe (SFE) y Vallarta (VAL) presentan datos parciales, pues no alcanzaron el 75% de días con dato del año, por lo que sus cifras no son comparables con las de las demás (37 a 92 días).

Al comparar con 2022, de las una estaciones con datos suficientes en ambos años, una aumentó sus días con calidad Buena o Aceptable y ninguna los disminuyó. El mayor incremento se registró en Miravalle (MIR), con 54 días más.

En el periodo 2018–2023, el valor más alto lo registró Águilas (AGU) en 2023, con 283 días.

Hallazgos 2023

Esta sección resume los principales hallazgos del informe 2023, integrando los resultados de calidad del aire, cumplimiento normativo y el comportamiento de cada contaminante a lo largo del año.

- El AMG registró 56 días con calidad del aire Buena o Aceptable durante 2023, 32 días menos que en 2022 (una disminución de 36%).
- A nivel horario, el AMG se mantuvo en categoría Buena o Aceptable el 33% de las horas de 2023, frente a un 67% en categoría Mala o peor.
- Entre las estaciones con datos suficientes en 2023, AGU presentó la mayor proporción de horas en categoría Buena o Aceptable (87%), mientras que PIN concentró la mayor proporción de horas en categoría Mala o peor (49%).
- PM_{10} registró su valor horario más alto del año en febrero, con 303 µg/m³, equivalente a 5.1 veces el límite de la NOM (24 horas).
- $PM_{2.5}$ registró su valor horario más alto del año en febrero, con 222 µg/m³, equivalente a 6.7 veces el límite de la NOM (24 horas).
- O_3 registró su valor horario más alto del año en junio, con 0.159 ppm, por encima del límite de la NOM (1 hora).
- CO registró su valor horario más alto del año en diciembre, con 6.9 ppm, dentro del límite de la NOM (8 horas).

Bibliografía

- Congreso del Estado de Jalisco. (2009, 26 de diciembre). Decreto N° 23021/LVIII/09 que aprueba la declaratoria del Área Metropolitana de Guadalajara [Decreto]. Periódico Oficial del Estado de Jalisco. Recuperado de https://congresoweb.congresojal.gob.mx/Servicios/sistemas/SIP/decretossip/decretos/Decretos%20LVIII/Decreto%2023021.pdf.
- Congreso del Estado de Jalisco. (2015). Decreto N° 25400/LX/2015 — Reforma al artículo único del Decreto 23021 que aprueba la declaratoria del Área Metropolitana de Guadalajara [Decreto]. Periódico Oficial del Estado de Jalisco. Recuperado de https://congresoweb.congresojal.gob.mx/Servicios/sistemas/SIP/decretossip/decretos/Decretos%20LX/Decreto%2025400.pdf.
- Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG). (2022). Análisis general del Área Metropolitana de Guadalajara (2020). Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco. Recuperado de https://iieg.gob.mx/ns/wp-content/uploads/2022/03/An%C3%A1lisis-General-del-%C3%81rea-Metropolitana-de-Guadalajara-2020.pdf
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2021, 26 de enero). En Jalisco somos 8 348 151 habitantes: Censo de Población y Vivienda 2020 (Comunicado). INEGI. Recuperado de https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ResultCenso2020_Jal.pdf
- Comisión Ambiental / Gobierno de México. (s. f.). IMECA: Índice Metropolitano de la Calidad del Aire. Recuperado de https://www.gob.mx/comisionambiental/articulos/imeca-indice-metropolitano-de-la-calidad-del-aire?idiom=es
- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). (2019). NOM-172-SEMARNAT-2019. Lineamientos para la obtención y comunicación del Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud [Norma]. Diario Oficial de la Federación. Recuperado de https://aire.nl.gob.mx/docs/normatividad/NOM-172-SEMARNAT-2019.pdf
- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). (2023). NOM-172-SEMARNAT-2023. Lineamientos para la obtención y comunicación del Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud [Norma actualizada]. Recuperado de https://sinaica.inecc.gob.mx/archivo/noms/NOM-172-SEMARNAT-2023-Indice-AIRE-y-SALUD.pdf
- Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA) / Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). (s. f.). ¿Cómo está construido y cómo funciona el Índice AIRE y SALUD? Recuperado de https://sinaica.inecc.gob.mx/
- INECC / SINAICA. (2021). Informe Nacional de la Calidad del Aire, México 2021 (ejemplo de uso del IAS en informes nacionales). Recuperado de https://sinaica.inecc.gob.mx/archivo/informes/Informe2021.pdf
- Comisión Ambiental de la Megalópolis. (2020, 28 de mayo). Índice Aire y Salud: características y aplicación [Documento informativo]. Gobierno de México. Recuperado de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/554425/comunicado_indice_calidad_aire_05_2020_FINAL_v3.pdf
- DOF - Diario Oficial de la Federación. (2021). Dof.Gob.Mx. https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5634084