

표 9. 품종별 저장성 비교(계속)

품종명	저장방법	저장 기간 (일)	당도 (°Brix)	산도 (%)	경도 (N/11mmØ)	
홍소	상온	0	12.4	0.16	92.0	
		7	12.7	0.09	87.1	
		14	13.5	0.07	82.4	
		21	13.6	0.06	85.1	
	저온	0	12.4	0.16	92.0	
		15	13.5	0.07	95.5	
		30	13.3	0.07	97.0	
		45	13.6	0.04	85.5	
	황옥	상온	0	15.2	0.29	82.2
			7	15.0	0.27	83.9
14			14.8	0.17	81.0	
21			15.3	0.17	70.0	
저온		0	15.2	0.29	82.2	
		15	15.3	0.26	89.2	
		30	14.9	0.25	83.7	
		45	15.1	0.13	84.7	
피크닉		상온	0	15.5	0.19	93.9
			7	15.8	0.19	68.1
	14		17.1	0.17	50.5	
	21		16.8	0.16	43.2	
	저온	0	15.5	0.19	93.9	
		15	15.5	0.14	102.5	
		30	17.0	0.21	84.9	
		45	16.7	0.15	88.0	

‘홍소’, ‘황옥’, ‘피크닉’은 저장 기간 동안 당도는 비슷하거나 증가하는 경향이었고 산도와 경도는 감소하는 경향이었다. ‘홍소’는 저온 45일부터 경도가 급격하게 감소하였다. ‘황옥’은 상온 21일부터 경도가 감소하는 경향이었지만 저온에서는 45일까지 경도의 감소가 없었다(표 9).