

Lösungshinweise zur 3. Hausaufgabe

Differential- und Integralrechnung für Informatiker

(H 4)

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} (3n^3 + 2n + 5) \ln \left(1 + \frac{1}{n^3 - 2n + 2} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left(1 + \frac{1}{n^3 - 2n + 2} \right)^{3n^3 + 2n + 5}$. Aus

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^3 - 2n + 2} \right)^{3n^3 + 2n + 5} = \left(\left(1 + \frac{1}{n^3 - 2n + 2} \right)^{n^3 - 2n + 2} \right)^{\frac{3n^3 + 2n + 5}{n^3 - 2n + 2}} = e^3$$

folgt, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} (3n^3 + 2n + 5) \ln \left(1 + \frac{1}{n^3 - 2n + 2} \right) = 3$ ist.

b) Da $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n}} = 0$ ist, impliziert die Aussage 1° der Folgerung **F12** aus der 3. Vorlesung, dass auch

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{\sqrt[3]{2}} + \frac{1}{\sqrt[3]{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt[3]{n}}}{n} = 0$$

ist.

c) Da die Folge $(\cos(\sqrt{n}))_{n \in \mathbb{N}^*}$ beschränkt ist, folgt aus b) mittels der Folgerung **F6** aus der 3. Vorlesung, dass

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{\sqrt[3]{2}} + \frac{1}{\sqrt[3]{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt[3]{n}}}{n} \cos(\sqrt{n}) = 0$$

ist.

d) Für $n \in \mathbb{N}$ seien $a_n = x_0 + 2^1 x_1 + 2^2 x_2 + \cdots + 2^n x_n$ und $b_n = 2^{n+1}$. Die Folge $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ist streng wachsend und hat den Grenzwert ∞ . Aus

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} x_{n+1}}{2^{n+2} - 2^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = x$$

schließen wir, anhand des Stolz-Cesàro Theorems, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = x$ ist.

(H 5)

a) Wir beweisen durch Induktion, dass die Aussage

$$P(n) = „5^n < (n+3)!“$$

für alle $n \in \mathbb{N}^*$ wahr ist.

I. $P(1) = „5 < 4!“$ ist wahr.

II. Wir nehmen an, dass $P(k)$, für $k \in \mathbb{N}^*$, wahr ist und zeigen, dass auch $P(k+1)$ wahr ist. Wir wissen, dass $5^k < (k+3)!$ ist. Hieraus folgt $5^{k+1} < 5(k+3)!$. Da $5 \leq k+4$ ist, erhält man $5(k+3)! \leq (k+4)!$. Somit ist $5^k < (k+4)!$, also ist $P(k+1)$ wahr.

Aus I und II folgt nun a).

b) Wegen a) gilt

$$\frac{4^n}{(n+3)!} < \frac{4^n}{5^n}, \forall n \in \mathbb{N}^*,$$

also

$$0 < \frac{4^n}{(n+3)!} < \left(\frac{4}{5}\right)^n, \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Das Sandwich-Theorem impliziert nun, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4^n}{(n+3)!} = 0$ ist.

(H 6)

a) Wir beweisen durch Induktion, dass die Aussage

$$P(n) = „x_n \in [1, 2]“$$

für alle $n \in \mathbb{N}^*$ wahr ist.

I. $P(1) = „x_1 \in [1, 2]“$ ist wahr (anhand der Voraussetzung).

II. Wir nehmen an, dass $P(k)$, für $k \in \mathbb{N}^*$, wahr ist und zeigen, dass auch $P(k+1)$ wahr ist. Also wissen wir, dass $x_k \in [1, 2]$ ist. Aus

$$1 \leq x_{k+1} \Leftrightarrow 1 \leq x_k^2 - 2x_k + 2 \Leftrightarrow 0 \leq (x_k - 1)^2$$

und

$$x_{k+1} < 2 \Leftrightarrow x_k^2 - 2x_k + 2 < 2 \Leftrightarrow x_k(x_k - 2) < 0$$

folgt, dass $x_{k+1} \in [1, 2]$ ist. Somit ist gezeigt, dass $P(k+1)$ wahr ist.

Aus I und II folgt nun a).

b) Die Aussage a) verwendend, erhält man für alle $n \in \mathbb{N}^*$

$$x_{n+1} - x_n = x_n^2 - 3x_n + 2 = (x_n - 2)(x_n - 1) \leq 0,$$

also ist die Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ fallend.

c) Aus a) und b) schließen wir, dass die Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ beschränkt und monoton, also konvergent ist. Wir bezeichnen mit $x \in \mathbb{R}$ ihren Grenzwert. Dann ist

$$x = x^2 - 2x + 2 \Leftrightarrow (x - 1)(x - 2) = 0.$$

Da $x_n \leq x_1 = a < 2$, für alle $n \in \mathbb{N}^*$ ist, folgt, dass $x \neq 2$, also ist $x = 1$.