

# Review

- 三重积分化累次积分

(先一后二)

$$\Omega: \begin{cases} (x, y) \in D_{xy}, \\ z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y), \end{cases}$$

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iint_{D_{xy}} dx dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz.$$

(先二后一)

$$\Omega: \begin{cases} c \leq z \leq d, \\ (x, y) \in \Omega_z, \end{cases}$$

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \int_c^d dz \iint_{\Omega_z} f(x, y, z) dx dy.$$

• 投影法确定积分区域

## ●三重积分的变量替换

$$u = u(x, y, z), v = v(x, y, z), w = w(x, y, z)$$

$$(x, y, z) \in \Omega \leftrightarrow (u, v, w) \in \Omega^*.$$

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$$

$$= \iiint_{\Omega^*} f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w))$$

$$\cdot \left| \det \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| du dv dw.$$

## § 5. 重积分的应用

- 曲面面积
- 质心
- 转动惯量
- 万有引力

原则：微元法

# 1. 曲面的面积

设曲面 $S$ 的参数方程为

$$x = x(u, v), y = y(u, v), z = z(u, v), (u, v) \in D,$$

简记为


$$S : \mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v), (u, v) \in D.$$

在 $ouv$ 平面上,用平行于坐标轴的直线

$$u = u_i (i = 1, 2, \cdots, n), v = v_j (j = 1, 2, \cdots, m)$$

将区域 $D$ 分割成若干小矩形 $D_{ij}$ .





$D_{ij}$ 的顶点为 $(u_i, v_j), (u_{i+1}, v_j), (u_i, v_{j+1}), (u_{i+1}, v_{j+1})$ .

对应地,空间曲边四边形 $S_{ij}$ 的四个顶点为

$$P_{ij}(x(u_i, v_j), y(u_i, v_j), z(u_i, v_j)),$$

$$P_{i+1,j}(x(u_{i+1}, v_j), y(u_{i+1}, v_j), z(u_{i+1}, v_j)),$$

$$P_{i,j+1}(x(u_i, v_{j+1}), y(u_i, v_{j+1}), z(u_i, v_{j+1})),$$

$$P_{i+1,j+1}(x(u_{i+1}, v_{j+1}), y(u_{i+1}, v_{j+1}), z(u_{i+1}, v_{j+1})).$$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{P_{ij}P_{i+1,j}} &\approx (x'_u(u_i, v_j), y'_u(u_i, v_j), z'_u(u_i, v_j))\Delta u_i \\ &= \mathbf{r}'_u(u_i, v_j)\Delta u_i\end{aligned}$$

$$\overrightarrow{P_{ij}P_{i,j+1}} \approx \mathbf{r}'_v(u_i, v_j) \Delta v_j.$$

当分划很细时,空间曲面 $S_{ij}$ 可近似地看成以线段

$P_{ij}P_{i+1,j}, P_{ij}P_{i,j+1}$ 为邻边的平行四边形, 其面积

$$\Delta S_{ij} \approx \left\| \mathbf{r}'_u(u_i, v_j) \times \mathbf{r}'_v(u_i, v_j) \right\| \Delta u_i \Delta v_j$$

$$= \left\| \det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x'_u & y'_u & z'_u \\ x'_v & y'_v & z'_v \end{pmatrix} \right\|_{(u_i, v_j)} \Delta u_i \Delta v_j$$



即  $\Delta S_{ij} \approx \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \Delta u_i \Delta v_j$ , 其中

$$A = \det \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} \bigg|_{(u_i, v_j)}, \quad B = \det \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} \bigg|_{(u_i, v_j)},$$

$$C = \det \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \bigg|_{(u_i, v_j)}.$$

• 曲面  $S : \vec{r} = \vec{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$ ,  
 $(u, v) \in D$ , 的面积为

$$\iint_D \|\vec{r}'_u \times \vec{r}'_v\| \, du dv = \iint_D \sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \, du dv.$$

•若曲面 $S$ 的方程为 $z = f(x, y), (x, y) \in D$ , 则

$$S: x = x, y = y, z = f(x, y), (x, y) \in D.$$

$$\mathbf{r}'_x \times \mathbf{r}'_y = \det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & f'_x \\ 0 & 1 & f'_y \end{pmatrix} = (-f'_x, -f'_y, 1)$$

$$A = \det \begin{pmatrix} 0 & f'_x \\ 1 & f'_y \end{pmatrix} = -f'_x, B = -f'_y, C = 1.$$

曲面 $S$ 的面积为 $\iint_D \sqrt{1 + f'^2_x + f'^2_y} \, dx dy$ .

例: 求球面  $S: x^2 + y^2 + z^2 = R^2$  的面积.

解: 球面  $S$  的参数方程为

$$x = R \sin \varphi \cos \theta, y = R \sin \varphi \sin \theta, z = R \cos \varphi, \\ (0 \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi).$$

则

$$\begin{aligned} \vec{r}'_{\varphi} \times \vec{r}'_{\theta} &= \det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ R \cos \varphi \cos \theta & R \cos \varphi \sin \theta & -R \sin \varphi \\ -R \sin \varphi \sin \theta & R \sin \varphi \cos \theta & 0 \end{pmatrix} \\ &= (R^2 \sin^2 \varphi \cos \theta, R^2 \sin^2 \varphi \sin \theta, R^2 \sin \varphi \cos \varphi) \\ \|\vec{r}'_{\varphi} \times \vec{r}'_{\theta}\| &= R^2 \sin \varphi, \end{aligned}$$

球面 $S$ 的面积为

$$\iint_{\substack{0 \leq \varphi \leq \pi \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi}} \|\vec{r}'_{\varphi} \times \vec{r}'_{\theta}\| d\varphi d\theta$$

$$= \iint_{\substack{0 \leq \varphi \leq \pi \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi}} R^2 \sin \varphi d\varphi d\theta$$

$$= R^2 \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi \int_0^{2\pi} d\theta = 4\pi R^2 \square$$

## 2. 物体的质心

• 平板 $D$ 的质心 $(\bar{x}, \bar{y})$


平板密度 $\mu(x, y)$

平板质量 $M = \iint_D \mu(x, y) dx dy$

平板关于 $x$ 轴的静力矩为 $M\bar{y} = \iint_D y\mu(x, y) dx dy$

故  $\bar{y} = \frac{\iint_D y\mu(x, y) dx dy}{\iint_D \mu(x, y) dx dy}$ , 同理  $\bar{x} = \frac{\iint_D x\mu(x, y) dx dy}{\iint_D \mu(x, y) dx dy}$ .

关于 $x$ 轴的力矩微元为  
 $y\mu(x, y) dx dy$





• 空间物体 $\Omega$ 的质心 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$

密度 $\mu(x, y, z)$ , 质量 $M = \iiint_{\Omega} \mu(x, y, z) dx dy dz$

$\Omega$ 关于 $yz$ 平面的静力矩为

$$M\bar{x} = \iiint_{\Omega} x\mu(x, y, z) dx dy dz$$

故

$$\bar{x} = \frac{\iiint_{\Omega} x\mu(x, y, z) dx dy dz}{\iiint_{\Omega} \mu(x, y, z) dx dy dz},$$

$$\bar{y} = \frac{\iiint_{\Omega} y\mu(x, y, z) dx dy dz}{\iiint_{\Omega} \mu(x, y, z) dx dy dz}, \bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z\mu(x, y, z) dx dy dz}{\iiint_{\Omega} \mu(x, y, z) dx dy dz}.$$

### 3. 转动惯量

- 位于 $(x, y, z)$ 处质量为 $m$ 的质点, 绕 $x, y, z$ 轴的转动惯量分别为 $m(y^2 + z^2), m(z^2 + x^2), m(x^2 + y^2)$ .
- $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ , 密度 $\rho(x, y, z)$ , 绕坐标轴的转动惯量为


$$J_x = \iiint_{\Omega} (y^2 + z^2) \rho(x, y, z) dx dy dz$$

$$J_y = \iiint_{\Omega} (z^2 + x^2) \rho(x, y, z) dx dy dz,$$

$$J_z = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) \rho(x, y, z) dx dy dz.$$

**Question.** 直线  $l$  过点  $(x_0, y_0, z_0)$  沿方向  $(a, b, c)$ ,  $\Omega$  绕  $l$  的转动惯量?

$$\iiint_{\Omega} d^2(x, y, z) \rho(x, y, z) dx dy dz.$$



其中,  $d(x, y, z)$

$$= \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \left\| \det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a & b & c \\ x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \end{pmatrix} \right\|.$$

## 4. 万有引力

- 位于  $P(x, y, z), P_0(x_0, y_0, z_0)$  的两质点, 质量分别为  $m, m_0$ . 记  $r = \|PP_0\|$ ,  $\overrightarrow{P_0P}$  与  $x, y, z$  正半轴夹角为  $\alpha, \beta, \gamma$ ,  $m$  对  $m_0$  的万有引力的大小为  $\frac{kmm_0}{r^2}$ , 引力沿  $x, y, z$  轴的分

量分别为

$$F_x = \frac{kmm_0}{r^2} \cos \alpha = \frac{kmm_0(x - x_0)}{r^3},$$

$$F_y = \frac{kmm_0}{r^2} \cos \beta = \frac{kmm_0(y - y_0)}{r^3},$$

$$F_z = \frac{kmm_0}{r^2} \cos \gamma = \frac{kmm_0(z - z_0)}{r^3}.$$



- 密度为 $\rho(x, y, z)$ 的物体 $\Omega$ 对 $P_0(x_0, y_0, z_0) \notin \Omega$ 处质量为 $m_0$ 的质点的万有引力:

$$F_x = \iiint_{\Omega} \frac{km_0(x-x_0)\rho(x, y, z)dxdydz}{\left(\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2}\right)^3},$$

$$F_y = \iiint_{\Omega} \frac{km_0(y-y_0)\rho(x, y, z)dxdydz}{\left(\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2}\right)^3},$$

$$F_z = \iiint_{\Omega} \frac{km_0(z-z_0)\rho(x, y, z)dxdydz}{\left(\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2}\right)^3},$$



例: 半径为 $R$ , 质量为 $M$ 的均匀球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$   
对点 $P(0, 0, a)$  ( $a > R$ )处质量为 $m$ 的质点的引力.

解:  $F_x = \iiint_{\Omega} \frac{kmx\rho dx dy dz}{\left(\sqrt{x^2 + y^2 + (a-z)^2}\right)^3} = 0, F_y = 0.$

$$-F_z = \iiint_{\Omega} \frac{km(a-z)\rho dx dy dz}{\left(\sqrt{x^2 + y^2 + (a-z)^2}\right)^3}, \quad \frac{4}{3}\pi R^3 \rho = M.$$

在柱坐标系 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z$ 下,

$$-F_z = \int_{-R}^R dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{R^2 - z^2}} \frac{km(a-z)\rho r dr}{(\sqrt{r^2 + (a-z)^2})^3}$$

$$\begin{aligned}
 -F_z &= \int_{-R}^R dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{R^2 - z^2}} \frac{km(a-z)\rho r dr}{(\sqrt{r^2 + (a-z)^2})^3} \\
 &= k\pi m\rho \int_{-R}^R (a-z) dz \int_0^{\sqrt{R^2 - z^2}} \frac{dr^2}{(\sqrt{r^2 + (a-z)^2})^3} \\
 &= 2k\pi m\rho \int_{-R}^R \left( 1 - \frac{a-z}{\sqrt{R^2 + a^2 - 2az}} \right) dz \\
 &= \frac{4k\pi m\rho R^3}{3a^2} = \frac{kMm}{a^2}. \quad \square
 \end{aligned}$$

(分部积分)

**Question.** 密度分别为 $\rho_1(x, y, z), \rho_2(x, y, z)$ 的  
两物体 $\Omega_1, \Omega_2$ 之间的万有引力？

**作业：习题3.5 No. 1 (3), 8**