

习题课 2 解答

1. 解:

问题一:

根据”父母”代的不同基因型用全概率公式分别计算:

$$P(\text{子一代 } AA \text{ 型}) = (u + v)^2; P(\text{子一代 } aa \text{ 型}) = (w + v)^2 \quad (\text{可用对称性});$$

$$P(\text{子一代 } Aa \text{ 型}) = 2(u + v)(w + v)。$$

若记 $\alpha = u + v; \beta = w + v$, 则子一代中, 这三种基因型式的比例为 $\alpha^2 : 2\alpha\beta : \beta^2$ 。

重复上面的过程计算: 可得子二代中, 这三种基因型式的比例也为 $\alpha^2 : 2\alpha\beta : \beta^2$ 。即从第二代开始, 三种基因型式的比例不变。这就是著名的 Hardy-Weinberg 平衡原理。

问题二:

$$(a) P(\text{带菌者} | \text{成人}) = \frac{P(Aa)}{P(AA \cup Aa)} = \frac{2}{3};$$

$$(b) P(\text{子 } AA) = \frac{2}{3} - \frac{p}{3}; P(\text{子 } Aa) = \frac{1}{3} + \frac{p}{6}; P(\text{子 } aa) = \frac{p}{6}。$$

2. 解: 记

$U_i = \{ \text{随机选取得一只盒子为第 } i \text{ 号盒} \},$

$R_m = \{ \text{取到的前 } m \text{ 只球均为白球} \},$

$R = \{ \text{取到的第 } m+1 \text{ 只球是白球} \},$ 问题要求的概率为 $P(R | R_m)$ 。

由于 R_m 和 R 关于 U_i 是条件独立的, 即选定第 i 号盒 U_i 的条件下, R_m 和 R 是相互独立的, 故

$$P(R | R_m U_i) = P(R | U_i) = \frac{i}{n}$$

于是由全概率公式得

$$P(R | R_m) = \sum_{i=0}^n P(R | R_m U_i) P(U_i | R_m)$$

而 $P(U_i | R_m)$ 可以由 Bayes 公式获得, 即

$$P(U_i | R_m) = \frac{P(R_m | U_i) P(U_i)}{\sum_{j=0}^n P(R_m | U_j) P(U_j)} = \frac{\left(\frac{i}{n}\right)^m \frac{1}{n+1}}{\sum_{j=0}^n \left(\frac{j}{n}\right)^m \frac{1}{n+1}} = \frac{\left(\frac{i}{n}\right)^m}{\sum_{j=0}^n \left(\frac{j}{n}\right)^m}$$

因此,

$$P(R | R_m) = \sum_{i=0}^n \frac{i}{n} \frac{\left(\frac{i}{n}\right)^m}{\sum_{j=1}^n \left(\frac{j}{n}\right)^m} = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n}\right)^{m+1}}{\sum_{j=1}^n \left(\frac{j}{n}\right)^m}$$

$$\text{注: } P(R | R_m) = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n}\right)^{m+1}}{\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \left(\frac{j}{n}\right)^m} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^1 x^{m+1} dx}{\int_0^1 x^m dx} = \frac{m+1}{m+2}$$

3.

解法一（利用二项分布）：

在 m 次失败之前取得 n 次成功当且仅当前 $m+n-1$ 次试验中至少成功 n 次。

因为如果在前 $m+n-1$ 次试验中至少成功 n 次，则在前 $m+n-1$ 次试验中至多失败 $m-1$ 次，于是 n 次成功发生在 m 次失败之前；

另一方面，如果在前 $m+n-1$ 次试验中成功的次数少于 n 次，则在前 $m+n-1$ 次试验中失败次数至少为 m 次，这样就不可能在 m 次失败之前取得 n 次成功。所以，

$$p = P(X \geq n) = \sum_{k=n}^{n+m-1} C_{n+m-1}^k p^k q^{n+m-1-k}.$$

解法二（利用负二项分布（Pascal 分布））：

（直到第 r 次试验成功时，试验所需要的次数 Y 的分布是

$$P(Y = n) = C_{n-1}^{r-1} p^r q^{n-r}, n = r, r+1, \dots$$

在 m 次失败之前取得 n 次成功，试验最多进行 $m+n-1$ 次； n 次成功发生在 m 次失败之前，进行试验的次数可能是 $n, n+1, \dots, n+m-1$ 。故所求概率为

$$p = P(Y \leq n+m-1) = \sum_{k=n}^{n+m-1} C_{k-1}^{n-1} p^n q^{k-n}$$

4. 解：

不放回情形：直接用古典概型（多元超几何分布）

$$P(X_m = M) = \frac{C_{M-1}^{m-1} C_1^1 C_{N-M}^{m-m}}{C_N^n}$$

放回情形：

$$P(X_m = M) = P(X_m \leq M) - P(X_m \leq M-1)$$

由于

$$P(X_m \leq M) = \sum_{k=m}^n C_n^k \frac{M^k (N-M)^{n-k}}{N^n}$$

所以

$$P(X_m = M) = P(X_m \leq M) - P(X_m \leq M-1) \\ \sum_{k=m}^n C_n^k \frac{M^k (N-M)^{n-k}}{N^n} - \sum_{k=m}^n C_n^k \frac{(M-1)^k (N-M+1)^{n-k}}{N^n}$$

5 .

(1) $\forall m \geq 2$, 有

$$P(X_1 + X_2 = m) = \sum_{k=1}^{m-1} P(X_1 = k) P(X_2 = m - k) = (m-1)p^2 q^{m-2}$$

(2)

$$M_{X_k}(u) = E(e^{uX}) = \sum_{k=1}^{\infty} e^{uk} p q^{k-1} = \frac{pe^u}{1-qe^u}$$

$$EX_k = M'_{X_k}(0) = \frac{1}{p}, \quad EX_k^2 = M''_{X_k}(0) = \frac{2-p}{p^2}$$

$$\begin{aligned} E[(X_1 + X_2 + X_3)^2] &= \sum_{k=1}^3 EX_k^2 + 2 \sum_{1 \leq k < l \leq 3} E(X_k X_l) \\ &= \frac{6-3p}{p^2} + \frac{6}{p^2} \\ &= \frac{12-3p}{p^2} \end{aligned}$$

6. 解:

$$\begin{aligned} p_{i,j}(s, s+t) - p_{i,j}(s, s) &= P(N_{s+t} = j \mid N_s = i) - \delta_{i,j} \\ &= \frac{P(N_{s+t} - N_s = j - i, N_s = i)}{P(N_s = i)} - \delta_{i,j} \\ &= P(N_{s+t} - N_s = j - i) - \delta_{i,j} \\ &= \begin{cases} \frac{(\lambda t)^{j-i} e^{-\lambda t}}{(j-i)!} - \delta_{i,j} & j \geq i \\ 0 & j < i \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{当 } i=j, \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{p_{i,j}(s, s+t) - p_{i,j}(s, s)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{e^{-\lambda t} - 1}{t} = -\lambda$$

当 $j \geq i + 1$ 时, $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{p_{i,j}(s, s+t) - p_{i,j}(s, s)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\lambda^{j-i}}{(j-i)!} e^{-\lambda t} t^{j-i-1} = \begin{cases} \lambda & j = i + 1 \\ 0 & j > i + 1 \end{cases};$

故

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{p_{i,j}(s, s+t) - p_{i,j}(s, s)}{t} = \begin{cases} -\lambda & j = i \\ \lambda & j = i + 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$