

1 Random Stuff

2 Folgen und Reihen

D 2.1.1 Eine **Folge** a_n ist eine Abbildung

$$a : \mathbb{N}^* \longrightarrow \mathbb{R}$$

2.1 Konvergenz von Folgen

D 2.1.4 Eine Folge a_n heisst **konvergent**, falls es $a \in \mathbb{R}$ gibt, so dass $\forall \epsilon > 0$ die Menge $\{n \in \mathbb{N}^* : a_n \notin]a - \epsilon, a + \epsilon[\}$ endlich ist.

L 2.1.3 Dieses a ist **eindeutig**.

L 2.1.5 Jede konvergente Folge ist **beschränkt**.

Achtung: a_n beschränkt $\not\Rightarrow a_n$ konvergent!

L 2.1.6 Eine Folge a_n **konvergiert** gegen $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$, falls $\forall \epsilon > 0 \exists N \geq 1$ so dass $\forall n \geq N$

$$|a_n - a| < \epsilon.$$

T 2.1.8 Seien a_n und b_n konvergente Folgen mit $a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ und $b = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$

- 1) Dann ist $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = a + b$
- 2) Dann ist $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = a \cdot b$
- 3) Dann ist $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b})$ ($b_n \neq 0 \forall n \geq 1$)
- 4) $\exists K \geq 1 \forall n \geq K \ a_n \leq b_n \implies a \leq b$

2.2 Der Satz von Weierstrass

T Monotone Sei $(a_n)_{n \geq 1}$ monoton fallend und nach unten beschränkt. Dann konvergiert $(a_n)_{n \geq 1}$ mit Grenzwert $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf \{a_n : n \geq 1\}$.

T Cauchy Die Folge $(a_n)_{n \geq 1}$ ist genau dann konvergent, falls $\forall \epsilon > 0 \exists N \geq 1$ so dass $|a_n - a_m| < \epsilon \ \forall n, m \geq N$

T Sandwich Die Folge $(a_n)_{n \geq 1}$ konvergiert zu a , falls $(b_n)_{n \geq 1}, (c_n)_{n \geq 1}$ existieren mit Grenzwert a und $\forall n \geq 1 : b_n \leq a_n \leq c_n$.

2.3 Konvergenz von Reihen

D Die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konvergiert absolut (\Rightarrow konvergent), falls $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ konvergiert.

T Cauchy Die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ ist genau dann konvergent, falls. $\forall \epsilon > 0 \exists N \geq 1$ mit $\left| \sum_{k=n}^m a_k \right| < \epsilon \ \forall m \geq n \geq N$

T Ratio Sei $(a_n)_{n \geq 1}$ mit $a_n \neq 0 \ \forall n \geq 1$. Falls

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} < 1$$

dann konvergiert die Reihe absolut. Falls $\liminf_{n \rightarrow \infty} \square > 1$ divergiert die Reihe.

T Root Falls

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} < 1$$

dann konvergiert $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ absolut. Falls $\square > 1$, dann divergiert die Reihe.

T Alternating Sei $(a_n)_{n \geq 1}$ monoton fallend mit $a_n \geq 0 \ \forall n \geq 1$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. Dann konvergiert

$$S := \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} a_k$$

und es gilt $a_1 - a_2 \leq S \leq a_1$.

2.4 Andere Aussagen

L (Bernouilli) $(1+x)^n \geq 1+n \cdot x \ \forall n \in \mathbb{N}, x > -1$.

T Teilfolge Jede beschränkte Folge besitzt eine konvergente Teilfolge.

T Vektorfolge $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = b$ genau dann wenn $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n,j} = b_j \ \forall 1 \leq j \leq d$.

Teil I

Stetige Funktionen

D Die Funktion $f : D \longrightarrow \mathbb{R}$ ist stetig falls sie in jedem Punkt von D stetig ist.

3 Stetigkeit an einem Punkt

D Epsilon Sei $x_0 \in D \subseteq \mathbb{R}$. Die Funktion $f : D \longrightarrow \mathbb{R}$ ist in x_0 stetig, falls es für jedes $\epsilon > 0$ ein $\delta > 0$ gibt, so dass für alle $x \in D$ gilt:

$$|x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \epsilon$$

T Sequence Sei $x_0 \in D \subseteq \mathbb{R}$. Die Funktion $f : D \longrightarrow \mathbb{R}$ ist genau dann in x_0 stetig, falls für jede Folge $(a_n)_{n \geq 1}$ in D

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = x_0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(x_0)$$

gilt.

T Sidewise Sei $x_0 \in D \subseteq \mathbb{R}$. Die Funktion $f : D \longrightarrow \mathbb{R}$ ist in x_0 stetig, falls

$$f(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$$

gilt.