

## سوال ۱

برای هر کدام از موارد زیر، توزیع احتمالاتی مناسب آن را نامیده و علت انتخاب خود را شرح دهید.

- الف) سرعت ماشین‌ها در اتوبان
- ب) درآمد یک سوپرمارکت در یک ماه
- ج) زمان طول کشیده برای نوشتن یک تمرین
- د) نقطه برخورد در بازی دарт

## جواب سوال ۱

الف) **سرعت ماشین‌ها در اتوبان:** توزیع نرمال (گوسی) می‌تواند مناسب باشد. بسیاری از ماشین‌ها با سرعت‌هایی نزدیک به میانگین سرعت مجاز حرکت می‌کنند، با این حال، برخی از رانندگان ممکن است کمی سریع‌تر یا کمی آهسته‌تر حرکت کنند. توزیع نرمال به خوبی این واقعیت را که اکثر داده‌ها حول میانگین تجمع می‌یابند و داده‌های دور از میانگین نادر هستند، منعکس می‌کند.

ب) **درآمد یک سوپرمارکت در یک ماه:** درآمد یک سوپرمارکت در یک ماه: توزیع لگاریتمی نرمال ممکن است گزینه مناسبی باشد. درآمدها اغلب توزیعی نامتقارن دارند که در آن مقادیر بزرگ‌تر (درآمدهای بالاتر) کمتر اتفاق می‌افتند. توزیع لگاریتمی نرمال این ویژگی را نشان می‌دهد، جایی که داده‌ها پس از لگاریتم گرفتن، توزیع نرمال‌تری را نشان می‌دهند.

ج) **زمان طول کشیده برای نوشتن یک تمرین:** توزیع اگزیپوننشیل می‌تواند مناسب باشد، زیرا این توزیع برای مدل‌سازی زمان انتظار یا زمان تا رخداد یک رویداد منفرد استفاده می‌شود. در این مورد، زمان لازم برای اتمام تمرین می‌تواند به عنوان یک "زمان انتظار" برای تکمیل کار در نظر گرفته شود.

د) **نقطه برخورد در بازی دارت:** توزیع دایره‌ای یا توزیع یکنواخت بر روی دایره می‌تواند مناسب باشد. اگر فرض کنیم که هدف‌گیری‌ها تصادفی و یکنواخت بر روی سطح هدف صورت می‌گیرد، پس توزیع یکنواخت یک گزینه مناسب است. این توزیع نشان می‌دهد که هر نقطه بر روی هدف به طور یکسان احتمال دارد.

## سوال ۲

سوال: روشی را برای تولید واریته تصادفی برای متغیر  $X$  با تابع چگالی احتمال (pdf) زیر پیدا کنید:

$$f(x) = \begin{cases} x^{a-1} & \text{if } x \leq 1 \\ \lambda^{-\lambda x} & \text{otherwise} \end{cases}$$

## جواب سوال ۲

برای تولید یک متغیر تصادفی  $X$  بر اساس تابع چگالی احتمال داده شده، ابتدا تابع توزیع تجمعی (CDF) را برای هر بخش از  $f(x)$  محاسبه می‌کنیم.

برای  $x \leq 1$ :

$$f(x) = x^{a-1}$$

$$F(x) = \int_0^x t^{a-1} dt = \frac{x^a}{a}$$

برای  $x > 1$ :

$$f(x) = \lambda^{-\lambda x}$$

$$F(x) = \int_1^x \lambda^{-\lambda t} dt = \frac{-\lambda^{-\lambda x-1}}{\ln(\lambda)} + C$$

با این حال، محاسبه  $C$  و حل معادله تبدیل معکوس برای  $x > 1$  به دلیل مشکلات موجود در تابع چگالی احتمال، ناقص است.

برای محاسبه دقیق‌تر این مقادیر و تعیین  $C$  و همچنین حل معادله تبدیل معکوس برای  $x > 1$ ، این محاسبات را انجام می‌دهیم.

برای  $x \leq 1$ :

$$F(1) = \frac{1}{a}$$

برای  $x > 1$ : مقدار  $C$  را محاسبه کردیم، اما به نظر می‌رسد که نتیجه به دلیل ماهیت معادله به صورت "lr"zoo" (یعنی undefined) بدست آمده است. معادله تبدیل معکوس برای  $x > 1$  نیز حل نشده است. مشکل اصلی اینجا این است که فرمول دوم برای  $f(x)$  برای  $x > 1$ ، یعنی  $\lambda^{-\lambda x}$ ، یک فرمول غیرمعمول برای یک تابع چگالی احتمال است و انتگرال آن به سادگی قابل حل نیست. این موضوع باعث می‌شود که محاسبه  $C$  و حل معادله تبدیل معکوس برای این قسمت دشوار یا حتی غیرممکن باشد.

برای حل این مشکل، توصیه می‌کنم که مجدداً فرمول  $f(x)$  برای  $x > 1$  را بررسی کنید تا اطمینان حاصل شود که این فرمول مناسب برای یک تابع چگالی احتمال است. اگر امکان تغییر فرمول وجود دارد، استفاده از یک فرمول متداول‌تر مانند  $\lambda e^{-\lambda x}$  برای  $x > 1$  می‌تواند مسئله را قابل حل‌تر کند.

برای تولید متغیر تصادفی  $X$  از روش تبدیل معکوس استفاده می‌کنیم:

برای  $x \leq 1$ :

$$F(x) = \frac{x^a}{a}$$

برای تولید  $X$ ، یک عدد تصادفی یکنواخت  $U$  در بازه  $[0, 1]$  تولید می‌کنیم و حل می‌کنیم:

$$X = (aU)^{\frac{1}{a}}$$

برای  $x > 1$ :

$$F(x) = \frac{-\lambda^{-\lambda x-1}}{\ln(\lambda)} + C$$

برای تولید  $X$ ، یک عدد تصادفی یکنواخت  $U$  در بازه  $[0, 1]$  تولید می‌کنیم و حل می‌کنیم:

$$X = \frac{-1 - \ln(-U \ln(\lambda) + C \ln(\lambda))}{\lambda}$$

### سوال ۳

### جواب سوال ۳

### سوال ۴

داده‌های جدول زیر، نمونه‌های جمع‌آوری شده از مدت زمان سرویس در یک سیستم صف هستند. با کمک این داده‌ها، یک جدول برای تولید زمان‌های سرویس دهی ایجاد کنید (مشابه اسلاید ۱۶ از فصل ۷) و برای ۵ عدد تصادفی  $R_i$  زمان سرویس متناظر را تعیین کنید. برای تولید  $R_i$  می‌توانید از روشی دلخواه استفاده کنید.

Frequency	(seconds) Interval
۱۰	۳۰-۱۵
۲۰	۴۵-۳۰
۲۵	۶۰-۴۵
۳۵	۹۰-۶۰
۳۰	۱۲۰-۹۰
۲۰	۱۸۰-۱۲۰
۱۰	۳۰۰-۱۸۰

### جواب سوال ۴

جدول تولید زمان‌های سرویس دهی بر اساس داده‌های جدول موجود:

Distribution Cumulative	Frequency Relative	Frequency	(seconds) Interval
۰/۰۶۷	۰/۰۶۷	۱۰	۱۵ - ۳۰
۰/۲۰۰	۰/۱۳۳	۲۰	۳۰ - ۴۵
۰/۳۶۷	۰/۱۶۷	۲۵	۴۵ - ۶۰
۰/۶۰۰	۰/۲۳۳	۳۵	۶۰ - ۹۰
۰/۸۰۰	۰/۲۰۰	۳۰	۹۰ - ۱۲۰
۰/۹۳۳	۰/۱۳۳	۲۰	۱۲۰ - ۱۸۰
۱/۰۰۰	۰/۰۶۷	۱۰	۱۸۰ - ۳۰۰

برای پنج عدد تصادفی  $R_i$  تولید شده، بازه‌های زمانی متناظر به شرح زیر هستند:

- $R_1 = 0.333$ : بازه زمانی ۴۵-۶۰

- $R_2 = 0.686$ : بازه زمانی ۹۰-۱۲۰

- $R_3 = 0.244$ : بازه زمانی ۴۵-۶۰

- $R_4 = 0.430$ : بازه زمانی ۶۰-۹۰

- $R_5 = 0.486$ : بازه زمانی ۶۰-۹۰

در این کد، ابتدا داده‌های مربوط به زمان سرویس در یک سیستم صف و فراوانی هر بازه زمانی را در یک دیکشنری به نام data ذخیره می‌کنیم. سپس، این دیکشنری را به یک DataFrame پانداس تبدیل می‌کنیم تا بتوانیم روی داده‌ها به راحتی عملیات‌های مختلفی انجام دهیم.

توضیح خطوط کد:

ایجاد DataFrame از داده‌ها:

`df = pd.DataFrame(data)`: این خط کد، داده‌های موجود در دیکشنری data را به یک DataFrame پانداس تبدیل می‌کند.

محاسبه فراوانی کل:

`total_frequency = df['Frequency'].sum()`: با استفاده از این خط، فراوانی کلی تمام بازه‌های زمانی محاسبه می‌شود.

محاسبه فراوانی نسبی و توزیع تجمعی:

`df['Relative Frequency'] = df['Frequency'] / total_frequency`: این خط، فراوانی نسبی هر بازه زمانی را با تقسیم فراوانی هر بازه بر فراوانی کل محاسبه می‌کند.

`df['Cumulative Distribution'] = df['Relative Frequency'].cumsum()`: در این خط، توزیع تجمعی برای هر بازه زمانی را با جمع تراکمی فراوانی‌های نسبی محاسبه می‌کنیم.

تولید ۵ عدد تصادفی و تعیین بازه‌های زمانی متناظر:

`random_numbers = np.random.uniform(0, 1, 5)`: این خط، ۵ عدد تصادفی در بازه [۰, ۱] تولید می‌کند.

`determine_service_time`: این تابع برای هر عدد تصادفی R، بازه زمانی متناظر با آن را با توجه به توزیع تجمعی مشخص می‌کند.

`service_times = [determine_service_time(R, df) for R in random_numbers]`: با استفاده از این خط، برای هر یک از اعداد تصادفی تولید شده، بازه زمانی متناظر را مشخص می‌کنیم.

در نهایت، بازه‌های زمانی متناظر با هر عدد تصادفی به همراه خود اعداد تصادفی چاپ می‌شوند. این اطلاعات می‌توانند برای تحلیل‌های بعدی یا برای تعیین زمان‌های سرویس در سیستم صف مورد استفاده قرار گیرند.

## سوال ۵

### جواب سوال ۵

---

## سوال ۶

### جواب سوال ۶

برای تجزیه و تحلیل داده‌های موجود در دو فایل نمونه، ابتدا نمودار  $Q-Q$  را برای داده‌های فایل اول با توزیع ویبول با مقیاس  $2$  و  $scale = 1/6$  و شکل  $shape = 1/6$  ترسیم کردیم. در این نمودار، نقاط باید در امتداد خط قرمز قرار بگیرند اگر داده‌ها از توزیع ویبول پیروی کنند. مشاهده شد که داده‌ها تا حدودی با این توزیع همخوانی دارند، اما برخی انحرافات وجود دارد، به‌ویژه در دو انتهای نمودار.

سپس نمودار  $Q-Q$  برای همین داده‌ها را با توزیع نرمال با میانگین  $\mu = 0$  و واریانس  $\sigma^2 = 2$  ترسیم کردیم. در این نمودار، نقاط باید در امتداد خط قرمز قرار بگیرند اگر داده‌ها از توزیع نرمال پیروی کنند. مشاهده شد که داده‌ها با توزیع نرمال کمتر همخوانی دارند نسبت به توزیع ویبول، به‌ویژه در انتهای نمودار.

در نهایت، برای بررسی اینکه آیا داده‌های هر دو فایل ممکن است از یک توزیع مشترک پیروی کنند یا خیر، نمودار  $Q-Q$  را برای داده‌های هر دو فایل ترسیم کردیم. این بررسی را با توجه به توزیع نرمال انجام دادیم. با مقایسه نقاط از هر دو فایل با خط قرمز، می‌توان دریافت که هر دو مجموعه داده تفاوت‌هایی با توزیع نرمال دارند. با این حال، روند کلی نقاط هر دو مجموعه داده نسبتاً شبیه به هم است و نشان می‌دهد که ممکن است هر دو مجموعه داده از یک توزیع مشترک پیروی کنند، هرچند که این توزیع مشترک ممکن است دقیقاً توزیع نرمال نباشد.

به طور خلاصه، بر اساس تجزیه و تحلیل‌های نمودار  $Q-Q$  داده‌های فایل اول به نظر می‌رسد که بهتر با توزیع ویبول همخوانی دارند تا توزیع نرمال، و داده‌های هر دو فایل ممکن است از یک توزیع مشترک پیروی کنند که این توزیع مشترک لزوماً توزیع نرمال نیست.