

Épreuve Fondamentale

1- Relation pression/volume pulmonaire : (Cochez la réponse juste)

- A) Le volume d'une structure élastique ne dépend pas de la pression transmurale
- B) Le volume de relaxation du poumon est nul
- C) La compliance est la capacité du poumon à faire varier son volume, en fonction de la variation de la pression transmurale pulmonaire
- D) La compliance a une valeur constante qui n'évolue pas avec la pression
- E) Une compliance nulle = distensibilité infinie

2- Une P50 diminuée : (Cochez la réponse juste)

- A) Accompagne une hyperthermie
- B) Est associée à l'excès de 2,3 diphosphoglycérate
- C) Est observée en cas d'alcalose
- D) Traduit une affinité hémoglobine-O₂ abaissée
- E) Survient quand la PCO₂ est augmentée

3- Les réserves de CO₂ sont de l'ordre de 120 l au niveau : (Cochez la réponse juste)

- A) Du poumon
- B) Des tissus
- C) Du sang
- D) Des os
- E) De la myoglobine

4- Le débit ventilatoire est, chez l'adulte, au repos de : (Cochez la réponse juste)

- A) 0,25 litre/min
- B) 0,5 litre/min
- C) 8 litre/min
- D) 16 litre/min
- E) 26 litre/min

5- La durée d'un cycle respiratoire chez le nouveau-né, au repos, est de : (Cochez la réponse juste)

- A) 1 minute
- B) 20 secondes
- C) 10 secondes
- D) 4-5 secondes
- E) 1-1,5 seconde

6- La quantité de sodium excrété par le rein, par rapport à la quantité filtrée est, dans les conditions normales, de l'ordre de : (Cochez la réponse juste)

- A) 65 %
- B) 25 %
- C) 6 à 8 %
- D) 2 %
- E) 0,1 à 1 %

7- Au sommet du poumon : (Cochez la réponse juste)

- A) Les alvéoles sont distendues
- B) La pression pleurale est moins négative qu'au niveau des bases
- C) La perfusion est meilleure qu'au niveau des bases
- D) La ventilation est moins bonne que la perfusion
- E) La ventilation est meilleure qu'au niveau des bases

8- La créatinine : (Cochez la réponse fausse)

- A) Est un déchet métabolique
- B) Sa production et sa concentration plasmatique sont stables d'un jour à l'autre
- C) Dépend de la masse musculaire
- D) Est librement filtrée
- E) Est légèrement réabsorbée

9- En cas d'augmentation de la pression artérielle, tous les mécanismes suivants sont observés, sauf un, lequel ? (Cochez la réponse fausse)

- A) L'étirement de la paroi des artérioles afférentes
- B) La sortie de calcium
- C) Une constriction du muscle lisse vasculaire
- D) Une baisse du débit sanguin rénal
- E) Une baisse du débit de filtration glomérulaire

10- Le facteur natriurétique auriculaire : (Cochez la réponse juste)

- A) Diminue la pression de filtration glomérulaire
- B) Stimule la sécrétion de rénine
- C) S'oppose aux effets vasoconstricteurs de l'angiotensine II
- D) Augmente le débit sanguin rénal
- E) Exerce un effet de vasoconstriction de l'artériole afférente

11- Une des catégories de produits suivants subit une réabsorption au niveau du tube contourné proximal : (Cochez la réponse juste)

- A) Les oxalates
- B) Les salicylates
- C) Les bicarbonates
- D) L'adrénaline
- E) L'ion H⁺

12- Concernant les sélectines : (Cochez la réponse fausse)

- 1) Durant l'inflammation les E-sélectines jouent un rôle important dans le recrutement des leucocytes au niveau du site inflammatoire
- 2) Les P-sélectines sont exprimées à la surface des cellules endothéliales après induction par des allo-anticorps
- 3) Les L-sélectines sont exprimées d'une manière constitutive à la surface des leucocytes
- 4) Les sélectines sont des hétérodimères intra-cytoplasmiques composés de deux chaînes α et β liées de façon non covalente
- 5) Les sélectines non aucun rôle dans le homing lymphocytaire

A: 2+4+5 B: 2+5 C: 3+4+5 D: 2+3+4 E: 1+4+5

13- Concernant les cytokines pro-inflammatoires : (Cochez la réponse fausse)

- 1) Ont une action pléiotropique agissant sur plusieurs cibles cellulaires
- 2) Induisent la synthèse des protéines de l'inflammation
- 3) Les principales cytokines pro-inflammatoires sont : IL2, IL6, INF- γ et IL10
- 4) Entraînent une augmentation de la perméabilité vasculaire et une augmentation de l'expression des molécules d'adhésions par les cellules endothéliales
- 5) Inhibent la migration des macrophages et des Polynucléaires neutrophiles ce qui favorise l'élimination de l'agent agresseur

A: 3+4+5 B: 3+5 C: 2+4+5 D: 1+3 E: 1+3+5

14- Les cytokines : (Cochez la réponse fausse)

- 1) Sont des glycoprotéines de faible poids moléculaire
- 2) Interagissent avec des récepteurs spécifiques au niveau du noyau des cellules immunitaires
- 3) Peuvent être régulées par des antagonistes compétitifs
- 4) Sont synthétisées par les cellules immunitaires même au repos

- D) Ne peuvent être distingués macroscopiquement et microscopiquement d'un infarctus
- E) S'observent dans le poumon

22- Les cellules épithélioïdes : (Cochez la réponse fausse)

- A) Ressemblent aux cellules épithéliales
- B) Sont des cellules d'origine histiocytaire
- C) Sont des cellules très activées
- D) Ont une activité sécrétoire importante
- E) Ont une activité phagocytaire élevée

23- Concernant le granulome à corps étrangers : (Cochez la réponse fausse)

- A) Il est extrêmement fréquent
- B) Il n'a pas de disposition particulière en follicule
- C) Le corps étranger peut être endogène ou exogène
- D) Il est plus riche en cellules épithélioïdes qu'en cellules géantes
- E) Il peut donner naissance à des pseudotumeurs

24- Concernant les lésions cellulaires élémentaires : (Cochez la réponse fausse)

- A) On peut retrouver une atrophie physiologique cellulaire dans la maladie d'Alzheimer
- B) Les reflux gastro-œsophagiens peuvent être source de métaplasie cellulaire
- C) L'hypertrophie musculaire est physiologique chez les grands sportifs
- D) Un excès hormonal peut provoquer une hyperplasie cellulaire
- E) Un excès hormonal peut être responsable de lésions de dystrophie

25- Parmi les affirmations suivantes concernant l'étude immunohistochimique : (Cochez la réponse fausse)

- A) Elle est basée sur une réaction antigène-anticorps
- B) Elle permet l'identification et la localisation de protéines
- C) Peut permettre d'identifier une cible thérapeutique
- D) Elle peut mettre en évidence des séquences connues d'ADN ou d'ARN
- E) Elle peut mettre en évidence un virus

26- Concernant ces complications, laquelle n'est pas due à l'athérosclérose ?

- A) Perte d'élasticité de la paroi artérielle
- B) Embolie pulmonaire
- C) Formation d'anévrismes
- D) Sténose de la lumière artérielle
- E) Obstruction thrombotique de l'artère

27- Cochez la réponse juste :

- 1) Au niveau de l'ampoule rectale, les valvules de Houston sont des plis transversaux
 - 2) Le rectum fait suite au sigmoïde au niveau de S1
 - 3) La partie pelvienne du rectum est oblique en bas et en avant
 - 4) Le rectum est situé en avant de L4, L5 et le sacrum
 - 5) Colonnes anales de Morgagni saillies verticales situées au niveau du canal anal
- A: 1+2+3 B: 2+3+5 C: 1+4+5 D: 3+4+5 E: 1+3+5

28- Cochez la réponse juste

- 1) La glande thyroïde est une glande impaire mixte
 - 2) Le fascia thyroïdien est une dépendance de la gaine viscérale du cou
 - 3) Le lobe thyroïdien est fixé à la trachée par le ligament médian de Gruber
 - 4) La glande thyroïde est plus développée chez l'homme que chez la femme
 - 5) La glande thyroïde est innervée par les nerfs vague
- A: 2+5 B: 4+5 C: 3+5 D: 1+4 E: 3+4

29- Cochez la réponse juste

5) Peuvent agir en synergie pour réaliser une activité biologique donnée (effet de redondance)

A: 3+4 B: 2+3+5 C: 2+4 D: 1+2+5 E: 1+2+4

15- Le thymus est un organe lymphoïde : (Cochez la réponse fausse)

- 1) Primaire
- 2) Central
- 3) Nécessaire à la maturation des Lymphocytes B folliculaires et les lymphocytes NK
- 4) Libère dans le sang circulant des Lymphocytes T matures naïfs double positifs exprimant des molécules CD4 et CD8
- 5) Constituant un passage obligé des cellules LT aux différents stades de maturation

A: 4 B: 3+4+5 C: 2+4 D: 3+4 E: 1+3+4+5

16- L'idiotypie est : (Cochez la réponse juste)

- 1) Définie par un ensemble d'épitopes portés par la partie Fc d'une molécule d'Ig
- 2) Identique chez tous les individus d'une même espèce
- 3) Le résultat d'une combinaison donnée de gènes codants pour les parties variables des chaînes lourdes et légères des immunoglobulines
- 4) Partagée par les immunoglobulines d'une même classe chez un individu
- 5) Partagée par les molécules de la superfamille des immunoglobulines

A: 1+4 B: 2+3+4 C: 2+3+4+5 D: 3 E: 1+3

17- Les régions constantes des chaînes H portent des structures conservées qui assurent diverses fonctions : (Cochez la réponse juste)

- 1) L'adhérence aux antigènes HLA
- 2) Le transfert placentaire
- 3) La fixation et l'activation du complément par voie classique
- 4) Le phénomène d'ADCC pour les cellules NK
- 5) La fixation spécifique aux épitopes

A: 1+2+3 B: 2+3+5 C: 2+3+4+5 D: 1+2+3+4 E: 2+3+4

18- Le paratope : (Cochez la réponse fausse)

- 1) Est le site de reconnaissance de l'antigène
- 2) Est constitué des domaines variables des deux chaînes lourdes des immunoglobulines
- 3) Est le site de liaison spécifique au C1q du complément
- 4) Exprime des déterminants idiotypiques
- 5) N'est pas impliqué dans le passage trans-placentaire des immunoglobulines

A: 2+3 B: 2+3+4 C: 2+5 D: 3+4 E: 1+3+4+5

19- Les œdèmes lésionnels : (Cochez la réponse fausse)

- A) Sont riches en protéines plasmatiques
- B) Sont dus à une augmentation de la perméabilité endothéliale
- C) Sont la conséquence d'une augmentation de la pression hydrostatique
- D) Surviennent dans la phase aiguë de l'inflammation
- E) S'accompagnent d'une congestion active

20- Tous ces facteurs favorisent la survenue d'une thrombose sauf un lequel ?

- A) L'exercice physique excessif
- B) La compression vasculaire
- C) Les artérites
- D) Les coagulopathies
- E) L'athérosclérose

21- Les infarctus rouges : (Cochez la réponse fausse)

- A) S'observent dans le rein
- B) Sont dus à une oblitération artérielle
- C) Sont infiltrés de sang

- B) Le risque de passage du parasite au fœtus est minimum en début de grossesse
- C) La gravité de l'atteinte fœtale augmente avec l'âge de la grossesse
- D) Le risque de passage du parasite au fœtus augmente avec l'âge de la grossesse
- E) En cas de contamination maternelle tardive survenue au cours du troisième trimestre de la grossesse, la toxoplasmose congénitale est le plus souvent asymptomatique (infra clinique, latente)

36- La reprise évolutive (réactivation) d'une toxoplasmose latente peut se voir en cas: (Cochez la réponse juste)

- A) D'une greffe de moelle osseuse à un receveur séropositif pour la toxoplasmose en pré greffe
- B) D'un simple contact des mains avec de la viande crue parasitée
- C) D'un contact avec la litière d'un chat parasité
- D) D'une hygiène insuffisante des mains après un contact avec du sol contenant des oocystes sporulés
- E) D'une transplantation cardiaque provenant d'un donneur séropositif pour la toxoplasmose à un receveur séronégatif pour la toxoplasmose en pré greffe

37- Un accès palustre survenu chez un voyageur non immunisé ayant séjourné en zone d'endémie palustre, est évoqué devant toutes ces situations suivantes sauf une, laquelle :

- A) Une fièvre au retour de zone d'endémie palustre
- B) Une chimioprophylaxie antipaludique non adaptée au pays visité
- C) Une adénopathie
- D) La non prise de chimioprophylaxie antipaludique
- E) Une thrombopénie précoce

38- À propos des cestodes parasites de l'homme, laquelle de ces propositions suivantes est inexacte : (Cochez la réponse fausse)

- A) *Tænia saginata* est un ver nu responsable de téniasis et/ou de cysticercose
- B) *Tænia solium* est un ver armé qui peut être responsable de téniasis et/ou de cysticercose
- C) *Tænia saginata* est responsable d'une cestodose intestinale dont le diagnostic est assuré essentiellement par un scotch test anal « test de Graham » qui met en évidence des embryophores caractéristiques au niveau de la marge anale
- D) *Tænia saginata* est un ver solitaire dont la larve est « *Cysticercus bovis* »
- E) Les anneaux gravides sont éliminés passivement au moment de la défécation pour *Tænia solium* et activement en dehors de la défécation pour *Tænia saginata*

39- Une femme obèse de 54 ans avec un diabète type 1 se présente en consultation avec une glycémie à 5.8g/l, puis est hospitalisée. Le lendemain un prélèvement sanguin est réalisé à jeun, le sérum est fortement lactescent. L'échantillon a été conservé au frais pendant toute une nuit, il présente un surnageant crémeux, la partie inférieure demeure trouble. Cet aspect du sérum serait-il évocateur de : (Cochez la réponse juste)

- A) Hypercholestérolémie familiale
- B) Hypertriglycéridémie majeure Type V
- C) Hypertriglycéridémie majeure Type IV
- D) Dyslipidémie mixte Type III
- E) Dyslipidémie mixte II-b

40- Suite à une intervention chirurgicale, un patient a eu une complication représentée par une accumulation d'un liquide d'épanchement au niveau du péritoine due à une rupture du canal lymphatique mésentérique, ce liquide sera-t-il : (Cochez la réponse juste)

- A) Riche en Low-density-lipoprotéines
- B) Riche en enzymes pancréatiques
- C) Riche en chylomicron
- D) Pauvre en triglycérides
- E) Riche en acide lactique

41- Parmi les affirmations suivantes concernant le peptide C, laquelle est fausse?

- A) La production endogène de peptide C est équimolaire à la sécrétion insulinaire
- B) Dans le diabète insulino-dépendant, son taux urinaire est fortement abaissé

- 1) Les vaisseaux iliaques internes représentent les rapports latéraux du rectum pelvien
 - 2) L'espace retro-rectal contenant les vaisseaux sacrés moyens, le sympathique sacré et les uretères
 - 3) La séreuse péritonéale, recouvre seulement la partie supérieure des faces antérieure et postérieures du rectum
 - 4) Le coccyx est le rapport postérieur du rectum
 - 5) Par l'intermédiaire du sphincter externe, le canal est en rapport avec, en avant, l'urètre chez l'homme
- A: 1+3+4 B: 3+4+5 C: 2+3+5 D: 1+4+5 E: 2+4+5**

30- Cochez la réponse juste

- A) La glande thyroïde répond à l'aponévrose cervicale moyenne engainant le muscle sterno-thyroïdien
- B) La pyramide de Lalouette est un prolongement émis du lobe thyroïdien
- C) L'isthme répond aux veines thyroïdiennes antérieures en haut
- D) La face médiale du lobe thyroïdien répond au nerf vague
- E) La glande thyroïde est de surface lisse

31- Cochez la réponse juste

- 1) Les artères rectales supérieures, sont des branches terminales de l'artère mésentérique inférieure
 - 2) Les pédicules lymphatiques rectaux inférieurs se drainent dans les nœuds hypogastrique
 - 3) Les veines rectales supérieures sont tributaires du système cave inférieur
 - 4) Les pédicules lymphatiques rectaux supérieurs, se drainent dans les nœuds de la chaîne mésentérique inférieure
 - 5) Les artères rectales supérieures assurent la quasi-totalité de la vascularisation de l'ampoule rectale
- A: 1+2+4 B: 3+4+5 C: 1+4+5 D: 1+2+3 E: 2+4+5**

32- Cochez la réponse juste

- A) La veine thyroïdienne supérieure se jette dans le tronc thyro-linguo-facial
- B) L'artère thyroïdienne moyenne se termine par trois branches
- C) L'artère thyroïdienne inférieure naît de la carotide externe
- D) Les veines thyroïdiennes antérieures se jettent dans la veine jugulaire interne
- E) Les lymphatiques se drainent latéralement dans les lymphonœuds préaryngés

33- Au cours de l'amébose maladie : (Cochez la réponse juste)

- A) L'amébose hépatique due à *Entamoebahistolytica* type minuta, se traduit sur le plan clinique par une hépatomégalie douloureuse et fébrile
- B) L'amébose hépatique est une forme clinique extra intestinale dont le diagnostic est essentiellement coproparasitologique
- C) L'amébose intestinale aiguë est une forme clinique intestinale dont le diagnostic est assuré essentiellement par la recherche d'anticorps spécifiques dans le sérum
- D) L'amébose intestinale aiguë due à *Entamoebahistolytica* type histolytica, se traduit sur le plan clinique par un syndrome dysentérique associant : des épreintes, des ténèsmes et des crachats rectaux glairo-sanglants
- E) Le traitement fait appel uniquement aux anti-amibiens de contact

34- La conduite à tenir chez une femme enceinte « non immunisée » pour la toxoplasmose consiste à : (Cochez la réponse juste)

- 1) Un dernier contrôle sérologique négatif le jour de l'accouchement permet d'écarter le risque de toxoplasmose congénitale pour l'enfant
 - 2) Mettre des gants pour jardiner et bien se laver les mains ensuite
 - 3) Prescrire une surveillance sérologique mensuelle pendant toute la durée de la grossesse
 - 4) Ne pas consommer de crudités crues mal lavées ou de la viande saignante insuffisamment cuite
 - 5) Éviter tout contact direct avec un chat parasité car il constitue un facteur de risque principal d'acquisition de la toxoplasmose
- A: 1+2+3 B: 2+3+4 C: 3+4+5 D: 1+2+4 E: 2+3+5**

35- Chez les femmes enceintes qui s'infectent par *Toxoplasma gondii* pendant la grossesse, laquelle de ces propositions suivantes est inexacte : (Cochez la réponse fautive)

- A) La toxoplasmose congénitale est grave en cas de contamination maternelle en début de grossesse

- 3) Syndrome des anti phospholipides
- 4) Péri-artérite noueuse
- 5) Syndrome des micro-angiopathies thrombotiques

A: 1+3 B: 2+4+5 C: 3+4+5 D: 1+2+3 E: 4+5

63- Les céphalées au cours de la migraine sont : (Cochez la réponse fausse)

- A) Pulsatiles
- B) Hemicraniennes
- C) S'aggravent avec l'âge
- D) Débutent dans l'enfance ou l'adolescence
- E) Sont plus fréquentes chez la jeune femme

64- La sclérose en plaque (SEP) est caractérisée par : (Cochez la réponse fausse)

- A) Un processus inflammatoire chronique touchant exclusivement le cerveau
- B) Un processus inflammatoire chronique du cerveau et de la moelle
- C) Généralement un âge de début entre 20 et 40 ans
- D) Une évolution par poussée et rémission
- E) Des hyper signaux à l'IRM de l'encéphale disséminées dans la substance blanche

65- Le diagnostic de l'hypertrophie bénigne de la prostate repose sur l'interrogatoire qui recherchera les signes urinaires en rapport avec l'obstruction : (Cochez la réponse fausse)

- A) Dysurie
- B) Retard de démarrage
- C) Jet en pomme d'arrosoir
- D) Jet faible
- E) Pollakiurie

66- Le carcinome à cellules claires du rein : (Cochez la réponse fausse)

- A) Est la tumeur maligne la plus fréquente du rein
- B) Se présente sous forme d'une masse jaune bigarré
- C) Est composée exclusivement de cellules claires
- D) Se grade avec le grade de fuhrman
- E) Peut-être bilatéral dans la maladie de Von Hippel Lindeau

67- Parmi ces signes cliniques, lequel inaugure la maladie dans le cancer du cavum ? (Cochez la réponse juste)

- A) Dysphonie
- B) Dyspnée
- C) Adénopathie cervicale
- D) Otalgie
- E) Gingivorragie

68- Le diagnostic de certitude du cancer du pancréas est posé par lequel des marqueurs tumoraux suivants ? (Cochez la réponse juste)

- A) CA 125
- B) CA 15-3
- C) CA 19-9
- D) ACE
- E) Aucune réponse juste

69- Le souffle de rétrécissement aortique est : (Cochez la réponse juste)

- A) Rude râpeux, irradiant en écharpe, maximal au foyer aortique
- B) En jet de vapeur, maximal au foyer aortique
- C) Doux, humé, aspiratif, maximal au foyer aortique
- D) Son intensité témoigne de sa sévérité
- E) Le B2 aortique est aboli dans le rétrécissement aortique serré sous aortique

- C) Le peptide C est constitutif de la pro-insuline et de la pré-pro-insuline
- D) Son dosage sanguin n'est pas affecté par l'administration d'insuline exogène
- E) Son taux sanguin est abaissé en cas d'insuffisance rénale

42- Quel signe clinique ou biologique ne peut pas être associé à une cholestase ?

- A) Stéatorrhée
- B) Présence d'une lipoprotéine a (Lp(a)) au lipidogramme
- C) Selles décolorées
- D) Prurit
- E) Élévation du taux sanguin des sels biliaires

43- Parmi les propositions suivantes concernant le métabolisme des lipoprotéines, laquelle est exacte : (Cochez la réponse juste)

- A) L'Apo lipoprotéine B48 est principalement synthétisée par le foie
- B) L'ABC 1 ("ATP-binding cassette protein-I") est une protéine de transport des triglycérides
- C) La LPL (lipoprotéine lipase) est essentiellement localisée dans le tissu hépatique
- D) L'apolipoprotéine C-III est le principal activateur de la LPL
- E) La LCAT (lécithine cholestérol acyltransférase) a comme principal substrat le cholestérol des HDL (lipoprotéines de haute densité)

44- Concernant la structure bactérienne : (Cochez la réponse juste)

- A) Le plasmide est le seul support de l'information génétique de la bactérie
- B) Le chromosome est un élément facultatif
- C) La capsule est une structure extérieure constante
- D) La membrane cytoplasmique est un élément facultatif de la bactérie
- E) La paroi est constituée de peptidoglycane

45- Le métronidazole : (Cochez la réponse juste)

- A) Est un macrolide
- B) Désorganise la structure des membranes cellulaires
- C) Est actif sur les bactéries anaérobies strictes
- D) Fait partie des polymyxines
- E) Agit par inhibition compétitive

46- Streptococcus pneumoniae : (Cochez la réponse juste)

- A) Est un cocci à Gram négatif
- B) Peut être responsable de pneumonie et d'otite
- C) Est bêta-hémolytique sur gélose au sang frais
- D) Est résistant à l'optochine
- E) Est une bactérie non exigeante

47- Neisseria gonorrhoeae : (Cochez la réponse juste)

- A) Est responsable de la blennorragie
- B) Est une bactérie aéroanaérobie facultative AAF
- C) Cultive sur milieu ordinaire
- D) Est un bacille Gram positif
- E) Est oxydase négative

48- Pseudomonas aeruginosa : (Cochez la réponse juste)

- A) Est un Cocci Gram positif
- B) Est une bactérie pathogène spécifique
- C) Est incapable de produire du biofilm
- D) Est naturellement sensible à la vancomycine
- E) Est souvent impliquée dans les infections associées aux soins

49- Le choléra : (Cochez la réponse juste)

- A) Est causé par une bactérie Gram positif microaérophile
- B) Est suspecté devant une diarrhée glairosanglante
- C) Est une maladie à transmission hydrique engendrant une diarrhée aqueuse
- D) Est causée par V.choleraeserogroupe O4
- E) Touche uniquement l'enfant de moins de 2 ans

50- Legionellapneumophila : (Cochez la réponse juste)

- A) Est responsable de la fièvre de Pontiac
- B) N'a pas la capacité de produire un biofilm
- C) Est une bactérie microaérophile
- D) Est l'agent de la tularémie
- E) Est une bactérie non exigeante de culture aisée

Épreuve Médico-Chirurgicale

51- Devant un œil rouge, un des signes suivants n'est pas en faveur du diagnostic de conjonctivite. Lequel ? (Cochez la réponse fausse)

- A) Sécrétions
- B) Larmoiement
- C) Baisse d'acuité visuelle
- D) Rougeur diffuse
- E) Sensation de sable

52- Ces propositions concernent la cataracte : (Cochez la réponse juste)

- 1) La corticothérapie générale au long cours peut induire une cataracte
 - 2) Une cataracte secondaire peut se développer en post opératoire
 - 3) Un traumatisme oculaire peut se compliquer de cataracte
 - 4) L'échographie en mode B est nécessaire en cas de cataracte blanche totale
 - 5) L'échographie en mode A n'est pas nécessaire avant la chirurgie de la cataracte
- A: 1+2+5 B: 2+3+4 C: 1+2+3+4 D: 1+4+5 E: 1+2+3

53- Le diagnostic de l'arrêt cardiocirculatoire doit se faire en : (Cochez la réponse juste)

- A) 60 secondes
- B) 30 secondes
- C) Moins de 30 secondes
- D) Plus de 30 secondes
- E) 3 minutes

54- Le premier geste de réanimation à réaliser est : (Cochez la réponse juste)

- A) L'intubation nasotrachéale
- B) La mise en place d'un cathéter central
- C) La défibrillation précoce
- D) La mise en place d'une sonde nasogastrique
- E) L'injection intracardiaque d'adrénaline

55- Dans la péritonite aiguë, l'examen clinique peut retrouver une défense abdominale localisée ou généralisée correspondant à : (Cochez la réponse juste)

- A) Une réaction abdominale à la douleur spontanée
 - B) Une réaction abdominale à la douleur provoquée
 - C) Une réaction permanente et involontaire
 - D) Une réaction permanente et volontaire
 - E) Une réaction éphémère et involontaire
- A: 4+5 B: 1+4 C: 2+5 D: 2+3 E: 1+5

56- La cholécystite aiguë : (Cochez la réponse fausse)

- A) Impose une intervention d'urgence
- B) Est traitée par cathétérisme rétrograde de la papille
- C) Est la cause de toutes les douleurs biliaires
- D) Est généralement d'origine lithiasique
- E) Provoque une défense de l'hypochondre droit

57- Quelles sont les séquences cliniques compatibles avec le diagnostic d'Hématome extradural post traumatiques : (Cochez la réponse juste)

- 1) Perte brève de connaissance lors du traumatisme. Trois heures après apparition d'hémiplégie et coma
- 2) Coma d'emblée sans perte de connaissance
- 3) Obnubilation durant quelques heures puis aggravation de l'état de conscience et hémiplégie
- 4) Examen neurologique normal au moment du traumatisme puis apparition des troubles de la conscience deux heures plus tard
- 5) Examen neurologique normal au moment du traumatisme puis apparition de crise bravais Jacksonienne droite quatre heures plus tard

A: 1+2+5 B: 2+3+4 C: 1+5 D: 1+3+4 E: 1+2+3

58- Lors d'un traumatisme crânien quelles sont les situations qui justifient la réalisation d'une tomodensitométrie cérébrale en urgence : (Cochez la réponse juste)

- 1) Sensation de vertige
- 2) Trouble de l'équilibre et de la marche
- 3) Perte de connaissance initiale
- 4) Coma avec signe de focalisation
- 5) Coma sans signe de focalisation

A: 1+2+3 B: 2+3+4+5 C: 3+4+5 D: 1+4 E: 1+2+4

59- Si 400 nouveaux cas de maladie ont été recensés en deux ans parmi une population de 100 000 personnes, le taux d'incidence de la maladie est de : (Cochez la réponse juste)

- A) 800 pour 100000 personnes année
- B) 400 pour 100000 personnes année
- C) 20 pour 100000 personnes année
- D) 200 pour 100 000 personnes années
- E) 2000 pour 100000 personnes années

60- Si 300 cas d'une maladie M sont survenus en trois ans au sein d'une population estimée à 3000000, le taux de densité d'incidence est : (Cochez la réponse juste)

- A) 330 pour 100000 personnes années
- B) 3300 pour 100000 personnes années
- C) 3.3 pour 100 000 personnes années
- D) 33 pour 100 000 personnes années
- E) 3.3 pour 100 0000 personnes années

61- Quels signes clinico-biologiques sont évocateurs de néphrite interstitielle chronique (Cochez la réponse juste)

- 1) Polyurie
- 2) Acidose tubulaire
- 3) Leucocyturie aseptique
- 4) Œdème des membres inférieurs
- 5) Hypoalbuminémie

A: 1+2+4 B: 2+4+5 C: 2+3 D: 1+2+3 E: 1+5

62- Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui ne constituent pas des causes de néphropathies vasculaires aiguës ? (Cochez la réponse juste)

- 1) Sténose de l'artère rénale
- 2) Néphroangiosclérose maligne