

Notes de Révision Chimie NM

ImmortalPharaoh7

Mai 2020

Résumé

Les notes de révision pour la chimie niveau moyen du BI, pour le curriculum qui commence dès 2016. Attention, ces notes ne sont pas à être utilisées indépendamment ; ils servent comme des astuces ou bien les définitions qui peuvent être oubliées.

Si vous avez des informations à ajouter ou bien des corrections, veuillez envoyer un email à pharaoh.immortal7@gmail.com ou messenger ImmortalPharaoh7#7811 sur Discord.

Table des matières

1	Relations Stœchiométriques	1
2	Structure Atomique	2
3	Périodicité	3
4	Liaison et Structure Chimique	4
5	Thermochimie	5
6	Cinétique Chimique	7
7	Équilibre	9
8	Acides et Bases	10
9	Processus Redox	11
10	Chimie Organique	12
11	Mesure et Traitement des Données	13

1 Relations Stœchiométriques

2 Structure Atomique

3 Périodicité

4 Liaison et Structure Chimique

5 Thermochimie

Définitions :

- Enthalpie : Énergie emmagasinée dans un matériel.
- Endothermique : Une réaction qui absorbe de l'enthalpie $\Delta H > 0$.
- Exothermique : Une réaction qui libère de l'enthalpie $\Delta H < 0$.
- Conditions standards : Température de 298 K et pression de 100 kPa.
- Calorimètre : Appareil qui permet de créer un système isolé au niveau de la température, mais il n'est jamais parfait.

Formules :

- $Q = mc\Delta T$: Q est l'énergie, m la masse, c est une constante et ΔT est la différence de température.
- $\Delta H = -Q/n$: ΔH est l'enthalpie en kJ mol^{-1} , Q est l'énergie et n est le nombre de mols.

Enthalpie moyenne des liaisons (section 11) :


$$\begin{aligned}\Delta H &= \text{liaisons détruites} - \text{liaisons formées} \\ &= H_{\text{initiale}} - H_{\text{finale}}\end{aligned}$$

Attention : Ces valeurs sont des valeurs moyennes et *tous* les composants doivent être en état gazeux.


Loi de Hess :

Si une réaction chimique est la somme algébrique de plusieurs réactions, la chaleur de cette réaction est égale à la somme algébrique des chaleurs des réactions qui ont servi à établir cette somme. Il est possible d'inverser ou de multiplier les réactions pour enfin faire la somme algébrique.


Exemple : Trouver l'enthalpie dans la réaction suivante :




Avec les équations réactions suivantes :



Donc il faut




Ensuite




Et enfin additionner les réactions avec leurs enthalpies pour donc avoir une enthalpie $\Delta H = 2855.4 \text{ kJ}$.

Chaleur de la formation standard (section 12) : La variation d'enthalpie lors de la formation d'*une* mole du composé à partir de ses éléments à l'état standard, ex :



Chaleur de la combustion standard (section 13) : La variation d'enthalpie lors de la combustion complète d'*une* mole de la matière dans les conditions standards, ex :



Enthalpie de neutralisation : La variation d'enthalpie durant la formation d'une mole de H₂O lors de la neutralisation de l'acide avec la base.

$$\Delta H = \frac{-Q}{n_{\text{limitant}}}$$

Attention : La combustion est incomplète et une partie de la chaleur s'échappe dans le milieu (calorimètre n'est jamais parfait).

6 Cinétique Chimique

Définitions :

- Énergie d'activation : Énergie nécessaire pour que la réaction ait lieu.
- Théorie des collisions : Pour la réaction ait lieu, il faut qu'il y a une collision avec une orientation géométrique appropriée et avec de l'énergie suffisante (énergie d'activation).

Mesurer la vitesse de réaction : Faire une droite tangente au point qu'on veut mesurer sa vitesse, ensuite calculer le gradient de cette droite. Le résultat est la vitesse de réaction à ce point avec l'unité de l'ordonnée sur l'unité des abscisses.

Facteurs qui affectent la vitesse de réaction :

- Surface exposée à la réaction : Plus la surface est grande (donc la matière est découpée en plus de parties), alors la vitesse de la réaction est grande.
- Concentration : Plus la concentration est grande, plus la vitesse de réaction est grande.
- Température : Plus la température est grande, plus la vitesse de réaction est grande.
- Catalyseur : Il augmente la vitesse de réaction en diminuant l'énergie d'activation.




FIGURE 1 – Graphe de l'énergie d'activation

Distribution de Maxwell-Boltzmann : Seulement une fraction petite des particules ont une énergie cinétique suffisante pour faire la réaction, le catalyseur augmente la fraction qui sont au dessus de l'énergie d'activation et la température change la courbe elle-même (voir les graphes).




FIGURE 2 – Distribution normale qui doit être dessinée




FIGURE 3 – Changement de la courbe à cause d'une augmentation de la température

7 Équilibre

8 Acides et Bases

9 Processus Redox

10 Chimie Organique

11 Mesure et Traitement des Données