Legacy 28-position results beside p84v2



	Δ [95% CI]	p	TCR-IMAP vs comparator	resamples
pairwise, tcr70 vs pair-frequency prior	+0.0398 [+0.0084, +0.0722]	p = 0.010	0.3578 vs 0.3181	p28, 2k
	+0.0507 [+0.0215, +0.0841]	p < 0.001	0.3598 vs 0.3090	p84v2, 20k
per-residue, tcr70 vs Struct-TCS	+0.0273 [+0.0089, +0.0465]	p = 0.001	0.7382 vs 0.7108	p28, 2k
	+0.0312 [−0.0049, +0.0650]	p = 0.088	0.7281 vs 0.6969	p84v2, 20k
per-residue, tcr70 vs position prior	+0.0256 [+0.0002, +0.0526]	p = 0.048	0.7382 vs 0.7126	p28, 2k
	+0.0085 [−0.0162, +0.0371]	p = 0.546	0.7281 vs 0.7196	p84v2, 20k
identity sweep, < 0.70 vs pair-frequency prior	+0.0127 [−0.0151, +0.0431]	p = 0.429	0.3230 vs 0.3103	p28, 2k
	+0.0274 [−0.0001, +0.0543]	p = 0.052	0.3271 vs 0.2997	p84v2, 2k
peptide input, CDR3 rows with vs without	+0.0380 [+0.0150, +0.0607]	p < 0.001	0.3878 vs 0.3497	p28, 2k
	+0.0082 [−0.0137, +0.0293]	p = 0.416	0.3765 vs 0.3683	p84v2, 2k

◆ p28: 28 positions, outcome-informed (superseded) ● p84v2: 84-column window (reported)

p28 positions were selected from contact frequency pooled over all 174 complexes before splitting (outcome-informed); superseded, shown only to document the correction