

В обозначениях задачи **737** $\psi(x) = x^{\frac{1}{4}}$, $\varphi'(x) = \psi^{-2}(x) = x^{-\frac{1}{2}}$, так что, например, $\varphi(x) = 2\sqrt{x}$. Тогда заменяем

$$\begin{cases} t = \varphi(x) = 2\sqrt{x} \\ y = u\psi(x) = ux^{\frac{1}{4}} \end{cases} \quad \mathcal{Q}_{u(t)}(t) = -1 + \psi^3(x)\psi''(x) = -1 - \frac{3}{16}x^{-1} = -1 - \frac{3}{8}t^{-2},$$

в результате чего получаем $u''(t) + \left(-1 - \frac{3}{8}t^{-2}\right)u(t) = 0$. При $t \rightarrow +\infty$ результат таков:

$$\begin{aligned} u_1(t) &= e^t \left(1 + O(t^{-1})\right) & u_2(t) &= e^{-t} \left(1 + O(t^{-1})\right) \\ y_1(x) &= x^{\frac{1}{4}} e^{2\sqrt{x}} \left(1 + O\left(x^{-\frac{1}{2}}\right)\right) & y_2(x) &= x^{\frac{1}{4}} e^{-2\sqrt{x}} \left(1 + O\left(x^{-\frac{1}{2}}\right)\right) \end{aligned}$$