

Задача 550(b).

Пользуясь схемой Горнера, вычислить $f(x_0)$ $f(x) = x^5 + (1+2i)x^4 - (1+3i)x^2 + 7$, $x_0 = -2-i$.

Решение: $f(x) = x^5 + (1+2i)x^4 - (1+3i)x^2 + 7$; $x_0 = -2-i$

|.....|1|1+2i|0|-1-3i|0|7

|-2-i|1|-1+i|3-i|-8-4i|12+16i|0

1) $(-2-i) + (1+2i) = -1+i$

2) $(-2-i)(-1+i) = 2-2i+i+1 = 3-i$

3) $(-2-i)(3-i) = -6+2i-3i+i^2 = -7-i$

$(-7-i) + (-1-3i) = -8-4i$

4) $(-2-i)(8-4i) = 16+8i+8i+4i^2 = 12+16i$

5) $(-2-i)(12+16i) = -24-32i-12i-16i^2 = -44i-8$

$-44i-8+7 = -44i-1$

Answer : $-44i-1$

Задача 551(b).

Пользуясь схемой Горнера, разложить полином $f(x) = x^5$ по степеням $x-1$.

Решение: $f(x) = x^5, (x-1)$

|..|1|0|0|0|0

|1|1|1|1|1|1

$(x-1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) + 1$

Задача 553(b).

Разложить $f(x) = (x-2)^4 + 4(x-2)^3 + 6(x-2)^2 + 10(x-2) + 20$ по степеням x .

Решение: $f(x) = (x-2)^4 + 4(x-2)^3 + 6(x-2)^2 + 10(x-2) + 20 = *$

$(x-2)^4 = (x-2)^2 * (x-2)^2 = (x^2 - 4x + 4)(x^2 - 4x + 4) = x^4 - 4x^3 + 4x^2 - 4x^3 + 16x^2 - 16x + 4x^2 - 16x + 16 = x^4 - 8x^3 + 24x^2 - 32x - 16 + 4x^3 - 18x^2 + 34x - 8 = x^4 - 4x^3 + 6x^2 + 2x + 8$

Answer : $x^4 - 4x^3 + 6x^2 + 2x + 8$

Задача 555(b).

Чему равен показатель кратности корня -2 для полинома $x^5 + 7x^4 + 16x^3 + 8x^2 - 16x - 16$?

Решение: $x^5 + 7x^4 + 16x^3 + 8x^2 - 16x - 16, x+2$

0.|..|1|7|16|8|-16|-16

1.|-2|1|5|6|-4|-8|0

2.|-2|1|3|0|-4|0

3.|-2|1|1|-2|0

4.|-2|1|-1|0

5.|-2|1|-3

Answer:4

Задача 559(b).

Доказать, что полином $f(x) = x^{2n+1} - (2n+1)x^{n+1} + (2n+1)x^n - 1$ имеет число 1 тройным корнем.

Решение: $f(x) = x^{2n+1} - (2n+1)x^{n+1} + (2n+1)x^n - 1$

$$x_1 = 1; \quad (1^{2n+1} - 1 * (2n+1) + (2n+1) * 1 - 1) = 0$$

$$f'(x) = (2n+1)x^{2n} - (2n+1)(n+1)x^n + n(2n+1)x^{n-1} = (2n+1)(x^{2n} - (n+1)x^n + n * x^{n-1});$$

$$x_2 = 1; ((2n+1)(1 - (n+1) * 1 + n)) = 0$$

$$f''(x) = (2n+1)(2n * x^{2n-1} - n(n+1)x^{n-1} + (n-1)n * x^{n-2})$$

$$x_3 = 1; 2n - n(n+1) * 1 + (n-1)n * 1 = 2n - n^2 - n + n^2 - n = 0$$

$$x_{1,2,3} = 1$$

Задача 569.

Доказать, что полином делится на свою производную в том и только том случае, когда он равен $a_0(x - x_0)^n$.

Решение:

$$P(x) = a_0(x - x_0)^n$$

$$P'(x) = a_0(x - x_0)^{n-1}$$

$$\frac{P(x)}{P'(x)} = \frac{a_0(x - x_0)^n}{a_0 * n * (x - x_0)^{n-1}} = \frac{x - x_0}{n}$$

Задача 570.

Доказать, что полином $f(x) = 1 + \frac{x}{1} + \frac{x^2}{1 \cdot 2} + \dots + \frac{x^n}{n!}$ не имеет кратных корней.

Решение:

Задача 114.

Решить уравнения и левые части их разложить на множители с вещественными коэффициентами:

a) $x^4 + 6x^3 + 9x^2 + 100 = 0$,

b) $x^4 + 2x^2 - 24x + 72 = 0$.

Решение: $x^4 + 6x^3 + 9x^2 + 100 = 0$ $x^4 + 6x^3 + 9x^2 + 100 = x^2(x^2 + 6x + 9) + 100 = (x(x+3))^2 + 100 = (x(x+3) + 10i)(x(x+3) - 10i)^*$

$$x^2 + 3x + 10i = 0$$

$$D = 9 - 40i$$

$$\sqrt{9 - 40i} = a + bi; a, b \in R$$

$$\begin{cases} a^2 - b^2 = 9; \\ 2ab = -40 \end{cases} \quad \begin{cases} a^2 - b^2 = 9; \\ ab = -20 \end{cases} \quad \begin{cases} a = -5; \\ b = 4 \end{cases} \quad \text{or} \quad \begin{cases} a = 5; \\ b = -4 \end{cases}$$

$$x_1 = \frac{-3 + (-5 + 4i)}{2} = -4 + 2i$$

$$x_2 = \frac{-3 + (5 - 4i)}{2} = 1 - 2i$$

$$* = (x - (-4 + 2i))(x - (-4 - 2i))(x - (1 - 2i))(x - (1 + 2i))$$

$$(x - \alpha)(x - \bar{\alpha}) = x^2 - 2\operatorname{Re}(\alpha)x + (\alpha)^2;$$

$$(x^2 + 8x + 20)(x^2 - 2x + 5)$$

Задача 2.

Разложить на неприводимые вещественные множители полиномы:

с) $x^4 + 4x^3 + 4x^2 + 1$,

д) $x^6 + 27$.

Решение: с) $x^4 + 4x^3 + 4x^2 + 1 = (x^2 + 2)^2 + 1 = (x^2 + 2)^2 - i^2 = (x + 2 - i)(x + 2 + i)$

д) $x^6 + 27 = (x^2)^3 + 27 = (x^2 + 3)(x^4 - 3x^2 + 9)$

$(x^2 + 3)$ — no solution

$(x^4 - 3x^2 + 9)$

$(t^2 - 3t + 9)$

$D = 9 - 4 * 9 = -27, D < 0$
