



## 2. Übungsblatt zur Vorlesung "Diskrete Strukturen für Informatiker"

### Mengen, Relationen

V. Zeigen Sie, dass für alle Teilmengen  $A, B$  einer festen Menge  $M$  gilt:

- $A \cap \overline{B} = A \setminus B$ ;  $\forall x: x \in A \cap \overline{B} \Leftrightarrow \exists k: (x \in A) \wedge (x \notin B) \Leftrightarrow (x \in A) \wedge (x \notin B) \Leftrightarrow (x \in A) \wedge \neg(x \in B) \Leftrightarrow \exists k: x \in A \setminus B$
- $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ .  $\forall x: x \notin (A \cap B) \Leftrightarrow \neg(x \in A \cap B) \Leftrightarrow \neg((x \in A) \wedge (x \in B)) \Leftrightarrow \neg(x \in A) \vee \neg(x \in B) \Leftrightarrow (x \notin A) \vee (x \notin B) \Leftrightarrow x \in \overline{A} \vee x \in \overline{B} \Leftrightarrow x \in \overline{A \cap B}$

Ü7. Überprüfen Sie für jede der folgenden Gleichungen, ob Sie für beliebige Teilmengen  $A, B, C$  einer festen Menge  $M$  richtig oder falsch sind. Geben Sie einen Beweis bzw. ein Gegenbeispiel an.

- (i)  $A \cap (B \setminus C) = (A \cap B) \setminus C$ ;  $A \cap (B \setminus C) = A \cap (B \cap \overline{C}) = (A \cap B) \cap \overline{C} = (A \cap B) \setminus C$
- (ii)  $(A \cup B) \setminus B = (A \setminus B) \cup B$ ;  $(A \cup B) \setminus B = (A \cap \overline{B}) \cup B = A \cap \overline{B} \cup B = A \cup B$
- (iii)  $A \setminus (A \setminus B) = A \cap B$ .  $A \setminus (A \setminus B) = A \cap \overline{(A \setminus B)} = A \cap \overline{(A \cap \overline{B})} = A \cap (\overline{A} \cup B) = (A \cap \overline{A}) \cup (A \cap B) = \emptyset \cup (A \cap B) = A \cap B$

- Ü8. (a) Geben Sie Beispiele für Relationen an, die zwei der Eigenschaften einer Äquivalenzrelation erfüllen, aber nicht die dritte.
- (b) Wie viele Äquivalenzrelationen gibt es auf einer vier- bzw. einer fünfelementigen Menge?

Hinweis: Sie können in (b) ausnutzen, dass sich jede Äquivalenzrelation  $R \subseteq M \times M$  durch ihre Äquivalenzklassen beschreiben lässt. Die Menge der Äquivalenzklassen  $M/R = \{[m]_R \mid m \in M\}$  bildet eine Partition von  $M$ .

Ü9. Untersuchen Sie, welche der folgenden Relationen  $R$  auf der jeweiligen Grundmenge  $A$  Äquivalenzrelationen sind. Bestimmen Sie gegebenenfalls die Äquivalenzklassen.

- (a)  $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, R = \{(1, 6), (2, 3), (2, 4), (3, 2), (3, 4), (4, 2), (4, 3), (6, 1)\} \cup \Delta_A$ ;
- (b)  $A = \mathbb{R}, R = \{(x, y) \mid \exists k \in \mathbb{Z}: x = y + 2k\pi\}$ ;  $(x, y) \in R \Leftrightarrow x = y + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow y = x - 2k\pi \Rightarrow (y, x) \in R \vee$   
 $(x, y) \in R \Leftrightarrow x = y + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x = y + 2k\pi \Rightarrow x = y + 2(k+1)\pi \Rightarrow (x, y) \in R$
- (c)  $A = \mathbb{R}, R = \{(x, y) \mid |x - y| < \pi\}$ ;
- (d)  $A = \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\}), R = \{(a, b), (c, d) \mid ad = bc\}$ .

Hinweis: Die Relation  $\Delta_A = \{(a, a) \mid a \in A\}$  bezeichnet die *identische Relation* auf  $A$ .

**A10. Hausaufgabe, bitte vor Beginn der 3. Übung (oder im Lernraum) unter Angabe von Name, Matrikelnummer, Übungsgruppe und Übungsleiter abgeben.**

- (a) Beweisen Sie, dass für beliebige Teilmengen  $A, B, C$  einer festen Menge  $M$  gilt:

$$(A \setminus B) \cap (A \setminus C) = A \setminus (B \cup C).$$

- (b) Zeigen Sie, dass der Durchschnitt zweier Äquivalenzrelationen auf einer festen Menge  $M$  wieder eine Äquivalenzrelation auf  $M$  ist.

- H11. (a) Es sei  $A = \{a, b\}$ ,  $B = \mathcal{P}(A)$ , und  $C = \mathcal{P}(B)$ . Welche der folgenden Aussagen sind wahr?

- (i)  $\{a\} \in A$ , (ii)  $\{a\} \in B$ , (iii)  $\{a\} \in C$ , (iv)  $\{\{a\}\} \subseteq B$ ,  
(v)  $\{\{a\}\} \in C$ , (vi)  $\{\emptyset\} \subseteq A$ , (vii)  $\{\emptyset\} \subseteq B$ , (viii)  $\{\emptyset\} \subseteq C$ .

- (b) Beweisen Sie, dass die folgenden Beziehungen

- (i)  $\mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A \cap B)$ ,  
(ii)  $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A \cup B)$

für beliebige Teilmengen  $A, B$  einer festen Menge  $M$  gelten. Gilt sogar Gleichheit? Begründen Sie!

- H12. Seien  $A, B, C$  Teilmengen einer festen Menge  $M$ .

- (a) Überprüfen Sie, ob die Differenz  $\setminus$  eine assoziative Mengenoperation ist, d.h. ob gilt:

$$A \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \setminus C.$$

- (b) Überprüfen Sie, ob die *symmetrische Differenz*  $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$  eine assoziative Mengenoperation ist, d.h. ob gilt:

$$A \Delta (B \Delta C) = (A \Delta B) \Delta C.$$