

第 11 回 複素フーリエ級数

今回の内容

複素フーリエ級数

第 3 章 フーリエ解析 §1

定義：複素フーリエ級数（周期 $2l$ ）

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\pi x/l}, \quad c_n = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(x) e^{-in\pi x/l} dx$$

$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ （オイラーの公式）より， $e^{in\pi x/l}$ は $\cos / \sin$ の代わりとして機能する

例題 6 (p. 88)

問題

次の周期 4 の関数 $f(x)$ の複素フーリエ級数を求めよ
 $f(x) = x + 1 (-2 \leq x < 2), f(x + 4) = f(x)$

例題6 解答 (1/3)

$$l=2 \text{ より } c_n = \frac{1}{4} \int_{-2}^2 (x+1)e^{-in\pi x/2} dx$$

$n=0$ のとき :

$$c_0 = \frac{1}{4} \left[\frac{x^2}{2} + x \right]_{-2}^2 = \frac{1}{4} \{ (2+2) - (2-2) \} = \frac{1}{4} \cdot 4 = 1$$

$n \neq 0$ のとき : 部分積分 $u = x+1$, $dv = e^{-in\pi x/2} dx$ より

$$du = dx, \quad v = \frac{-2}{in\pi} e^{-in\pi x/2}$$

$$\int_{-2}^2 (x+1)e^{-in\pi x/2} dx = \left[\frac{-2(x+1)}{in\pi} e^{-in\pi x/2} \right]_{-2}^2 + \frac{2}{in\pi} \int_{-2}^2 e^{-in\pi x/2} dx$$

例題6 解答 (2/3)

第2項の計算：

$$\int_{-2}^2 e^{-in\pi x/2} dx = \left[\frac{-2}{in\pi} e^{-in\pi x/2} \right]_{-2}^2 = \frac{-2}{in\pi} (e^{-in\pi} - e^{in\pi})$$

オイラーの公式 $e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i \sin \theta$ より

$$e^{-in\pi} - e^{in\pi} = -(e^{in\pi} - e^{-in\pi}) = -2i \sin(n\pi)$$

n は整数なので $\sin(n\pi) = 0$, よって

$$\frac{-2}{in\pi} \cdot (-2i \sin n\pi) = \frac{-2}{in\pi} \cdot 0 = 0$$

$$\therefore \text{第2項} = \frac{2}{in\pi} \cdot 0 = 0$$

例題6 解答 (3/3)

第1項 ($e^{\pm in\pi} = (-1)^n$ を代入) :

$$x = 2 \text{ のとき} : \frac{-2(2+1)}{in\pi} e^{-in\pi} = \frac{-6}{in\pi} \cdot (-1)^n = \frac{-6(-1)^n}{in\pi}$$

$$x = -2 \text{ のとき} : \frac{-2(-2+1)}{in\pi} e^{in\pi} = \frac{2}{in\pi} \cdot (-1)^n = \frac{2(-1)^n}{in\pi}$$

$$\therefore \left[\frac{-2(x+1)}{in\pi} e^{-in\pi x/2} \right]_{-2}^2 = \frac{-6(-1)^n}{in\pi} - \frac{2(-1)^n}{in\pi} = \frac{-8(-1)^n}{in\pi}$$

$$c_n = \frac{1}{4} \cdot \frac{-8(-1)^n}{in\pi} = \frac{-2(-1)^n}{in\pi} = \frac{2i(-1)^n}{n\pi} \quad -1/i = i \text{ を利用}$$

答 : $f(x) = 1 + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{2i(-1)^n}{n\pi} e^{in\pi x/2}$

自分で解いてみよう

問6 次の周期 2 の関数 $f(x), g(x)$ の複素フーリエ級数を求めよ

$$(1) f(x) = \begin{cases} 0 & (-1 \leq x < 0) \\ 1 & (0 \leq x < 1) \end{cases}, f(x+2) = f(x)$$

$$(2) g(x) = \begin{cases} 0 & (-1 \leq x < 0) \\ x & (0 \leq x < 1) \end{cases}, g(x+2) = g(x)$$

問7 次の周期 4 の関数 $f(x), g(x)$ の複素フーリエ級数を求めよ

$$(1) f(x) = \begin{cases} 2 & (-2 \leq x < 0) \\ 0 & (0 \leq x < 2) \end{cases}, f(x+4) = f(x)$$

$$(2) g(x) = \begin{cases} 0 & (-2 \leq x < 0) \\ 2-x & (0 \leq x < 2) \end{cases}, g(x+4) = g(x)$$

問6(1) 解答 (1/2)

$f(x) = 0$ ($-1 \leq x < 0$) より, 積分は $[0, 1]$ のみ寄与

$$l = 1 : c_n = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 f(x) e^{-in\pi x} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 e^{-in\pi x} dx$$

$$n = 0 : c_0 = \frac{1}{2} \int_0^1 dx = \frac{1}{2}$$

$$n \neq 0 : c_n = \frac{1}{2} \left[\frac{-e^{-in\pi x}}{in\pi} \right]_0^1 = \frac{-1}{2in\pi} (e^{-in\pi} - e^0) = \frac{1 - e^{-in\pi}}{2in\pi}$$

問6(1) 解答 (2/2)

$e^{-in\pi}$ の計算 (オイラーの公式 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ より) :

$$e^{-in\pi} = \cos(-n\pi) + i \sin(-n\pi) = \cos(n\pi) - i \sin(n\pi)$$

n は整数なので $\sin(n\pi) = 0$, よって $e^{-in\pi} = \cos(n\pi) = (-1)^n$

$$\text{代入: } c_n = \frac{1 - (-1)^n}{2in\pi}$$

$$\frac{1}{in} = \frac{-i}{n} \text{ を利用:}$$

$$c_n = \frac{-i(1 - (-1)^n)}{2n\pi} = \frac{i((-1)^n - 1)}{2n\pi}$$

$$\text{答: (1) } f(x) = \frac{1}{2} + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{i((-1)^n - 1)}{2n\pi} e^{in\pi x}$$

問6(2) 解答 (1/2)

$g(x) = 0$ ($-1 \leq x < 0$) より, 積分は $[0, 1]$ のみ寄与

$$l = 1 : c_n = \frac{1}{2} \int_0^1 x e^{-in\pi x} dx$$

$$n = 0 : c_0 = \frac{1}{2} \int_0^1 x dx = \frac{1}{4}$$

$$n \neq 0 : \text{部分積分 } u = x, dv = e^{-in\pi x} dx$$

$$du = dx, \quad v = \frac{-e^{-in\pi x}}{in\pi}$$

$$= \frac{1}{2} \left\{ \left[\frac{-xe^{-in\pi x}}{in\pi} \right]_0^1 + \frac{1}{in\pi} \int_0^1 e^{-in\pi x} dx \right\}$$

$$= \frac{1}{2} \left\{ \underbrace{\frac{-e^{-in\pi}}{in\pi}}_A + \frac{1}{in\pi} \underbrace{\left[\frac{-e^{-in\pi x}}{in\pi} \right]_0^1}_B \right\}$$

問6(2) 解答 (2/2)

$$A = \frac{-e^{-in\pi}}{in\pi} = \frac{-(-1)^n}{in\pi} = \frac{i(-1)^n}{n\pi} \quad -1/(in) = i/n \text{ を利用}$$

$$B = \left[\frac{-e^{-in\pi x}}{in\pi} \right]_0^1 = \frac{-1}{in\pi} (e^{-in\pi} - e^0) = \frac{1 - (-1)^n}{in\pi} \quad \text{よるので}$$

$$(in\pi)^2 = -n^2\pi^2 \text{ より}$$

$$\frac{1}{in\pi} \cdot B = \frac{1 - (-1)^n}{(in\pi)^2} = \frac{1 - (-1)^n}{-n^2\pi^2} = \frac{(-1)^n - 1}{n^2\pi^2}$$

$$c_n = \frac{1}{2} \left(\frac{i(-1)^n}{n\pi} + \frac{(-1)^n - 1}{n^2\pi^2} \right) = \frac{i(-1)^n}{2n\pi} + \frac{(-1)^n - 1}{2n^2\pi^2}$$

$$\text{答: (2) } g(x) = \frac{1}{4} + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \left[\frac{i(-1)^n}{2n\pi} + \frac{(-1)^n - 1}{2n^2\pi^2} \right] e^{in\pi x}$$

問7(1) 解答

$f(x) = 0$ ($0 \leq x < 2$) より, 積分は $[-2, 0]$ のみ寄与

$$l = 2 : c_n = \frac{1}{4} \int_{-2}^0 2 e^{-in\pi x/2} dx = \frac{1}{2} \int_{-2}^0 e^{-in\pi x/2} dx$$

$$n = 0 : c_0 = \frac{1}{2} \int_{-2}^0 dx = 1$$

$$n \neq 0 : c_n = \frac{1}{2} \left[\frac{-2 e^{-in\pi x/2}}{in\pi} \right]_{-2}^0$$

$$x = 0 \text{ のとき } \frac{-2}{in\pi} e^0 = \frac{-2}{in\pi}, \quad x = -2 \text{ のとき } \frac{-2}{in\pi} e^{in\pi} = \frac{-2(-1)^n}{in\pi}$$

$$c_n = \frac{1}{2} \left(\frac{-2}{in\pi} - \frac{-2(-1)^n}{in\pi} \right) = \frac{-1}{in\pi} (1 - (-1)^n) = \frac{i(1 - (-1)^n)}{n\pi}$$

$1/(in) = -i/n$ を利用

$$\text{答 : (1) } f(x) = 1 + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{i(1 - (-1)^n)}{n\pi} e^{in\pi x/2}$$

問7(2) 解答 (1/2)

$g(x) = 0$ ($-2 \leq x < 0$) より, 積分は $[0, 2]$ のみ寄与

$$l = 2 : c_n = \frac{1}{4} \int_0^2 (2 - x) e^{-in\pi x/2} dx$$

$$n = 0 : c_0 = \frac{1}{4} \left[2x - \frac{x^2}{2} \right]_0^2 = \frac{1}{4} \{ (4 - 2) - 0 \} = \frac{1}{2}$$

$n \neq 0$: 部分積分 $u = 2 - x$, $dv = e^{-in\pi x/2} dx$

$$du = -dx, \quad v = \frac{-2}{in\pi} e^{-in\pi x/2}$$

$$\int_0^2 (2 - x) e^{-in\pi x/2} dx = \underbrace{\left[\frac{-2(2 - x)}{in\pi} e^{-in\pi x/2} \right]_0^2}_A - \underbrace{\int_0^2 \frac{2}{in\pi} e^{-in\pi x/2} dx}_B$$

問7(2) 解答 (2/3)

A の計算 :

$$x = 2 \text{ のとき } 2 - x = 0 \text{ より } \frac{-2 \cdot 0}{in\pi} e^{-in\pi} = 0$$

$$x = 0 \text{ のとき } \frac{-2 \cdot 2}{in\pi} e^0 = \frac{-4}{in\pi}$$

$$A = 0 - \frac{-4}{in\pi} = \frac{4}{in\pi}$$

B の計算 : $\left[\frac{-2e^{-in\pi x/2}}{in\pi} \right]_0^2$ を評価 :

$$x = 2 \text{ のとき } \frac{-2e^{-in\pi}}{in\pi} = \frac{-2(-1)^n}{in\pi}, \quad x = 0 \text{ のとき } \frac{-2e^0}{in\pi} = \frac{-2}{in\pi}$$

$$\text{差} = \frac{-2(-1)^n}{in\pi} - \frac{-2}{in\pi} = \frac{-2((-1)^n - 1)}{in\pi} \text{ なので}$$

$$B = \frac{2}{in\pi} \cdot \frac{-2((-1)^n - 1)}{in\pi} = \frac{-4((-1)^n - 1)}{(in\pi)^2} = \frac{4((-1)^n - 1)}{n^2\pi^2}$$

$$(in\pi)^2 = -n^2\pi^2$$

問7(2) 解答 (3/3)

A, B を代入 :

$$\int_0^2 (2-x)e^{-in\pi x/2} dx = A - B = \frac{4}{in\pi} - \frac{4((-1)^n - 1)}{n^2\pi^2} =$$
$$\frac{4}{in\pi} + \frac{4(1 - (-1)^n)}{n^2\pi^2}$$

$$c_n = \frac{1}{4} \left(\frac{4}{in\pi} + \frac{4(1 - (-1)^n)}{n^2\pi^2} \right) = \frac{1}{in\pi} + \frac{1 - (-1)^n}{n^2\pi^2} =$$
$$-\frac{i}{n\pi} + \frac{1 - (-1)^n}{n^2\pi^2} \quad 1/(in) = -i/n \text{ を利用}$$

答 : (2) $g(x) = \frac{1}{2} + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \left[-\frac{i}{n\pi} + \frac{1 - (-1)^n}{n^2\pi^2} \right] e^{in\pi x/2}$