

第3回 微分法則と積分法則

本回の内容

微分法則と積分法則

第2章 ラプラス変換 §1

定理：原関数の微分法則

$$L[f'(t)] = sF(s) - f(0)$$

$$L[f''(t)] = s^2F(s) - sf(0) - f'(0)$$

$$L[f^{(n)}(t)] = s^nF(s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)$$

定理：像関数の高次微分

$$L[t^n f(t)] = (-1)^n F^{(n)}(s)$$

定理：原関数の積分法則

$$L\left[\int_0^t f(\tau)d\tau\right] = F(s)/s$$

定理：像関数の積分

$$L[f(t)/t] = \int_s^{\infty} F(u) du$$

例題 9

問題

微分法則を用いて $L[\cos t]$ を求めよ

例題 9 解答

$$f(t) = \sin t \text{ とおくと } f'(t) = \cos t, f(0) = 0$$

原関数の微分法則 $L[f'(t)] = sF(s) - f(0)$ を適用

$$L[\cos t] = s \cdot L[\sin t] - 0 = s \cdot 1/(s^2 + 1)$$

答 : $L[\cos t] = s/(s^2 + 1) \ (s > 0)$

例題 10

問題

$L[t^n]$ を求めよ（ n は正の整数）

例題 10 解答

$f(t) = t^n$ とおくと

$$f^{(n)}(t) = n!, f(0) = f'(0) = \dots = f^{(n-1)}(0) = 0$$

微分法則を n 回適用 : $s^n F(s) - 0 = L[n!] = n!/s$

答 : $L[t^n] = n!/s^{n+1} (s > 0)$

例題 11

問題

$L[\sin(\alpha t)/t]$ を求めよ (α は正の定数)

例題 11 解答

像関数の積分 : $L[f(t)/t] = \int_s^\infty F(u)du$ を利用

$L[\sin(\alpha t)] = \alpha/(u^2 + \alpha^2)$ なので

$$\begin{aligned} L[\sin(\alpha t)/t] &= \int_s^\infty \alpha/(u^2 + \alpha^2) du = [\arctan(u/\alpha)]_s^\infty \\ &= \pi/2 - \arctan(s/\alpha) \end{aligned}$$

答 : $L[\sin(\alpha t)/t] = \pi/2 - \arctan(s/\alpha) = \arctan(\alpha/s) \ (s > 0)$

自分で解いてみよう

問 13 $L[t \cos(\alpha t)]$ を求めよ

問 14 $f'(t) + 2f(t) = t, f(0) = 0$ を満たすとき、 $L[f(t)]$ を求めよ

問 15 $L[t^n]$ を求めよ（ n は正の整数）（像関数の高次微分を使用）

問 16 $L[(e^{2t} - e^t)/t]$ を求めよ

像関数の高次微分 : $L[t^n f(t)] = (-1)^n F^{(n)}(s)$ を $n = 1$ で使用

$$F(s) = L[\cos(\alpha t)] = s/(s^2 + \alpha^2)$$

$$F'(s) = d/ds[s/(s^2 + \alpha^2)] = (s^2 + \alpha^2 - 2s^2)/(s^2 + \alpha^2)^2 = (\alpha^2 - s^2)/(s^2 + \alpha^2)^2$$

$$L[t \cos(\alpha t)] = (-1)^1 \cdot F'(s) = -F'(s)$$

答 : $L[t \cos(\alpha t)] = (s^2 - \alpha^2)/(s^2 + \alpha^2)^2$

両辺をラプラス変換： $(sF(s) - f(0)) + 2F(s) = 1/s^2$

$f(0) = 0$ なので $(s + 2)F(s) = 1/s^2$

$$F(s) = 1/(s^2(s + 2))$$

部分分数： $1/(s^2(s + 2)) = A/s + B/s^2 + C/(s + 2)$

$$A = -1/4, B = 1/2, C = 1/4$$

$$F(s) = -1/(4s) + 1/(2s^2) + 1/(4(s + 2))$$

答： $f(t) = -1/4 + t/2 + (1/4)e^{-2t}$

$$f(t) = 1 \text{ とおくと } F(s) = L[1] = 1/s$$

$$F^{(n)}(s) = d^n/ds^n[1/s] = (-1)^n n! / s^{n+1}$$

$$L[t^n \cdot 1] = (-1)^n F^{(n)}(s) = (-1)^n \cdot (-1)^n n! / s^{n+1}$$

$$\text{答 : } L[t^n] = n! / s^{n+1} (s > 0)$$

像関数の積分 : $L[f(t)/t] = \int_s^\infty F(u)du$ を利用

$f(t) = e^{2t} - e^t$ とおくと

$$F(u) = L[e^{2t} - e^t]|_{s=u} = 1/(u-2) - 1/(u-1)$$

$$L[(e^{2t} - e^t)/t] = \int_s^\infty (1/(u-2) - 1/(u-1))du$$

$$= [\ln(u-2) - \ln(u-1)]_s^\infty$$

$$= \lim_{u \rightarrow \infty} \ln((u-2)/(u-1)) - \ln((s-2)/(s-1))$$

$$= 0 - \ln((s-2)/(s-1)) = \ln((s-1)/(s-2))$$

答 : $L[(e^{2t} - e^t)/t] = \ln((s-1)/(s-2)) \quad (s > 2)$