

Übung 10

Pascal Diller, Timo Rieke

January 7, 2025

Aufgabe 1

$$\begin{aligned}(a_n)_{n \in \mathbb{N}} &= \left(\frac{1 - n^2}{-1 - n} \right)_{n \in \mathbb{N}} = \frac{-(n^2 - 1)}{-(n + 1)} = \frac{(n^2 - 1)}{(n + 1)} \\ &= \frac{(n - 1)(n + 1)}{(n + 1)} = n - 1\end{aligned}$$

Die Folge ist nach unten beschränkt durch -1 aber nach oben unbeschränkt. Außerdem ist die Folge $a_n = n - 1$ für $n \in \mathbb{N}$ streng monoton wachsend.

Aufgabe 2

$$b_n = 6 - \left(\frac{6 + n^2}{n} \right)$$

Vereinfachen der Folge:

$$b_n = 6 - \left(\frac{6}{n} + \frac{n^2}{n} \right) = 6 - \left(\frac{6}{n} + n \right) = 6 - \frac{6}{n} - n$$

(i)

$$\begin{aligned}\frac{6}{n} &\text{ geht gegen } 0, \text{ wenn } n \rightarrow \infty \\ -n &\text{ geht gegen } -\infty, \text{ wenn } n \rightarrow \infty\end{aligned}$$

Somit konvergiert b_n gegen $-\infty$, was bedeutet das die Folge nach unten unbeschränkt ist und nach oben mit 6 beschränkt ist.

(ii)

$$B_n = b_{n+1} - b_n$$

Berechnen von B_n :

$$B_n = b_{n+1} - b_n = \left(6 - \frac{6}{n+1} - (n+1) \right) - \left(6 - \frac{6}{n} - n \right)$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{6}{n+1} + \frac{6}{n} - 1 = \frac{6n - 6(n+1)}{n(n+1)} - 1 = \frac{6n - 6n - 6}{n(n+1)} - 1 \\
&= \frac{-6}{n(n+1)} - 1
\end{aligned}$$

Da $\frac{-6}{n(n+1)} - 1$ für alle $n \in \mathbb{N}$ negativ ist, ist $B_n < 0$.

(iii)

Da $B_n < 0$ für alle $n \geq 1$ ist die Folge streng monoton fallend ab $n = 1$. Somit ist der minimale Wert für m und l : $m = 1, l = 1$

Aufgabe 3

$$(c_n)_{n \in \mathbb{N}} = \frac{A}{2n^3 - 15n} + B$$

Sei $a_n = \frac{A}{2n^3 - 15n}$. Da A eine konstante reelle Zahl ist und $2n^3 - 15n$ mit steigendem n ebenfalls steigt, gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 0 + B$$

Da B eine konstante reelle Zahl ist, konvergiert c_n auf B .

Aufgabe 5

(ii)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{n+1} = 1 - \frac{2}{n+1}$$

Seien $a = 1, a_n = \frac{n-1}{n+1}, b_n = \frac{2}{n+1}$.

Aus (i) gilt: $|a_n - a| \leq b_n$ und b_n ist eine Nullfolge.

Also gilt: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{n+1} = 1$

(iv)

(v)

Es gilt: $|\cos(n)| \leq 1$, also: $|a_n| = \left| \frac{\cos(n)}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$

$\frac{1}{n^2}$ ist eine Nullfolge, dann ergibt sich aus dem Sandwichkriterium, dass $\frac{\cos(n)}{n^2}$ auf 0 konvergiert.