



- CONJUNCTION INTRODUCTION

SE P_1 VERA E P_2 VERA,
 $P_1 \wedge P_2$ VERA




- CONJUNCTION ELIMINATION

PERCHÉ $P_1 \wedge \dots \wedge P_n$ SIA VERA, TUTTI
 I VALORI DI VERITÀ DELLE SINGOLE
 PROPOSIZIONI BISOGNA SIANO VERA. QUINDI
 SI PUÒ ASSUMERE QUALSIASI P_i VERA



• DISJUNCTION INTRODUCTION

⊕



SE P_i È VERA, NON IMPORTA
IL VALORE DI VERITÀ DI UNA
PROPOSIZIONE, $P_i \vee P_j$ SARÀ VERA

• DISJUNCTION ELIMINATION

⊖




=
RAGIONAMENTO PER CASI

SE P_i OPPURE P_j È VERA, SE
ASSUMENDO (IN SOTTOPRONE) CHE
SIANO VERE CONCLUDO LA STESSA
PROPOSIZIONE S , ALLORA POSSO
CONCLUDERE S DA $P_i \vee P_j$


- NEGATION ELIMINATION

Ⓢ



- NEGATION INTRODUCTION

Ⓢ



=

PROVA PER ASSURDO



SE ASSUMO P VERA E


ARRIVO A CONCLUDERE $\perp$

(GRAZIE AL CONTESTO/PREMESSE),

ALLORA $\neg P$ È VERA

- ABSURD INTRODUCTION

Ⓢ



• ABSURD ELIMINATION

Ⓢ



DALL' ASSURDO SI PUÒ CONCLUDERE

QUALSIASI PROPOSIZIONE SI VUOLIA.

(CONTRASTO ALL'IMPLICAZIONE: SE

PREMESSE FALSE, CONCLUSIONE SIA

VERA CHE FALSA NON CAMBIA

IL VALORE DELL'IMPLICAZIONE (VERA)