COLEGIO OFICIAL DE
FARMACÉUTICOS
DE CANTABRIA

Calle Castilla, 13 – 7ª planta
39009 – SANTANDER
Tel. 942 31 44 18 –Fax 942 22 02 60

cofcantabria@cofcantabria.org
www.cofcantabria.org

CIM

02/19

FARMACOVIGILANCIA

VITAMINA D: ERRORES EN PAUTA POSOLÓGICA

Según nota informativa emitida por la AEMPS el pasado 19 de marzo de 2019, siguen notificándose, a pesar de ser sobradamente conocido, casos de hipercalcemia asociados a errores en la pauta posológica de vitamina D.

La administración de vitamina D a dosis altas o durante largos períodos de tiempo puede producir hipercalcemia, hipercalciuria, hiperfosfatemia e insuficiencia renal, siendo los lactantes y niños pequeños más susceptibles a las intoxicaciones.

Los síntomas iniciales de la intoxicación son variados y, en ocasiones, poco específicos y pueden manifestarse como **debilidad, fatiga, somnolencia, cefalea, anorexia, sequedad de boca, sabor metálico, náuseas, vómitos, espasmos abdominales, poliuria, polidipsia, nicturia, estreñimiento o diarrea, vértigos, tinnitus, ataxia, exantema, hipotonía, sobre todo en niños, dolor muscular u óseo e irritabilidad**. Entre los síntomas más tardíos están, entre otros, insuficiencia renal, osteoporosis en adultos, retardo del crecimiento en niños, pancreatitis, hipercolesterolemia o calcificación vascular y de tejidos blandos.

Se han notificado casos graves de hipercalcemia derivados de una administración de dosis diarias muy superiores a las recomendadas en niños y a errores asociados a la utilización diaria de presentaciones que se deben pautar solamente una vez al mes en el caso de adultos.

Por este motivo se recuerda que los farmacéuticos deben:

1. Identificar el paciente: niño o adulto
2. Comprobar que la pauta posológica prescrita se corresponde con la utilizada por el paciente: diaria o cada 6-8 semanas en niños; diaria, mensual o única en adultos.
3. Verificar que la forma farmacéutica concuerda con la pauta posológica prescrita
4. Asegurar que el paciente comprende la dosificación que tiene que emplear según la forma farmacéutica prescrita.

Con el fin de facilitar la dispensación se adjunta algoritmo que recoge, de forma sencilla, los criterios más importantes a tener en cuenta cuando se recibe una prescripción de vitamina D.

Disponible en www.cofcantabria/CIM/Farmacovigilancia

Santander 11 de junio de 2019

LACTANTES Y NIÑOS

Colecalciferol

Ingerir la **dosis completa** directamente o mezclada con una pequeña cantidad de alimentos fríos o templados incluidos lácteos

- PAUTA POSOLÓGICA **DIARIA** → **GOTAS ORALES**
  - Vitamina D3 Kern Pharma® **2.000 UI/ml** (3 gotas equivalen a 0.1 ml y a 200UI)
  - Deltius® / Thorens® **10.000 UI/ml** (1 gota equivale a 200 UI)
- PAUTA POSOLÓGICA **CADA 6-8 SEMANAS** (en aquellos casos en que no es posible la administración diaria) → **AMPOLLAS BEBIBLES**
  - Videsil® **25.000 UI** (única autorizada en ficha técnica para niños): Agitar antes de usar

ADULTOS

Calcifediol

Ingerir la **dosis completa** directamente o mezclada con una pequeña cantidad de alimentos fríos o templados incluidos lácteos

- PAUTA POSOLÓGICA **DIARIA** → **GOTAS ORALES**
  - Hidroferol® **0.1 mg/ml.** Agitar antes de usar (25 gotas equivalen a 1 ml y a 6.000 UI)
- PAUTA POSOLÓGICA **MENSUAL** → **CÁPSULAS/AMPOLLAS**
  - Hidroferol® **0.266 mg** (equivalen a 16.000 UI)
- PAUTA POSOLÓGICA **ÚNICA** → **AMPOLLAS BEBIBLES**
  - Hidroferol® choque **3 mg** (equivalen a 180.000 UI)