

Médicaments pour la perte de poids — Wegovy et Contrave

Partie 1 — Wegovy (sémaglutide)

Objectif du traitement

Wegovy est utilisé pour favoriser la perte de poids en diminuant l'appétit, en augmentant la sensation de satiété et en ralentissant la vidange de l'estomac.

Nature du traitement et coût

Le traitement est généralement chronique afin de maintenir les bénéfices sur le poids.

Le coût moyen sans assurance est d'environ 450 \$ par mois.

Des versions génériques sont disponibles depuis l'été 2026, ce qui peut réduire les coûts.

Effets secondaires fréquents (attendus)

Ces effets sont généralement transitoires et surviennent surtout au début ou lors de l'augmentation des doses.

Digestifs :

- Nausées : 16–20 %
- Diarrhée : 10 %
- Vomissements : 5–9 %
- Douleurs abdominales : 6–11 %
- Constipation : 3–6 %
- Ballonnements : 2–3 %
- Gaz : 1–2 %
- Reflux : 2 %
- Dyspepsie : 3–4 %

Autres :

- Augmentation de la lipase : 22–34 % (habituellement sans conséquence)
- Hypoglycémie : 2–4 % (surtout si diabète traité)
- Fatigue / étourdissements : 0–1 %
- Réaction au site d'injection : 0–1 %

Conseils pour améliorer la tolérance

- Manger lentement et en petites quantités
- Éviter les repas gras au début
- Respecter la montée progressive des doses
- Maintenir une bonne hydratation

Effets rares mais importants

Pancréatite : complication rare mais potentiellement grave

La pancréatite est un effet secondaire rare du Wegovy, mais il est important de savoir que, dans certains cas, elle peut entraîner des complications sérieuses.

- Dans environ 80 % des cas, la pancréatite est légère et guérit sans séquelles.
- Cependant, dans 10 à 20 % des cas, elle peut devenir plus sévère.

Complications notables :

- Infection sévère (sepsis) : environ 5 à 10 % des cas — nécessite une hospitalisation
- Risque de décès : environ 2 à 5 % globalement, mais jusqu'à 20 à 30 % dans les formes sévères

Calculs biliaires (~2 %)

Associés à la perte de poids rapide. Douleur sous les côtes à droite après les repas.

Rétinopathie (chez patients diabétiques)

Peut survenir si amélioration rapide de la glycémie. Symptômes visuels à surveiller.

Cancer de la thyroïde (très rare, non démontré chez l'humain)

Signal observé chez les animaux. Éviter si antécédent personnel/familial de carcinome médullaire thyroïdien ou MEN2.

Quand consulter rapidement

- Douleur abdominale sévère persistante
- Vomissements importants ou déshydratation
- Troubles visuels
- Masse au cou ou difficulté à avaler

Suivi recommandé

Un suivi médical régulier est nécessaire pour ajuster la dose, surveiller la tolérance et évaluer les bénéfices.

Partie 2 — Contrave (naltrexone/bupropion)

Objectif du traitement

Contrave combine deux médicaments (la naltrexone et le bupropion) qui agissent ensemble sur les centres de la faim et de la récompense du cerveau. Il diminue l'appétit et aide à contrôler les fringales et l'envie de manger « émotionnelle ». Il est utilisé en complément — et non en remplacement — d'une alimentation réduite en calories et d'une activité physique accrue, pour la gestion du poids à long terme.

Nature du traitement et coût

Le traitement est généralement chronique afin de maintenir les bénéfices sur le poids. Il s'agit de comprimés (aucune injection).

- Coût sans assurance : environ 280 à 450 \$ par mois selon la pharmacie (le plus souvent 320 à 380 \$).
- Non couvert par la RAMQ ni les régimes publics; la plupart des assurances privées le couvrent — vérifiez auprès de votre assureur.
- Aucune version générique n'est disponible actuellement. Dans certains cas, votre médecin peut discuter d'alternatives moins coûteuses.

Efficacité attendue

Contrave produit une perte de poids **modeste**. Dans les études, la perte supplémentaire attribuable au médicament est d'environ 4 à 5 % du poids initial après un an, et environ un patient sur deux perd au moins 5 % de son poids. Les résultats sont nettement meilleurs lorsque le médicament est combiné à un encadrement alimentaire et comportemental soutenu (jusqu'à ~9 % de perte). Chez les personnes diabétiques, la perte est d'environ 5 %, avec une légère amélioration du contrôle de la glycémie.

Contrave est moins puissant que les médicaments injectables de type GLP-1 (ex. : Wegovy). En revanche, il se prend en comprimés et coûte moins cher que la plupart des autres médicaments de perte de poids.

Si la perte de poids est inférieure à 5 % après environ 16 semaines de traitement (dont 12 semaines à la dose complète), il est recommandé de cesser le médicament, car les chances de bénéfice significatif sont alors faibles.

Effets secondaires fréquents

NB : la monographie du médicament contient la liste complète. Les effets ci-dessous sont les plus fréquents (pourcentages observés sous Contrave dans les études) :

- Nausées : ~33 % (l'effet le plus fréquent) • Constipation : ~19 % • Maux de tête : ~18 %
- Vomissements : ~11 % • Étourdissements : ~10 % • Insomnie : ~9 % • Bouche sèche : ~8 %

Ces effets surviennent surtout au début du traitement et lors des augmentations de dose, puis s'atténuent souvent avec le temps. Dans les études, environ 1 patient sur 4 a cessé le médicament en raison d'effets indésirables — n'hésitez pas à consulter avant d'arrêter, un ralentissement de la titration aide souvent.

Conseils pour améliorer la tolérance

- Respectez la montée progressive des doses, sans devancer les étapes
- Prenez les comprimés avec une collation ou un repas léger (jamais un repas gras)
- Hydratez-vous bien; augmentez les fibres en cas de constipation

Avertissements importants

- **Opioïdes** : la naltrexone bloque l'effet des opioïdes. Les analgésiques opioïdes (morphine, codéine, oxycodone, etc.) seront **inefficaces** durant le traitement, et leur usage peut être dangereux. Mentionnez que vous prenez Contrave à tout médecin, dentiste ou en cas de chirurgie ou d'urgence.
- **Convulsions** : le bupropion abaisse le seuil convulsif (risque rare aux doses usuelles).
- **Pression artérielle et pouls** : légère augmentation possible. Une surveillance de la pression est recommandée au début du traitement, puis régulièrement (par exemple en pharmacie).
- **Foie** : consultez si le teint de votre peau est jaune, si vos urines sont foncées ou en cas de douleur importante au côté droit de l'abdomen.

- **Humeur et idées suicidaires** : le bupropion (un antidépresseur) peut, rarement, provoquer des changements d'humeur, de l'agitation ou des idées suicidaires, surtout chez les jeunes adultes en début de traitement.

Contre-indications — informez votre médecin si vous présentez :

- Hypertension artérielle non contrôlée
- Épilepsie ou antécédent de convulsions
- Anorexie ou boulimie (actuelle ou passée)
- Sevrage récent d'alcool, de benzodiazépines ou d'antiépileptiques
- Usage d'opioïdes (analgésiques, méthadone, etc.)
- Prise d'un IMAO dans les 14 derniers jours
- Grossesse ou allaitement
- Autre médicament contenant du bupropion (Wellbutrin, Zyban) — ne pas combiner

Pour qui ce médicament peut-il être un bon choix ?

Contrave peut être particulièrement intéressant si vous présentez une dépression concomitante, si vous souhaitez arrêter de fumer (le bupropion aide au sevrage tabagique), ou si vos difficultés de poids sont surtout liées aux fringales et à l'alimentation émotionnelle. La prudence est de mise après 65 ans (sensibilité accrue aux effets sur le système nerveux). À considérer : le traitement exige 4 comprimés par jour.

Quand consulter rapidement

- Changement inhabituel de l'humeur ou du comportement (remarqué par vous ou vos proches), agitation ou idées noires — consultez sans tarder
- Convulsion
- Réaction allergique (enflure du visage, urticaire, difficulté à respirer)
- Mal de tête intense avec pression très élevée, douleur thoracique ou palpitations soutenues
- Teint jaune ou douleur abdominale importante

Suivi recommandé

Un suivi médical régulier est nécessaire : surveillance de la pression artérielle, évaluation de la perte de poids et de la tolérance, et réévaluation de la pertinence du traitement vers 16 semaines, puis périodiquement.