

Psychostimulants pour le TDAH : informations pertinentes.

Classes de médication

Deux classes principales de psychostimulants sont utilisées en première ligne pour le TDAH :

- Dérivés de méthylphénidate (ex : Concerta, Biphentin)
- Dérivés de sels d'amphétamines (ex : Vyvanse, Adderall)

Les deux classes sont sécuritaires et efficaces, mais la réponse est individuelle. Environ un tiers des patients répondent mieux à la classe du méthylphénidate, un tiers répondent mieux à la classe des dérivés d'amphétamines, et un tiers répondent bien aux deux. Il est donc nécessaire de déterminer la meilleure médication pour chaque individu par essai-erreur.

Les tests génétiques disponibles à cet effet ne sont pas toujours associés à des résultats cliniquement pertinents et ne prédisent pas fidèlement la réponse individuelle au traitement.

Prise du médicament

Les psychostimulants se prennent généralement une fois par jour, le matin. Leur durée d'action moyenne est d'environ 12 heures, donc il est recommandé de prendre la médication au lever afin d'éviter de nuire au sommeil.

Si vous oubliez une dose et qu'il est déjà tard dans la journée, il est souvent préférable de ne pas la prendre afin d'éviter l'insomnie.

Processus de titration

Certains patients n'ont besoin que de très faibles doses, alors que d'autres nécessitent des doses modérées à élevées. Pour cette raison, le traitement est généralement débuté à faible dose avec une augmentation graduelle.

Le traitement est habituellement initié à une très faible dose avec une augmentation hebdomadaire. Le but est de trouver la dose minimale efficace permettant d'optimiser l'attention et le fonctionnement tout en minimisant les effets secondaires.

Durant le premier mois, la prescription peut être envoyée à la pharmacie sous forme de titration progressive et peut être servie chaque semaine par le pharmacien.

Un suivi est habituellement prévu environ un mois plus tard afin d'évaluer l'efficacité à une dose modérée. Cela permet de déterminer si une augmentation de dose ou un changement de classe de médication est nécessaire.

Il est possible qu'aux premières doses, vous ne ressentiez aucun effet. Cela ne signifie pas que la médication n'est pas appropriée pour vous, mais plutôt que la dose est possiblement encore trop faible. Il est important d'être patient et d'attendre d'avoir atteint une dose modérée avant de tirer des conclusions.

La titration doit être poursuivie tant que la médication est bien tolérée. Si une dose initiale semble déjà très efficace, il est également adéquat d'aviser le pharmacien afin de conserver cette dose jusqu'au suivi médical.

Bénéfices attendus

Les bénéfices recherchés incluent une meilleure concentration, une meilleure capacité à commencer et terminer les tâches, moins d'oublis, une meilleure gestion du temps, une diminution de l'impulsivité et une réduction de la distractibilité.

Certaines personnes notent aussi une meilleure stabilité émotionnelle, moins de chaos mental et une meilleure efficacité au travail ou aux études.

Les bénéfices devraient être perceptibles dans la vie quotidienne : moins d'erreurs, meilleure productivité, meilleure organisation et meilleur contrôle des comportements impulsifs.

Café/thé/boissons énergisantes et autres substances

Il est recommandé de limiter le café (par exemple : 2 petits cafés ou thé par jour, mais pas les deux) et d'éviter complètement les boissons énergisantes et les autres stimulants (préworkout, etc.) durant la prise du médicament.

Ces produits, combinés aux psychostimulants, peuvent augmenter les effets secondaires comme les palpitations, l'anxiété, les tremblements, l'insomnie ou la hausse de la pression artérielle. Rarement, une consommation excessive de caféine ou de stimulants peut déclencher des arythmies plus sérieuses nécessitant une évaluation médicale urgente.

Il est également recommandé d'éviter les drogues récréatives (incluant le cannabis) durant le traitement.

La consommation d'alcool devrait également être limitée durant le traitement.

Surveillance de la pression artérielle

Les psychostimulants peuvent légèrement augmenter la pression artérielle et la fréquence cardiaque au repos chez certains patients.

Une légère augmentation de la fréquence cardiaque au repos peut survenir et est habituellement non ressentie et sans danger.

Les palpitations sont moins fréquentes mais possibles. Si elles deviennent inconfortables (cœur battant rapidement mais régulièrement) ou semblent irrégulières/désorganisées (plus rare), une évaluation médicale rapide est recommandée.

Une surveillance de la pression artérielle est recommandée durant le traitement, particulièrement au début et lors des augmentations de dose.

Une fois la dose stable, il est recommandé de vérifier la pression artérielle environ une fois par mois en pharmacie. Consultez si plusieurs valeurs sont répétitivement élevées au-dessus de 135/85 mm Hg.

Effets secondaires fréquents

NB : La monographie du médicament contient la liste complète des effets secondaires possibles. Les effets mentionnés ci-dessous sont les plus fréquents ou les plus pertinents cliniquement. Ce document ne remplace pas la monographie officielle, qui peut être consultée pour plus d'informations.

Les effets secondaires les plus fréquents incluent :

- Diminution de l'appétit (le plus fréquent)
- Bouche sèche
- Céphalées légères/transitoires (habituellement légères et temporaires. Le Tylenol peut être utilisé au besoin.)
- Augmentation de l'anxiété chez certains patients

Conseils pour la diminution de l'appétit

- Prendre un déjeuner et un souper plus copieux
- Prendre des collations fréquentes
- Considérer des suppléments nutritionnels au besoin (ex : Boost)

La plupart des effets secondaires sont plus présents au début du traitement ou après une augmentation de dose, puis diminuent avec le temps.

Vous devriez aviser votre médecin si les effets secondaires deviennent importants, persistants ou nuisent au fonctionnement quotidien.

Effets secondaires rares mais importants

Consultez rapidement si vous présentez :

- Douleur thoracique
 - Palpitations soutenues ou irrégulières
 - Essoufflement inhabituel
 - Syncope
 - Changement important de l'humeur
-

Contre-indications / antécédents importants à mentionner

Les conditions suivantes constituent des contre-indications aux psychostimulants :

- Maladie cardiaque structurelle connue
- Antécédents d'arythmie cardiaque
- Syncope inexpliquée
- Douleur thoracique ou symptômes à l'effort
- Hypertension artérielle mal contrôlée
- Glaucome
- Hyperthyroïdie

Vous devez également informer votre médecin de tout antécédent familial de mort subite ou d'arythmie.

Il est aussi important de mentionner tout antécédent personnel de :

- Psychose
- Trouble bipolaire
- Trouble d'usage de substances
- Convulsions
- Trouble alimentaire
- Anxiété ou dépression

Les autres médicaments ainsi que les produits de santé naturels doivent également être divulgués.

Ne prenez pas de décongestionnants nasaux contenant de la pseudoéphédrine durant le traitement par psychostimulant.

Si vous avez un doute concernant une interaction médicamenteuse, votre pharmacien est une ressource appropriée.

Comment savoir si la dose est bonne ?

Une bonne dose devrait entraîner une amélioration claire des symptômes sans vous rendre “trop stimulé”.

Vous devriez vous sentir plus fonctionnel, plus organisé et plus concentré, mais non euphorique, nerveux ou agité.

Ceci sera réévalué lors du suivi médical.