

Wegovy (sémaglutide) – Information patient

Objectif du traitement

Wegovy est utilisé pour favoriser la perte de poids en diminuant l'appétit, en augmentant la sensation de satiété et en ralentissant la vidange de l'estomac.

Nature du traitement et coût

Le traitement est généralement **chronique** afin de maintenir les bénéfices sur le poids.

Le coût moyen sans assurance est d'environ **450 \$ par mois**.

Des versions génériques sont attendues vers **2026**, ce qui pourrait réduire les coûts, mais elles ne sont pas encore disponibles sur le marché.

Effets secondaires fréquents (attendus)

Ces effets sont généralement transitoires et surviennent surtout au début ou lors de l'augmentation des doses.

Digestifs :

- Nausées : 16–20 %
- Diarrhée : 10 %
- Vomissements : 5–9 %
- Douleurs abdominales : 6–11 %
- Constipation : 3–6 %
- Ballonnements : 2–3 %
- Gaz : 1–2 %
- Reflux : 2 %
- Dyspepsie : 3–4 %

Autres :

- Augmentation de la lipase : 22–34 % (habituellement sans conséquence)
- Hypoglycémie : 2–4 % (surtout si diabète traité)
- Fatigue / étourdissements : 0–1 %
- Réaction au site d'injection : 0–1 %

Conseils pour améliorer la tolérance

- Manger lentement et en petites quantités
- Éviter les repas gras au début
- Respecter la montée progressive des doses
- Maintenir une bonne hydratation

Secondaires

Effets rares mais importants

Pancréatite : complication rare mais potentiellement grave

La pancréatite est un effet secondaire rare du Wegovy, mais il est important de savoir que, dans certains cas, elle peut entraîner des complications sérieuses.

- Dans environ **80 % des cas**, la pancréatite est légère et guérit sans séquelles.
- Cependant, dans **10 à 20 % des cas**, elle peut devenir plus sévère.

Complications notables :

- Infection sévère (sepsis) : environ **5 à 10 % des cas**
→ nécessite une hospitalisation
- Risque de décès : environ **2 à 5 % globalement**, mais jusqu'à **20 à 30 % dans les formes sévères**

Calculs biliaires (~2%)

Associés à la perte de poids rapide. Douleur sous les côtes à droite après les repas.

Rétinopathie (chez patients diabétiques)

Peut survenir si amélioration rapide de la glycémie. Symptômes visuels à surveiller.

Cancer de la thyroïde (très rare, non démontré chez l'humain)

Signal observé chez les animaux. Éviter si antécédent personnel/familial de carcinome médullaire thyroïdien ou MEN2.

Quand consulter rapidement

- Douleur abdominale sévère persistante
- Vomissements importants ou déshydratation
- Troubles visuels
- Masse au cou ou difficulté à avaler

Suivi recommandé

Un suivi médical régulier est nécessaire pour ajuster la dose, surveiller la tolérance et évaluer les bénéfices.