

Teoria dei Sistemi e del Controllo
Prova in itinere 23-12-2020

Numero di matricola

| | | | | | |
|---|---|----------|---------|----------|----------|
| | | | | | |
| — | — | α | β | γ | δ |

1. Dato il sistema lineare tempo continuo caratterizzato dalla matrice dinamica

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -(\gamma + 1) & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -(\gamma + 1) \end{pmatrix}$$

- (a) Calcolare i modi del sistema;
- (b) Determinare la struttura della matrice in forma di Jordan associata ad A e la corrispondente matrice di trasformazione;
- (c) Determinare le condizioni iniziali $x(0)$ tale per cui l'evoluzione libera del sistema evolve in un piano;
- (d) Date le matrici di ingresso e uscita $B = (1, 0, 0, 1, 0)^T$ e $C = (1, 0, 0, 0, 1)$ determinare la matrice di trasformazione per portare il sistema nella forma canonica di Kalman.

2. Dato il sistema dinamico lineare tempo discreto caratterizzato dalla matrice dinamica

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -(\delta + 1) & 0 \\ \delta + 1 & -2(\delta + 1) & 0 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$C = (0 \quad 1 \quad 0)$$

- (a) Determinare se e da quali condizioni iniziali è possibile raggiungere lo stato $x(k) = (0, 0, \gamma + 1)^T$.
- (b) Determinare se e da quali condizioni iniziali è possibile raggiungere lo stato $x(k) = (0, 0, 0)^T$.
- (c) Calcolare una base dello spazio raggiungibile e calcolarne gli autovalori interni;
- (d) Determinare se è possibile riconoscere se il sistema è partito dalle condizioni iniziali $x(0) = (\alpha, \beta, \gamma + 1)^T$ e $\tilde{x}(0) = (\alpha, \beta, \delta + 10)^T$ conoscendo gli ingressi e le uscite del sistema.
- (e) Calcolare una base dello spazio non osservabile e calcolarne gli autovalori interni;
- (f) Determinare la forma della funzione di trasferimento del sistema.