


Rhombenporphyr

Karteikarte Gesteine

Gesteinstyp	Eruptivgestein
Zusammensetzung	tlw. hoher Anteil Feldspat (Plagioklas) in gut ausgebildeten großen Kristallen (weiß, gelb, orange bis braun, grau, tlw. mit Zonierung) in einer feinkörnigen Grundmasse (gelb bis braun, violett oder grau) saurer bis intermediärer Zusammensetzung. Die Schnittflächen der Kristalle an den Oberflächen wirken schiffchenförmig oder rhombenförmig, teilweise auch rechteckig.
Herkunft/Vorkommen	Oslograben, Kebnekaise (Nordschweden), Kilimandscharo, Mount Erebus (Antarktis)
Fundmöglichkeiten	Als Geschiebe aus dem Oslogebiet in Dänemark, bes. Westjütland und Norddeutschland
Alter	275-295 Mill. Jahre
Entstehung	Während der Bildung des westeuropäischen Riftsystems im Perm kam im Gebiet des heutigen Oslograbens zum Absinken der Landmassen, verbunden mit vulkanischer Aktivität. Das dabei zur Erdoberfläche beförderten Magma war bereits soweit abgekühlt, dass sich Feldspatkristalle gebildet hatten, welche in der flüssigen Magmamasse „schwammen“. Die folgende schnelle Abkühlung der restlichen Masse ließ den restlichen Mineralbestandteilen keine Zeit zur Ausbildung makroskopischer Kristalle.
Bedeutung	Rhombenporphyre sind Leitgeschiebe, welche zur Rekonstruktion der Eisbewegungen des europäischen Quartärs benutzt werden können. Im Oslogebiet konnten ca. 30 Lavaströme aus Rhombenporphyr identifiziert werden, ähnlich viele Varianten des Gesteins wurden definiert. Aufgrund der sehr variablen Ausprägung ist die Zuordnung einzelner Funde zu den Varianten häufig schwierig. Das äquivalente Tiefengestein zum Rhombenporphyr ist Larvikit.



RP1 Kronsbergen-Typ



RP5



RP9



RP12



RP12a



RP13c Rektangelporphyr



RP13v



RP14a Langtang-Typ

Quellen:
- Mineralienatlas
- Wikipedia