Aandachttraining op het werk: wat het onderzoek laat zien

Innerleaps · versie 29 oktober 2026 · vervangt "The Business Case for Awareness Interventions"

Dit document zet de cijfers op een rij die we voor aandachttraining gebruiken. Elk cijfer staat letterlijk in de bron die erbij staat. Bij elk cijfer staat ook om wat voor onderzoek het gaat, en bij wie het gemeten is. Eigen rekensommen en schattingen staan er niet in.

1. Onderzoek bij anderen

Deze cijfers komen uit studies naar aandachttraining. Ze zijn niet bij deelnemers van Innerleaps gemeten. Resultaten verschillen per organisatie.

Cijfer	Wat	Soort onderzoek	Bron
-69%	Ziektedagen in de afgelopen 3 maanden, trainingsgroep (4,57 naar 1,40). Controlegroep: 3,84 naar 3,69. Zelf ingevuld, nameting na ongeveer 3 maanden.	Gerandomiseerd, 144 middenmanagers in Polen, training van 8 weken (sessies van 3 uur plus een dag)	Żołnierczyk-Zreda e.a., 2016
54,4% → 16,4%	Aandeel deelnemers met een verhoogd risico op langdurige uitval door ziekte, 6 maanden na de training.	Niet gerandomiseerd, 150 medewerkers van Unilever, 8 weken; eigen wachtlijstperiode als vergelijking	De Bruin e.a., 2018
89,8%	Wilde na afloop blijven oefenen, van wie de vraag beantwoordde (58,7% van alle deelnemers).	Zelfde studie	De Bruin e.a., 2018
-26,4%	Ervaren stress in de getrainde groep, direct na de training (-23,1% na 6 maanden).	Gerandomiseerd, 89 medewerkers van Dow Chemical, online training	Aikens e.a., 2014
tot 12 maanden	Studies die tussen 3 maanden en een jaar na de training maten, vonden nog minder stress dan in de controlegroep. Productiviteit direct na de training licht hoger.	Meta-analyse van 91 gerandomiseerde studies op het werk	Michaelsen e.a., 2023
65 tot 72%	Kans dat iemand die de training deed minder stress heeft dan iemand die hem niet deed. Zelf omgerekend uit de effectgroottes.	Meta-analyses van gerandomiseerde studies	Vonderlin e.a., 2020; De Vibe e.a., 2017;

			Bartlett e.a., 2019
-25%	Fouten op concentratietaken bij mensen die 12 minuten per dag oefenden.	Beschreven in een boek over haar onderzoek	Jha, 2021 (Peak Mind)
4,7%	Gebruikt een app voor aandachtsoefeningen na 30 dagen nog (alle apps voor mentale gezondheid: 3,3%).	Gebruiksdata van 93 apps	Baumel e.a., 2019

2. Verzuim in Nederland

- Het verzuim lag in het vierde kwartaal van 2025 op **5,6%** van de werkdagen (CBS).
- **Eén op de vier** verzuimdagen hangt samen met stress, volgens cijfers van ArboNed en HumanCapitalCare over zo'n 1 miljoen werknemers (juli 2024 tot juni 2025).

3. Onze eigen meting: TheyDo

TheyDo is een volledig remote tech-scale-up. 39 medewerkers deden in het voorjaar van 2026 mee aan de training van 6 weken.

- **+8,6% productiviteit**, 4 weken na de training. Zelfgerapporteerd met de Health and Work Performance Questionnaire van de WHO, n=14.
- **68%** merkte minder stress en spanning, 55% minder op de automatische piloot, 55% minder mentaal moe, 41% betere concentratie. Zelfgerapporteerd in de eindevaluatie, n=22 van 39, in 5 groepen.
- Trainer gemiddeld 9,3, programma 8,1.

Beperkingen. Er is geen controlegroep: we vergelijken deelnemers met zichzelf, voor en na. Of een verandering door de training komt, kunnen we dus niet zeggen. Alles is zelfgerapporteerd, niet iedereen vulde de vragenlijsten in, en de groepen zijn klein. Resultaten verschillen per organisatie en zijn geen garantie.

4. Wanneer verdient de training zich terug?

We rekenen niet met een verwachte besparing, want die kunnen we niet beloven. We rekenen alleen het omslagpunt uit: de kosten van de training tegenover de loonsom van de deelnemers.

Omslagpunt in productiviteit = prijs per deelnemer ÷ gemiddeld bruto jaarsalaris
Omslagpunt in ziektedagen = prijs per deelnemer ÷ (bruto jaarsalaris ÷ 260 werkdagen)

Voorbeeld: bij €575 per deelnemer en een gemiddeld salaris van €40.000 verdient de training zich terug vanaf 1,44% meer productiviteit, of als elke deelnemer 3,7 ziektedagen per jaar minder heeft. Bij TheyDo lag het omslagpunt op 0,36%; de deelnemers rapporteerden 8,6%. Reken het voor je eigen organisatie uit op innerleaps.nl.

Bronnen

- Aikens, K. A., e.a. (2014). Mindfulness goes to work: Impact of an online workplace intervention. *Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 56(7), 721-731. doi.org/10.1097/JOM.0000000000000209
- ArboNed (23 september 2025). Verzuim door stress blijft toenemen. arboned.nl/nieuws/verzuim-door-stress-blijft-toenemen
- Bartlett, L., e.a. (2019). A systematic review and meta-analysis of workplace mindfulness training randomized controlled trials. *Journal of Occupational Health Psychology*, 24(1), 108-126. doi.org/10.1037/ocp0000146
- Baumel, A., e.a. (2019). Objective user engagement with mental health apps. *Journal of Medical Internet Research*, 21(9), e14567. doi.org/10.2196/14567
- CBS. Dashboard arbeidsmarkt: ziekteverzuim. cbs.nl
- De Bruin, E. I., e.a. (2018). The Unilever Study: Positive effects on stress and risk for dropout from work after the Finding Peace in a Frantic World training. *Mindfulness*, 11(2), 350-361. doi.org/10.1007/s12671-018-1029-6
- De Vibe, M., e.a. (2017). Mindfulness-based stress reduction (MBSR) for improving health, quality of life and social functioning in adults. *Campbell Systematic Reviews*, 13(1). doi.org/10.4073/csr.2017.11
- Jha, A. P. (2021). *Peak Mind: Find Your Focus, Own Your Attention, Invest 12 Minutes a Day*. HarperOne.
- Michaelsen, M. M., e.a. (2023). Mindfulness-based and mindfulness-informed interventions at the workplace: A systematic review and meta-regression analysis of RCTs. *Mindfulness*, 14(6), 1271-1304. doi.org/10.1007/s12671-023-02130-7
- Vonderlin, R., e.a. (2020). Mindfulness-based programs in the workplace: A meta-analysis of randomized controlled trials. *Mindfulness*, 11(7), 1579-1598. doi.org/10.1007/s12671-020-01328-3
- Żołnierczyk-Zreda, D., Sanderson, M., & Bedyńska, S. (2016). Mindfulness-based stress reduction for managers: a randomized controlled study. *Occupational Medicine*, 66(8), 630-635. doi.org/10.1093/occmed/kqw091

Meer over hoe we meten en wat de cijfers niet zeggen: innerleaps.nl/methode