

Bases: representações numéricas e operações aritméticas

Ano letivo 2025/2026

universidade de aveiro  **estga** escola superior de tecnologia e gestão de água

CENTRO30
Os Fundos Europeus mais próximos de si.

 **PORTUGAL 2030**

 Cofinanciado pela
União Europeia

Tópicos deste capítulo:

- Representação de números em diferentes bases
- Operações aritméticas no sistema binário

No final do capítulo o estudante:

- realiza conversões entre bases binária, octal, decimal e hexadecimal
- efetua operações aritméticas na base binária

Bases: representações numéricas e operações aritméticas

Sistemas de numeração

- Conjunto de símbolos (base) e regras de organização utilizados para representar uma quantidade;
- Historicamente os sistemas de numeração foram evoluindo de acordo com a cultura e necessidades das civilizações.

Egípcios										∩	∞
Maias	•	••	•••	••••	—	—•	—••	—•••	—••••	—	—
Babilónios	┐	┐┐	┐┐┐	┐┐┐┐	┐┐┐┐	┐┐┐┐	┐┐┐┐	┐┐┐┐	┐┐┐┐	◀	▶▶
Chineses	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	百
Romanos	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	C
Árabes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	100

Sistema de numeração decimal

A representação de um número inteiro na base decimal (base 10) consiste num conjunto de algarismos, em que cada um possui um valor que depende da respetiva posição na representação.

Exemplo

$$1325 = 1 \times 1000 + 3 \times 100 + 2 \times 10 + 5 \times 1$$

$$1325 = 1 \times 10^3 + 3 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 5 \times 10^0$$

Um número na base 10 é representado pela soma de várias potências de 10 com coeficientes inteiros que variam de 0 a 9.

$d_i, i = 0, 1, \dots, n-1 \rightarrow$ dígito decimal colocado na posição $i + 1$

$$(d_{n-1} \dots d_1 d_0)_{10} = d_{n-1} \times 10^{n-1} + \dots + d_1 \times 10^1 + d_0 \times 10^0$$

Exemplos de sistemas de numeração

- **Sistema decimal (base 10)** → Sistema mais utilizado pelos seres humanos
 - ▶ Base: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 - ▶ Ex.: $(2580)_{10}$
- **Sistema binário (base 2)** → Sistema mais frequente no mundo da computação
 - ▶ Base: 0, 1
 - ▶ Ex.: $(101000010100)_2$
- **Sistema octal (base 8)** → Alternativa ao sistema binário utilizado na programação
 - ▶ Base: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 - ▶ Ex.: $(5024)_8$
- **Sistema hexadecimal (base 16)** → Sistema utilizado na programação de microprocessadores
 - ▶ Base: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
 - ▶ Ex.: $(A14)_{16}$

Nota

A representação de um número natural numa base b é única.

Um número inteiro positivo cuja representação na base b seja $(d_{n-1} \dots d_1 d_0)_b$, terá a representação decimal obtida através da expressão

$$(d_{n-1} \dots d_1 d_0)_b = d_{n-1} \times b^{n-1} + \dots + d_1 \times b^1 + d_0 \times b^0$$

Exemplo

$$(101101)_2 = 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = (45)_{10}$$

$$(271)_8 = 2 \times 8^2 + 7 \times 8^1 + 1 \times 8^0 = (185)_{10}$$

$$(B1D)_{16} = 11 \times 16^2 + 1 \times 16^1 + 13 \times 16^0 = (2845)_{10}$$

Mudança da Base 10 \Rightarrow Base $b, b \neq 10$


divisões sucessivas

Conhecida a representação decimal de um número inteiro k , para obter a sua representação numa base $b, b \neq 10$, teremos de determinar os dígitos d_{n-1}, \dots, d_1, d_0 , tais que $k = d_{n-1} \times b^{n-1} + \dots + d_1 \times b^1 + d_0 \times b^0$. Para tal:


- Divide-se k por b obtendo o quociente q_0 e o resto d_0 ;
- Divide-se o quociente, q_0 , obtido na divisão anterior, por b , obtendo o quociente q_1 e o resto d_1 ;
- d_2 será o resto da divisão de q_1 por b ;
- O processo continua de forma análoga para os restantes dígitos e termina quando o quociente é zero, sendo d_{n-1} o resto da última divisão.

Exemplo

$$(90)_{10} = (156)_7$$



$$(177130)_{10} = (2B3EA)_{16}$$



Exercícios

- 1 Determine a representação decimal dos seguintes números: $(110101)_2$; $(122)_3$; $(524)_8$; $(2BF4)_{16}$.
- 2 Obtenha a representação do número $(263)_{10}$ nas seguintes bases: 2, 8, 16.
- 3 Apresente a representação do número $(315)_6$ na base 5.

Soluções:

- 1 $(110101)_2 = (53)_{10}$; $(122)_3 = (17)_{10}$; $(524)_8 = (340)_{10}$; $(2BF4)_{16} = (11252)_{10}$
- 2 $(263)_{10} = (100000111)_2 = (407)_8 = (107)_{16}$
- 3 $(315)_6 = (434)_5$

decimal	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
hexadecimal	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
octal	0	1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17
binária	0	1	10	11	100	101	110	111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111

Figura: Representação hexadecimal, octal e binária dos números inteiros de 0 a 15

Binário \Leftrightarrow Octal

Conversão direta

Divide-se o conjunto de dígitos em grupos de 3 bits consecutivos e efetua-se a correspondência direta desses no sistema octal.

$$(100000111)_2 = (407)_8$$


Binário \Leftrightarrow Hexadecimal

Conversão direta

Divide-se o conjunto de dígitos em grupos de 4 bits consecutivos e efetua-se a correspondência direta desses no sistema hexadecimal.

$$(00010000111)_2 = (107)_{16}$$

Conversão de bases



Exercícios dos apontamentos

- 1 Transforme em binário o número $(26)_{10}$.
- 2 Transforme o número $(37)_{10}$ em binário.
- 3 Determine a representação decimal dos seguintes números:
 - 1 $(110001)_2$
 - 2 $(725)_8$
 - 3 $(2AB3F)_{16}$
- 4 Obtenha a representação octal dos seguintes números:
 - 1 $(101001)_2$
 - 2 $(1000111)_2$
- 5 Apresente a representação hexadecimal dos seguintes números:
 - 1 $(10010)_2$
 - 2 $(10101011)_2$

Soluções:

- 1 $(26)_{10} = (11010)_2$
- 2 $(37)_{10} = (100101)_2$
- 3 $(110001)_2 = (49)_{10}$; $(725)_8 = (469)_{10}$; $(2AB3F)_{16} = (174911)_{10}$
- 4 $(101001)_2 = (51)_8$; $(1000111)_2 = (107)_8$
- 5 $(10010)_2 = (12)_{16}$; $(10101011)_2 = (AB)_{16}$

Conversão de números com parte decimal não nula

$$\begin{aligned}16,435 &= 10 + 6 + 0,4 + 0,03 + 0,005 \\ &= 1 \times 10^1 + 6 \times 10^0 + 4 \times 10^{-1} + 3 \times 10^{-2} + 5 \times 10^{-3}\end{aligned}$$

Mudança da Base $b, b \neq 10 \Rightarrow$ Base 10

soma de potências

Dado um número x na base b ,

$$x = (d_{n-1} \dots d_1 d_0, d_{-1} d_{-2} \dots d_{-m})_b = d_{n-1} \times b^{n-1} + \dots + d_1 \times b^1 + d_0 \times b^0 + d_{-1} \times b^{-1} + \dots + d_{-m} \times b^{-m}$$

Exemplo

$$\begin{aligned}(12,013)_4 &= 1 \times 4^1 + 2 \times 4^0 + 0 \times 4^{-1} + 1 \times 4^{-2} + 3 \times 4^{-3} \\ &= (6,109375)_{10}\end{aligned}$$

Conversão de números com parte decimal não nula

Mudança da Base 10 para a Base b , $b \neq 10$

A conversão da parte decimal de um número na base 10 para uma outra base, b , é obtida através de produtos sucessivos por b .

Para converter um dado um número real na base 10 numa outra base b é necessário converter separadamente a parte inteira e a parte decimal.

Relativamente à parte decimal,

$$x = (0, d_{-1}d_{-2} \dots d_{-m})_b = d_{-1} \times b^{-1} + d_{-2} \times b^{-2} + \dots + d_{-m} \times b^{-m}$$

Ao multiplicar x por b obtém-se d_{-1} como sendo a parte inteira do resultado. De seguida multiplica-se a parte decimal do resultado do produto anterior por b e a parte inteira do produto obtido corresponde a d_{-2} . O processo continua de forma análoga para obter os restantes dígitos.

Exemplos

Exemplo 1

$$(0,828125)_{10} = (???)_2$$

$$0,828125 \times 2 = \textcolor{red}{1}, \underbrace{65625}$$

$$0,65625 \times 2 = \textcolor{red}{1}, \underbrace{3125}$$

$$0,3125 \times 2 = \textcolor{red}{0}, \underbrace{625}$$

$$0,625 \times 2 = \textcolor{red}{1}, \underbrace{25}$$

$$0,25 \times 2 = \textcolor{red}{0}, \underbrace{5}$$

$$0,5 \times 2 = \textcolor{red}{1}, 0$$


$$(0,828125)_{10} = 0, (\textcolor{red}{110101})_2$$

Exemplos

Exemplo 2

$$(380, 34375)_{10} = (???)_2$$

Conversão da parte inteira



$$(380)_{10} = (101111100)_2$$

Conversão da parte decimal

$$0,34375 \times 2 = 0,6875$$

$$0,6875 \times 2 = 1,375$$

$$0,375 \times 2 = 0,75$$

$$0,75 \times 2 = 1,5$$

$$0,5 \times 2 = 1,0$$

$$(.34375)_{10} = , (01011)_2$$

$$(380, 34375)_{10} = (101111100, 01011)_2.$$

Exemplos

Exemplo 3

$$(0,523)_{10} = (???)_2$$

$0,523 \times 2 = 1,046$, conclui-se que $d_{-1} = 1$;

$0,046 \times 2 = 0,092$, vem $d_{-2} = 0$

$0,092 \times 2 = 0,184$, $d_{-3} = 0$

$0,184 \times 2 = 0,368$ $d_{-4} = 0$

$0,368 \times 2 = 0,736$; $d_{-5} = 0$;

$0,736 \times 2 = 1,472$, $d_{-6} = 1$

$0,472 \times 2 = 0,944$; $d_{-7} = 0$,

$0,944 \times 2 = 1,888$, $d_{-8} = 1$,

$0,888 \times 2 = 1,776$, $d_{-9} = 0$

\vdots

Este número tem representação na base 2 (representação binária) infinita.

$$0,523 = (0,100001110\cdots)_2$$

Exercícios

1 Converta para o sistema decimal:

1 $(234, 504)_8$

2 $(1100110, 001)_2$

3 $(0, 110001)_2$

4 $(0, 1111111)_2$

2 Determine a representação binária do número:

1 $(287, 0625)_{10}$

2 $(341, 525)_{10}$

3 $(0, 5)_{10}$

4 $(37, 375)_{10}$

3 Converta $(3084, 01888)_{10}$ para a base 5.

4 Indique o valor lógico das seguintes igualdades:

1 $(15, C8)_{16} = (25, 62)_8$

2 $(54, 12)_{10} = (66, 0753)_8$

5 Considere o número $x = (107, 9375)_{10}$. Então:

(A) $x = (1101011, 1111)_2$

(B) $x = (1110100, 0011)_2$

(C) $x = (1110101, 0011)_2$

(D) $x = (1110101, 1011)_2$

Operações aritméticas no sistema binário

Adição

A adição no sistema binário reduz-se à aplicação de cinco operações simples:

				1
0	0	1	1	1
+ 0	+ 1	+ 0	+ 1	+ 1
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
0	1	1	1 0	1 1
			0 e vai 1	1 e vai 1

Exemplo

10010	100110	1101101
+ 00111	+ 010110	+ 1100101
<hr/>	<hr/>	<hr/>
11001	111100	11010010

Operações aritméticas no sistema binário

Subtração

A subtração de B a A é equivalente a somar A ao simétrico de B.

Dado um número, o seu simétrico é obtido negando os seus bits todos e somando 1 ao resultado.

- 1.º obter -B
- 2.º somar A com -B
- 3.º Desprezar o 1º algarismo da esquerda

Exemplo

$$(01001110)_2 - (00100001)_2 = ?$$

simétrico de $(00100001)_2$

$$\begin{array}{r} 11011110 \\ + \quad 1 \\ \hline 11011111 \end{array} \quad \begin{array}{r} 01001110 \\ + \quad 11011111 \\ \hline \underline{1} 00101101 \end{array}$$

$$(01001110)_2 - (00100001)_2 = (00101101)_2$$

Bases: representações numéricas e operações aritméticas

Operações aritméticas no sistema binário

Multiplicação e divisão

A multiplicação e a divisão de dois números binários podem realizar-se pelos algoritmos clássicos das operações com números decimais.

Exemplo

$\begin{array}{r} 101 \\ \times 11 \\ \hline 101 \\ 101 \\ \hline 1111 \end{array}$	$\begin{array}{r} 1110 \text{ multiplicando} \\ \times 1011 \text{ multiplicador} \\ \hline 1110 \\ 1110 \\ 0000 \\ 1110 \\ \hline 10011010 \text{ produto} \end{array}$
---	--

Operações aritméticas no sistema binário

Exemplo

$$\begin{array}{r} 111 \\ - 10 \\ \hline 011 \\ - 10 \\ \hline 01 \end{array} \quad \begin{array}{r} 10 \\ \hline 11 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11000 \\ - 11 \\ \hline 00000 \end{array} \quad \begin{array}{r} 11 \\ \hline 1000 \end{array}$$

Exercícios

Efetue as seguintes operações no sistema binário:

1 $1001 + 11$

2 $111 + 101$

3 $1010 + 110$

4 $1100 + 110$

5 $101110 + 10101$

6 $100101 + 111$

7 $111011 + 10111$

8 $1100100 - 110010$

9 $1111010 - 1101$

10 $100011 - 1110$

11 $1101110 - 1010101$

12 $10101 - 111$

13 $111001 - 101010$

14 $1111100 - 101110$

15 110×11

16 10100×110

17 11010×101

18 1110×111

19 $101110 : 100$

20 $11110 : 101$

21 $10101 : 111$

Exercícios capítulo 1

Moodle